

# ديكسافين شراب

## مضاد للحساسية ومضاد للالتهابات

### التركيب:

يحتوي كل ١٠٠ مل من الشراب على:

ديكساميثازون (صوديوم فوسفات) ١٠ مجم

ماليات كلورفينيرامين ٤٠ مجم

### الأثر الطبي:

**ديكسافين شراب مضاد للحساسية والتهابات** يحتوي على ديكساميثازون وماليات كلورفينيرامين - وديكساميثازون مادة كورتيكوستيرويدية تمنع استجابة الأنسجة للالتهابات كما تمنع حدوث التغيرات التي تحدث بالأنسجة في موضع الالتهاب. كما أن مادة ديكساميثازون تمنع خروج الإنزيمات المسببة للالتهاب بالإضافة إلى تثبيط تكوين البروستاجلاندينات وغيرها من المواد الوسيطة التي تسبب أعراض الالتهابات. ونتيجة لذلك فإن ديكساميثازون يقضي على الأعراض الإكلينيكية للحساسية والتهابات مثل الحكة والتورم والاحمرار والألم الحوשים. أما مادة ماليات كلورفينيرامين فهي مضاد قوي للحساسية من خلال منع تفاعل الهيستامين مع مستقبلات H<sub>1</sub> كما أن لها تأثيراً بسيطاً مضاداً لتأثيرات كولين بالإضافة إلى تأثير مهدئ بسيط. وتعمل مادة ماليات كلورفينيرامين على تقليل تفاذية الشعيرات الدموية كما تنقل الإفرازات الزائدة وتقضي على أعراض الحساسية الأخرى بالجلد والأغشية المخاطية. ومن الناحية الإكلينيكية فإن احتواء **شراب ديكسافين** على تلك المادتين ذات التأثيرات المتكاملة يجعله علاجاً فعالاً لأعراض الحساسية وما يصاحبها من الالتهابات كما في حالات الأرتكاريا وحساسية الأنف والجلد وحالات الحساسية الناشئة عن استخدام بعض الأدوية. و**شراب ديكسافين** مأمون الاستعمال ومقبول الطعم وذو تأثير سريع ويتميز بأنه لا يسبب احتجاز الصوديوم بالجسم مقارنة بالستيرويدات الأخرى التي تحتوي على هيدروكورتيزون، كما أن **شراب ديكسافين** له تأثير مهدئ بسيط لا يسبب الشعور بالتعب لذا فإنه مناسب للاستخدام أثناء النهار.

### حريكة الدواء:

بعد تناول **شراب ديكسافين** يمتص كل من ديكساميثازون وماليات كلورفينيرامين جيداً من القناة الهضمية وينتشر كل منهما في أنسجة وسوائل الجسم. ويرتبط ديكساميثازون ببروتينات الدم بنسبة تتراوح من ٦٦ - ٧٧ % كما ترتبط ماليات كلورفينيرامين ببروتينات الدم بنسبة حوالي ٧٠٪ وتبلغ فترة نصف العمر لديكساميثازون في الدم من ٣-١ ساعات وماليات كلورفينيرامين من ١٢-١٥ ساعة. ويتم أيض المادتين في الكبد وتخرج نواتج الأيض بصورة أساسية في البول. وتتم مكونات الدواء خلال المشيمة وتظهر كميات ضئيلة منها في لبن الأم.

### دواعي الاستعمال:

- حساسية الجلد مثل الأرتكاريا ودرع الحشرات والتهابات الجلد المصحوبة بحكة.
- الحساسية الناتجة من تناول بعض الأدوية أو الأطعمة.
- حساسية الجهاز التنفسي مثل حساسية الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة وحساسية الصدر (الربو الشعبي).
- حساسية والتهابات العين مثل التهابات المتحممة والصلبية.
- بعض أعراض الحساسية.

### التحذيرات:

لا يستخدم الدواء للأطفال أقل من عامين بشكل تام ويجب استخدامه للأطفال أقل من ٦ سنوات تحت إشراف طبيب فقط.

### الجرعة:

**الأطفال من ٢ - ٦ سنوات:** نصف ملعقة صغيرة مرتان يومياً تحت إشراف الطبيب.

**الأطفال من ٦ - ١٢ سنة:** نصف ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً.

**البالغون والأطفال فوق ١٢ سنة:** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً.

### ملحوظة:

بعد اختفاء الأعراض يجب تقليل الجرعة تدريجياً قبل إيقاف الدواء تماماً.

### موانع الاستعمال:

الحساسية المفرطة لأي من مكونات الدواء. ولا تستخدم الأدوية المحتوية على كورتيكوستيرويدات في حالات القرحة النشطة للعدة أو الإثني عشر.

### الاحتياطات:

كما هو الحال مع الأدوية المحتوية على ديكساميثازون يجب استخدام أقل جرعة مؤثرة. كما يستخدم الدواء بعذر في مرضي السكر وضغط الدم المرتفع وفي حالات قصور وظائف الكبد والكلى والإضطرابات النفسية. وفي حالة وجود عدوى ميكروبية مصحوبة بحساسية يجب استخدام مضاد حيوي مناسب.

### الأعراض الجانبية:

شراب ديكسافين مأمون الاستعمال وقد يحدث تأثير مهدئ بسيط سرعان ما يزول.

### الحمل والرضاعة:

الأدوية المحتوية على كورتيكوستيرويدات تستخدم أثناء الحمل والرضاعة تحت إشراف الطبيب.

### الجرعات الزائدة وعلاجا:

تناول جرعات كبيرة عن طريق الخطأ يؤدي إلى تبيس الجهاز العصبي وجفاف

الفم واحتباس البول وفي هذه الحالة يجب علاج الأعراض.

### التداخلات الدوائية:

- أدوية فينيتوين وفيتوإريبتال وأيندرين وريتامين تقلل من فترة نصف عمر مادة ديكساميثازون وتزيد معدل تخلص الدم منها.
- استخدام مضادات الهيستامين في نفس الوقت مع الكحول أو مشروبات الجاهز العصبي المركزي يزيد من التأثيرات المهدئة.
- كلورفينيرامين يزيد تركيزات فينيتوين بالدم.
- **التأثيرات على الاختبارات المعملية:**
- ديكساميثازون يظهر زيادة زائفة في بعض قياسات تركيز ديوجوكسين بالدم.
- يجب إيقاف استخدام مضادات الهيستامين لمدة لا تقل عن ٥ أيام قبل إجراء اختبارات حساسية بالجلد.

### العبوة:

زجاجية تحتوي على ١٢٠ مل من الشراب.

### الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة ( ١٥ - ٢٠ ° ) بعيداً عن الضوء.

تحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

### إن هذا الدواء

- مستحضر يلازم على صحتك وسهالته خلافاً للتعليمات بمرضك لتعثر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتوصوس عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي نفعه وضروبه.
- لا تنقطع مسدة العلاج للعصدة لسبب منن تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.