



التركيب:

يحتوي المعلق على ٤ / بتروليون، ستروبيديزول
(كافى) ١٢٥ مجم ستروبيديزول لكل ٥ مليلتر

الخواص:

يحتوي معلق التوفل على ستروبيديزول مضاد البروتوزوا لدى الفاعلية الواسعة المسدى و يتميز
انتوفار بالكفاءة العالية في القضاء على الإصابة بالبروتوزوا مثل التلمبيا هيستوبليكا، جياريا لامبيا
و تريكوموناس فليجاليوس، التوفل له تأثير فعال ضد البكتيريا اللاهوائية، كما تمت فاعلية التوفل
لتشمل البكتيريا العنقودية السالبة الجرام و الموجبة الجرام و جميع البكتيريا المسببة للمغرة اللاهوائية.
و يتميز التوفل بطعم المعلق و المستساغ خاصة لدى الأطفال.

دواعى الاستعمال:

- فى حالات الأميبا: علاج الأميبا المعوية و الإصابات الأميبية الأخرى بما فى ذلك الأميبا القديمة
و المتخوصصة.
- الإصابة بجياريا لامبيا.
- الوقاية من و علاج الإصابة بالبكتيريا اللاهوائية بعد عمليات جراحية.
- التهاب اللثة الفترحي الحاد و عدوى الأسنان الحادة.
- الإصابة بتريكوموناس.

الجرعة:

يفضل تناول الجرعات قبل الوجبات بساعة.

الأميبا المعوية (مدة ٥ أيام):

- ٣-١ سنوات: ٢٠٠ مجم كل ٨ ساعات.
- ٧-٣ سنوات: ٢٠٠ مجم كل ٦ ساعات.
- ١٠-٧ سنوات: ٤٠٠ مجم كل ٨ ساعات.
- الإصابات الأميبية الأخرى (مدة ٥-١٠ أيام):
- ٣-١ سنوات: ٢٠٠-١٠٠ مجم كل ٨ ساعات.
- ٧-٣ سنوات: ٢٠٠-١٠٠ مجم كل ٦ ساعات.
- ١٠-٧ سنوات: ٤٠٠-٢٠٠ مجم كل ٨ ساعات.

لجياريا (مدة ٣ أيام):

- ٣-١ سنوات: ٥٠٠ مجم يوميا.
- ٧-٣ سنوات: ٦٠٠-٨٠٠ مجم يوميا.
- ١٠-٧ سنوات: ١ مجم يوميا.
- حالات الإصابة بالبكتيريا اللاهوائية (مدة ٧ أيام):
- ٧٥٥ مجم/كجم من وزن الجسم كل ٨ ساعات.

التهاب اللثة الفترحي الحاد (مدة ٣ أيام):

- ٣-١ سنوات: ٥٠ مجم كل ٨ ساعات.
- ٧-٣ سنوات: ١٠٠ مجم كل ١٢ ساعة.
- ١٠-٧ سنوات: ١٠٠ مجم كل ٨ ساعات.
- التريكوموناس (مدة ٧ أيام):
- ٣-١ سنوات: ٥٠ مجم كل ٨ ساعات.
- ٧-٣ سنوات: ١٠٠ مجم كل ١٢ ساعة.
- ١٠-٧ سنوات: ١٠٠ مجم كل ٨ ساعات.

الأعراض الجانبية:

إنشاء العدوى بالمستحضر التى تحدث على مدة ستروبيديزول تقريبا تحدثت بعض الأعراض
الجانبية الشبيهة مثل اضطرابات بسيطة بقلادة هضمية، تغير الطعم بطعم و تغير لون البول.

موانع الاستعمال:

الحساسية المفرطة للبروتوزوا ستروبيديزول.

التداخلات الدوائية:

قد يزيد ستروبيديزول من تأثير بعض مضادات التجلط. يزيد فيتيريسيلينون من معدل الأيض
لستروبيديزول. سينيثيدون يبطئ أيضا ستروبيديزول. ستروبيديزول يبطئ معدل الأيض للفينيتون.

الاحتياطات:

يجب ضبط الجرعة فى حالة مرضى قصور الكبد. يجب استخدام الدواء بحذر فى حالة أمراض الجهاز
العصبي المركزى.

المعوى:

زحاجة تحوى على ٦٠ في ١٢٠ مليلتر.

يزج الزحاجة جيدا قبل الاستعمال.

المحفظ:

يحفظ فى درجة حرارة (٥-٣٠°م).

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

