

# أمريزول<sup>®</sup>

## مترونيديازول مضاد للطفيليات - قاتل للبكتيريا

### التركيب:

تحتوي كل ٥ مليلتر على:

٢ - ٢. ميثيل - ٥ - نيتروايميديازول - ١ (يل) إيثيل بنزوات ؛ بنزويل مترونيديازول ..... ٢٠٠ مجم  
( تكافؤ ١٢٥ مجم مترونيديازول )

يحتوي كل قرص على:

٢ - ٢. ميثيل - ٥ - نيتروايميديازول - ١ (يل) إيثانول ؛ مترونيديازول ..... ٢٥٠ مجم

### الخواص:

يحتوي أمريزول على مادة مترونيديازول ذات الخواص المضادة للطفيليات و القاتلة للبكتيريا اللا هوائية (مثل حالات التسمم الدموي الجرثومي، الإلتهاب الرئوي التنفسي، حمى النفاس، حراريج الحوض، إلتهابات النسيج الضام و كذلك اصابات الجروح بعد العمليات الجراحية).  
و مستحضر أمريزول مضاد فعال لميكروب ( تريكوموناس فاجيناليس) و غيره من الطفيليات الأخرى مثل طفيل (إنتاميبيا هستوليتيكا) و طفيل (جارديا لامبليا).

### دواعي الاستعمال:

- يستعمل أمريزول لعلاج اصابة الجهاز البولي التناسلي بالتريكومونيازيس في الذكور و الإناث.
- في حالات الأميبيا؛ أمريزول مستحضر فعال في جميع مواقع الاصابة بالميكروب و يستعمل لعلاج الدوسنتاريا الأميبية و حراريج الكبد الأميبية و لإستئصال و علاج طفيل الإنتاميبيا هستوليتيكا في حالة الأفراد العاملين للعدوى.
- للوقاية من و علاج حالات الاصابة بالميكروبات اللاهوائية و خصوصا بعد العمليات الجراحية للجهاز الهضمي أو عمليات أمراض النساء و الولادة.
- لعلاج حالات الاصابة بميكروب (جارديا لامبليا) و حالات التهاب الحلق (مرض قنست).

### الجرعة:

- لعلاج حالات الدوسنتاريا الأميبية المعوية الحادة و المزمنة ، حراريج الكبد الأميبية و الإصابات الأميبية الأخرى ؛
  - البالغين: ٢-١ قرص ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.
  - الأطفال: ( من ٥ - ١٢ سنة ): ١ - ١ قرص ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.
  - البالغين: ٢ - ٤ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.
  - الأطفال: ( أقل من ٣ سنوات ): ١ - ١ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.
  - ( من ٣ - ٧ سنوات ): ١ - ١ ٢ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.
  - ( من ٧ - ١٠ سنوات ): ١ - ٢ ٢ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٥ - ١٠ أيام.

- لعلاج حالات التريكومونيازيس:

- قرص واحد ثلاث مرات يوميا لمدة ٧ أيام، ويمكن أخذ برنامج علاجى اخر اذا لزم الامر بعد مدة ٤ - ٦ أسابيع، ويوصى بعلاج الطرف الاخر (الزوج أيضا).
- البالغين و الاطفال فوق ١٠ سنوات: ٢ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٧ أيام، ويمكن أخذ برنامج علاجى اخر إذا لزم الامر بعد مدة ٤ - ٦ أسابيع، ويوصى بعلاج الطرف الأخر (الزوج) أيضا - لعدم تكرار العدوى.

- الأطفال: ( أقل من ٣ سنوات ): ١ ٢ ١ ٢ ملعقة صغيرة يوميا لمدة ٧ أيام.
- ( من ٣ - ٧ سنوات ): ١ ٢ ١ ٢ ملعقة صغيرة يوميا لمدة ٧ أيام.
- ( من ٧ - ١٠ سنوات ): ٢ ١ ٢ ١ ٢ ملعقة صغيرة يوميا لمدة ٧ أيام

- لعلاج الجارديازيس (اللامبليات):

- قرص واحد ٣ مرات يوميا لمدة عشرة أيام.
- البالغين: ٢ - ٤ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة عشرة أيام.
- الأطفال: تعضى نسبة من جرعة البالغين مماثلة للنسبة المتبعة في علاج الأميبيا.

- للوقاية من و علاج حالات الاصابة بالميكروبات اللاهوائية:

- ١ - ٢ قرص ٣ مرات يوميا لمدة ٧ أيام.
- ٢ - ٤ ملعقة صغيرة ٣ مرات يوميا لمدة ٧ أيام.

### الأثار الجانبية:

أمريزول مستحضر سهل التحمل للمريض العادى و لكن قد يحدث في بعض الحالات إنتفاخ أو اضطراب بسيط في المعدة للأشخاص ذوى الحساسية المفرطة .

### موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال المستحضرات المحتوية على مادة مترونيديازول في حالة المرضى المصابين باضطرابات في الدم أو مرضى الجهاز العصبي المركزي ، كما يفضل عدم استعمالها أثناء الحمل.

### التداخل الدوائى:

قد يشعر بعض المرضى باضطراب في الجهاز الهضمي ، قيئ ، إحتقان بالوجه أو صداع إذا تعاطى المريض مشروبات كحولية أثناء العلاج.

### العبوة:

علبة تحتوى على ٢ شريط بكل منهما ١٠ أقراص.  
زجاجة تحتوى على ١٢٠ مليلتر معلق للشرب.  
ترج الزجاجة قبل الإستعمال.

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفسه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب  
واتحاد الصيدالة العرب