

التركيب:

تحتوي كل ٥ مل على ٤ ملجم برومهكسين هيدروكلورايد (دستور الأدوية البريطاني).

pharmacia

عناية خاصة:

يجب أن يعطى بحذر للمرضى المصابين بقرحة المعدة والاثنا عشر.

الأثر الطبي:

رياكسين (برومهكسين هيدروكلورايد) دواء مثبت سريريا وجهازيا. فهو فعال في إذابة المادة المخاطية وذلك يكون بزيادة إفراز البلغم وطرده. حيث تظهر فعاليته بعد ٢-٣ أيام من العلاج. رياكسين يجعل البلغم خفيف وبالتالي يقلل من لزوجته.

التأثير على القيادة وتشغيل الآلات:
عند تناول رياكسين لم يلاحظ أي تأثير سلبي على الأشخاص أثناء القيادة أو أثناء تشغيل الآلات.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥-٢٥) درجة مئوية، بعيدا عن الضوء.

يجب عدم استعمال الدواء بعد انتهاء صلاحيته.

دواعي الاستعمال:

يستعمل الرياكسين في علاج الاعتلال التنفسي الحاد والمزمن والمصاب بمخاط لزج.

الشكل الصيدلاني:

شراب:
قارورة تحتوي على ١٠٠ مل.

موانع الاستعمال:

لا يوجد مانع مطلق لاستعمال برومهكسين. ولكن لا يستعمل للمرضى الذين لديهم حساسية لمادة برومهكسين.

pharmacia

الاحتياطات:

لا يوجد.

pharmacia

الأثار الجانبية:

قد يحدث بعض الأثار الجانبية الخفيفة في المعدة والأمعاء.

الاستعمال أثناء الحمل والرضاعة:

برومهكسين ليس له تأثير على الجنين. ولكن من الأفضل تجنب استعماله في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

الجرعات:

البالغين : (٥ مل - ١٠ مل) ٣ مرات يوميا.
الأطفال : (٢,٥ مل - ٥ مل) ٣ مرات يوميا.

الجرعة الزائدة:

لم تسجل أي حالات تسمم نتيجة لزيادة الجرعة.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب



الرياض
فارما

إنتاج الرياض فارما

شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

pharmacia

