

تايلينول® فورت

مسكن للألام وخافض للحرارة

التركيب

المادة الفعالة: ٥٠٠ مغ للقرص الواحد

المادة المضادة للأكسدة: E 223

الخصائص:

يعرف تايلينول فورت بأنه مسكن للألام وخافض للحرارة، كما أن له تأثير سريع.

دواعي الاستعمال:

للمسكين والتخفيف المؤقت من الأوجاع والألام الخفيفة والمتوسطة مثل: الصداع والألم الأسنان، آلام العضلات، وآلام الملتهب وآلام التهاب المفاصل الالتهابية. خافض للحرارة.

الجرعات:

٣-٤ قرص كل ٤ إلى ٦ ساعات حتى ٣-٤ مرات يوميا، يجب عدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.

موانع الاستعمال:

في حالة الحساسية تجاه الباراسيتامول أو أي من المضافات.

تحذيرات واحتياطات خاصة للاستخدام :

- يجب عدم تجاوز حد الجرعة اليومية الموصى بها
- هذا المنتج يحتوي على الباراسيتامول، لا تتناوله بالتزامن مع أيوية أخرى تحتوي على مادة الباراسيتامول (المعروفة أيضاً بالأسيتامينوفين).
- في حالة استمرار أو اشتداد حالة الحمى أو في حالة ظهور أعراض جديدة، يجب استشارة الطبيب المعالج، حيث من الممكن أن تكون من هذه الأعراض مؤشر على حدوث حالات خطيرة.
- قم باستشارة الطبيب قبل القيام باستخدام تايلينول في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
- استشر طبيبك قبل استخدام هذا الدواء، إذا كنت من المسابرين بأعراض الكبد أو تعاني من مشكلة في الكلي يجب استشارة الطبيب إذا كنت من مدمني الكحول ما إذا كان ينبغي استخدام الباراسيتامول أو مسكبات الألم الأخرى أو مخفضات الحرارة حيث من الممكن أن يزداد معدل مخاطر تسمم الكبد لدى الذين يتعاطون المشروبات الكحولية بشكل مفرط نتيجة لاستخدام الزائد للباراسيتامول.

• يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

التداخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى: (مع الوارفارين)

بالنسبة لتأثيرات المرضي فإن الاستعمال العارض للباراسيتامول بشكل عام، له تأثير بسيط أو معدوم على النسبة النظامية الوالية INR (أي إن آر) لدى المرضي الذين يخضعون للعلاج المزمن بالوارفارين، إلا أنه لا يوجد هناك أي خلاف فيما يتعلق باحتمالية زيادة باراسيتامول لقدرة تأثيرات المواد المضادة لتخثر الدم في الوارفارين والمشقات الأخرى لكوامارين.

ويشكل عام، فإنه من المهم بالنسبة للمرضي الذين يخضعون لعلاج المستمر بوارفارين، القيام بمراقبة زمن البروثرومين (PT) (سي تي) أو النسبة النظامية الوالية INR (أي إن آر) بشكل حثيث مهما كانت الأدوية التي يتناولها أو توقفها عن تناولها أو ما إذا تناولها بانتظام، قد تزداد الآثار السامة لتكبد لتايلينول فورت مع تناول الكحول.

الحمل والرضاعة :

يتوجب على النساء الحوامل والرضعات القيام بالاستمرار من خبراء الرعاية الصحية قبل تناول الدواء حيث لا توجد هناك دراسات كافية ومراقبة جيدة على النساء الحوامل والرضعات.

إن مراجعة المتخصص الطبية تتوافق مع بيانات السلامة الخاصة بالشركة لفترة ما بعد التسويق وتدل على أن تناول مادة الباراسيتامول وفقاً للتعليمات لا يحمل أي تأثيرات سلبية على المرأة الحامل أو الجنين.

إن تناول الأمهات الباراسيتامول ضمن الجرعات الموصى بها من مسكبات الآلام ليس له أية مخاطر على الطفل الرضيع، حيث من الممكن أن يترك الباراسيتامول عن طريق حليب الأم ضمن تركيز منخفض

(١-٥ إلى ١٠،٥٪ من الجرعة التي تناولتها الأم)

تأثيرات غير مرغوب فيها:

بيانات ما بعد التسويق

تتضمن التأثيرات السلبية للدواء التي لوحظت عند تسويق العلاج ضمن جرعات علاجية

للباراسيتامول على الأمور التالية:

• اضطرابات الجهاز الهضمي

نادرة جدا (> ١ / ١٠,٠٠٠) متضمنة كذلك التقارير المنفصلة المحدودة) تعامل تأتي، فرط حساسية

• الاضطرابات الجلدية وتحت الجلدية

نادرة جدا (> ١ / ١٠,٠٠٠) متضمنة كذلك التقارير المنفصلة المحدودة) حدوث حالات شرى حكة وطفح جلدي

فرط الحرارة:

من الممكن أن تتسبب تناول الباراسيتامول بوجع مفرط حدوث سمية كبدية لدى بعض المرضي، لذلك يجب توفير الرعاية الطبية الفورية في الحالات الخطيرة حتى في حالة ظهور علامات أو أعراض واضحة.

من الممكن حدوث سمية كبدية لدى البالغين والبالغين (١٢ سنة) بعد تناول جرعات تتجاوز ٧,٥ إلى ١٠ جرامات خلال فترة ٨ ساعات أو أقل، ومن النادر أن تسبب الجرعة المفرطة حدوث الوفاة (أقل من ٣ - ٤٪ من الحالات التي لم تتم معالجتها)، كما أنه من النادر أن يتم التبليغ عن حدوث الأعراض فرط الحرارة أقل من ١٥ جراماً، وتتضمن الأعراض المبكرة التي تتبع تناول الجرعة التي من المحتمل أن تسبب تسمم كبدية، حدوث قلة الشهية (الأنوراكسيا) والغثيان والقيء والتعرق الشديد وشحوب اللون وتوعلع عام، ومن غير الممكن أن تظهر الأعراض السريوية العظيمة والخبرية التي تشير لحدوث تسمم في الكبد قبل مرور ٤٨ إلى ٧٢ ساعة من تناول الدواء، ويجب أن يتم إجراء مخطط لقياس مستوى الباراسيتامول في بلازما الدم لدى البالغين والبالغين والأفراد الذين يأتون من دون معرفة كمية الباراسيتامول التي تناولوها أو في تاريخ مشكوك فيه لا يمكن الاعتماد عليه، ويجب معالجتهم باستعمال أسيتيلسيستينين.

كما يوصى باتباع الإجراءات التالية: البدء فوراً بإجراء غسيل للمعدة، حيث يجب القيام بتخليق مستوى الباراسيتامول في البلازما في أسرع وقت ممكن ولكن ليس قبل تجاوز أربع ساعات بعد تناوله.

إن تناول كمية أكبر من الجرعة الموصى بها (فرط الجرعة)، قد يؤدي إلى حدوث تلف في الكبد، وعليه فم يطلب المساعدة الطبية على الفور في حالة تناول جرعة زائدة من الدواء، حيث من المهم جداً الحصول على الرعاية الطبية حتى ولو لم تلاحظ أية علامات أو أعراض.

التخزين:

يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية

العيوه المتوفرة:

تايلينول فورت، ٢٠ قرص من الباراسيتامول، ٥٠٠ مغ للقرص الواحد

مدة الصلاحية:

يجب عدم تناول تايلينول فورت بعد مرور التاريخ المبين بجانب عبارة EXP المدونة على العبوة، وما لم يتم توجيهه بخلاف ذلك، لا تتخلص من الأدوية غير المستخدمة بواسطة تصريفها في حوض المفضلة أو المراحيض أو فتحات تصريف مياه الأمطار.

الشركة المنتجة:

Cilag AG - Hochstrass 201 - 8250 Schaffhausen, Switzerland

الشركة مالكة حق التسويق:

Janssen - Cilag AG - Sihlbruggstrasse 111 - 6340 Baar, Switzerland

تاريخ مراجعة النشرة: مارس ٢٠١٢

هذا منتج دوائي

- الدواء مونتج ويؤثر على صحته واستخدامه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالأدوية وبقواتها ومضارها.
- لا تتلق فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة طبيب المعالج.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيداقه العرب