

التركيب:

كل قرص مغلف من ماكسيمTM ٤٠٠ ملجم يحتوي على ٤٦٦,٨ ملجم موكسيفلوكساسين هيدروكلوريد يكافئ ٤٠٠ ملجم موكسيفلوكساسين .

فئة العلاج : مضاد حيوي، كينولون.

موانع الاستخدام : -علاج التهاب البروني السنتيبي إلى المتوسط المكتسب عن طريق العدوى (ولكن ليس من طريق المستشفى)، و تشمل الالتهاب الرئوي البكتيري المقاوم للبلبنسلين.

- التهاب الحاد (سوء الحالة الفصلي) للالتهاب المزمن للشعب الهوائية الرئوية .

- التهاب البكتيري الحاد للجيوب الأنفية.

الحمل : لا يجب استخدامه أثناء الحمل .

الرضاعة : إفرازه في حليب الأم غير معروف / لا يوصى به أثناء فترة الرضاعة.

موانع الاستخدام: في حالات الحساسية للموكسيفلوكساسين أو الكينولونات الأخرى أو أي من محتويات الدواء الأخرى .

الحمل، الرضاعة، الأطفال والمراهقين (١٨ سنة).

تحذيرات/ احتياطات:

يجب استخدامه بعذر في المرضى الصغارين يتبعه ملحوظ في ضربات القلب، قصور في القلب يصبح ضئيف في قوة ضخ البطين الأيسر (قلب ضعيف) . أعراض سابقة لعدم إنتظام ضربات القلب أو قصور حاد في عضلة القلب . موكسيفلوكساسين يسبب بحسب الجرعة استطالة في فترة رسم القلب الإلكتروني (الكيو - تي).

يجب أن لا يتزامن تعاطي الموكسيفلوكساسين مع أدوية أخرى والتي أيضاً تسبب استطالة في فترة الـ (كيو - تي) أو تسبب بطء في ضربات القلب.

يجب استخدامه أو تمزقها ثم الإبلاغ عنه مع تعاطي المضادات الكينولونية، قد تزيد المخاطرة إذا تزامن تعاطيه مع الكورتيكوستيرويد، خاصة في المسنين. يجب إيقاف العلاج فوراً عند ظهور أي أعراض للألم في الأربطة.

يجب إيقاف العلاج في حال تعرض المرضى لأي تأثيرات عكسية في الجهاز العصبي المركزي مثل (الدوخة - هلوسة - أفكار أو أفعال انتحارية).

لا يوصى به للمرضى الذين يعانون من فشل متوسط إلى شديد في وظائف الكبد.

يجب توخي الحذر في استخدامه في المرضى الصغارين بعرض السكري، قد يسبب تقيراً في نسبة الجلوكوز.

إلتهاب الأربطة أو تمزقها ثم الإبلاغ عنه مع تعاطي المضادات الكينولونية، قد تزيد المخاطرة إذا تزامن تعاطيه مع الكورتيكوستيرويد، خاصة في المسنين. يجب إيقاف العلاج فوراً عند ظهور أي أعراض للألم في الأربطة.

قدان الوعي، وخز في الشرايين، وشمل حساسية وصلت إلى حد الصدمة عند العلاج بالكينولونات، وفي حال حدوث ردود فعل تحسسية مثل (الحكة، ارتكابي، ضيق التنفس أو تورم في الوجه، استخدام الدواء لمدة طويلة قد يؤدي إلى العدوى الحادة، الإصابة بالتهابات مثل التهاب القولون الكاذب وخاصة مع المرضى الذين يعانون من الإسهال، قد تزيد الكينولونات من حالة الوهن العضلي .

لا يجب التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو القوية.

الآثار الجانبية:

بشكل إجمالي: ٢٢ إلى ٣١ .

الجهاز العصبي المركزي: دوخة (٢٢) .

الجهاز الهضمي: غثيان (٢٧) ، إسهال (٢٦) .

أقل من ١٪ : (محصورة بين التفاعلات المهمة والهدئة لتجربة) ردود فعل فرط الحساسية، ردود فعل حساسية حادة قد تصل إلى حد الصدمة، قلق، تشوش، تشنجات، شذوذ في رسم القلب الإلكتروني، هلوسة، التهاب الكبد، ارتفاع سكر الدم، ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، وخز في الأطراف، ورم في الأجل (وهي عبارة عن الرشح "سائل مائي" في الأجل)، ارتفاع أو انخفاض في نسبة تجلط الدم، التهاب القولون الشفائي، الكدمات، عاثلات تسمية ارتفاع أو انخفاض في عامل التجلط، استطالة في الـ (كيو - تي)، متلازمة ستيفن جوتز، زيادة ضربات القلب، تمزق في الأربطة، تغير في لون اللسان، رعشة، إضطرابات في التوازن، إضطراب في التوازن، حطان القلب، تروسيدي تي، ييست (عدم إنتظام ضربات القلب) . يتم الإبلاغ عن سكتة تنجية (نادر جداً) . عادة في المرضى الذين يعانون من عدم إنتظام في ضربات القلب.

قرص الجرعة والتسمم :

الأعراض المحتملة تتجاوز الجرعة الموصوفة تشمل اضطرابات ذهنية، تشنجات، استطالة في فترة الـ (كيو - تي) . عدم إنتظام في ضربات القلب (تشمل تروسيدي دي بونيت) . يجب متابعة المريض بواسطة رسم القلب الـ (ECG) في حال تجاوز الجرعة الموصوفة بصورة مستمر. علاج زيادة الجرعة يجب أن يكون مساعد لحالة المريض وإزالة الأعراض الناتجة.

التفاعلات الدوائية :

زيادة الفعالية أو التسمية : الأدوية أو العلاجات التي تؤدي إلى استطالة في فترة الـ (كيو - تي) وتؤثر على معدل ضربات القلب وتشمل (مجموعة أ١ ومجموعة III ، مضادات عدم إنتظام ضربات القلب، إرتروميسين، سيبريديين، مضادات الإضطرابات الذهنية والهدئات، مضادات الإكتئاب) يتضاعف تأثيرها إذا ما تزامنت مع تعاطي الموكسيفلوكساسين . سيميتدين و بروميسيد تؤدي ارتفاع مستويات الكينولون، زيادة في نويات الشنجات قد تحدث مع هوكاميت في NSAIDs . الكينولونات قد تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الديجوكسين في بعض المرضى، بالرغم من أن الموكسيفلوكساسين لم يلاحظ تدخله مع الوارفارين.

يوصى بمتابعة المعدلات الطبيعية الدوائية المتبعة في صورة الدم للمريض الذي يعالج بمعدلات التجلط. تزامن تعاطيه مع الكورتيكوستيرويد قد يزيد من مخاطر تمزق الأربطة.

نقص الفعالية : الكاثيونات المعدنية وتشمل (ماغنيسيوم، ألومنيوم، الحديد، الزنك) قد تتبد وتضعف امتصاص الكينولونات في القناة الهضمية (بنسبة تصل إلى ٧٩%) لا يجب تناول مضادات الحموضة، وأقرص الفيتامينات المدعمة بالمعادن، سوكرفالمت، وبعض سيغ أو أقرص ديد نوزين خلال فترة العلاج بهذا العقار، يجب تناول الموكسيفلوكساسين ٤ أو ٨ ساعات قبل (كعد أدنى ساعتين قبل وساعتين بعد) تناول تلك الأدوية. الأدوية المضادة للسرطان اللطيفة يمكن أن تقلل من امتصاص الكينولون.

لا يوجد تدخل واثلي عند تناول أقرص ماكسيمTM ٤٠٠ ملجم المغلفة مع الأدوية المضطوية على الهواء العفائية الأليه: والنيامين (علاج فرحة المعدة) ، بروبرينيدي (يستخدم لخفض مستوى حمض اليوريك في الدم) ، أقرص منع الحمل التي تتناول عن طريق الفم (تنظيم النسل) ، أو الأوفلوكلين (يستخدم لعلاج الربو) .

الرجاء إبلاغ طبيبك إذا الصديني إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى أو تكون قد تناولتها مؤخراً حتى لو كانت تلك الأدوية تصرف بدون وصفة طبية.

التداخلات الغذائية / والأعصاب : لا يتأثر امتصاص العقار إذا ما تم تناوله مع وجبة دسمة أو غنية بالدهون أو منتجات الألبان.

الديناميكية / الحركية الدوائية:

الامتصاص : جيد، الامتصاص، لا يتأثر بالوجبات التي تحتوي على نسبة دهون عالية أو منتجات الألبان.

التوزيع : حجم التوزيع من ٧,٧ إلى ٣,٧ لتر لكل كجم، عادة ما يكن تركيز الدواء في الأنسجة أعلى من البلازما في أنسجة الجهاز التنفسي، خلايا الأنساع، أنسجة الجيوب الأتية.

الإرتباط مع البروتين : ٥٥-٥٠ .

الإخراج: تقريباً يتم إخراج ٧٥% من الجرعة (٢٥%) في البول و (٢٠%) في البول عن شكل دواء غير متغير.

الأيض : كبدی (٥٢% من الجرعة) عن طريق الإقتران بالجلوكورونيد (٢٤%) والسلفات (٢٨%)، الجلوكورونيد عن طريق البول والسلفات عن طريق البول ومنتجات الألبان.

الجرعة، الكبار والبالغين:

إلتهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد : ٤٠٠ ملجم كل ٢٤ ساعة لمدة ٧ أيام.

إلتهاب الشعب الهوائية، عدوى بكتيرية حادة : ٤٠٠ ملجم كل ٢٤ ساعة لمدة ١٠-١٥ أيام.

الالتهاب الرئوي المكتسب بالعدوى : ٤٠٠ ملجم كل ٢٤ ساعة لمدة ١٠ أيام.

المسنين : ليست هناك حاجة تعديل الجرعة بحسب السن، أو لدى المرضى ذوي الوزن المنخفض.

تعديل الجرعة في المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى : لا يحتاجون إلى تعديل في الجرعة ، بما ذلك المرضى الذين بحاجة إلى تسهيل الكلى.

تعديل الجرعة في المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد : لا يوجد معلومات متاحة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد .

المعايير الواجب قياسها أثناء تناول الدواء هي: عدد كريات خلايا الدم البيضاء، مظاهر العدوى .

معلومات للمريض :

ليس من الضروري تناول الأقرص مع الوجبات الغذائية أو أتناؤها خذ العلاج ٤ ساعات قبل أو ٨ ساعات بعد تناولك أي من الأدوية التالية: الفيتامينات، مضادات الحموضة، أو أي أدوية أو منتجات تحتوي على ماغنيسيوم، ألومنيوم، حديد أو الزنك.

قم بيلع العلاج مع كمية كبيرة من السوائل، قم بإبلاغ طبيبك فوراً في حال حدوث أي أعراض للحساسية المفرطة أو في حال حدوث أي إلتهاب أو ألم في الأربطة.

لا يجب إيقاف العلاج حتى إتمامه كما وصف الطبيب المالح، إذا حدث وشيئت تناول القرص قم بتناوله حتى تذكرك إلا إذا حان موعد الجرعة التالية.

التخزين : يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية .

العقوة:

أقرص ماكسيمTM ٤٠٠ ملجم أقرص ، في عبوة تحتوي ٥ أقرص مغلفة.

أقرص ماكسيمTM ٤٠٠ ملجم أقرص ، في عبوة تحتوي ٧ أقرص مغلفة.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
 - إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
 - فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه.
 - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
 - لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

General Medicine

جمعجوم فارما
Jamjoom Pharma

ماكسيمTM مستحضر عالي الجودة من إنتاج

ص.ب. : ٦٦٦٧ - جدة ٢١٤٤٢ - المملكة العربية السعودية