

أزي - ونسTM

أزيترومايسين

شراب معلق

التركيب:

معلق للشراب يحتوي على 200 مجم أزيترومايسين كأساس لكل 5 مل، المواد الفيرمالة: صمغ الزانثين، ثراي صوديوم فوسفات الهيدرات، هيدروكسي بروبيل سيليلوز، طعم الموز، نكهة فاننسي برمازيل، نكهة فريش كو فروت برمازيل، سيلكون داي أوكسيد، سكروز و ماء النقي
التصنيف الدوائي مضاد حيوي، ماركوليد

دواعي الاستعمال:

علاج التهابات الأذن الوسطى الحادة والتي تحدث بسبب هييموفيلاس إنفلونزي وموراكسيلا كاتاراليس وستربتوكوكس نوموني، علاج التهاب الحلق واللوزتين الناتجة عن ستربتوكوكس بيوجينز. علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي البسيطة والمتوسطة. علاج التهاب الجلد وأسجته وعلاج التهاب الرئوي والشعب الهوائية (بدلاً للعلاج الأساسي). وكذلك علاج تقرحات الجهاز التناسلي الناتجة عن الفصائل المتأثرة بالكلاميديا تراكوماتيس وموراكسيلا كاتاراليس وهييموفيلاس إنفلونزي وإستافيلوكوكس أوريس وستربتوكوكس نوموني وميكوبلازما نوماني وبكتيريا ستباسا وعلاج زيادة التهاب الرئوي الناتج عن ضيق الشعب الهوائية (COPD) بسبب هييموفيلاس إنفلونزي وموراكسيلا كاتاراليس وستربتوكوكس بيوجينز.

إستخدامات تحت البحث:

يستخدم لعلاج ميكوبكتريم أقيم المركبة (MAC) لدى مرض فقدان المناعة المكتسبة (HIV) وكذلك للوقاية من التهاب بطانة القلب البكتيري لدى المرضى الذين يشكون من حساسية مع استخدام البنسلين وكذلك لعلاج الأسنان ومع الجراحات.

الحمل : التصنيف (B)

أثبتت الدراسات أن الأزيترومايسين يعبر المشيمة . يستخدم علاجاً بديل للكلاميديا في المرحلة الأخيرة للحمل. لا توجد دراسات كافية على السيدات الحوامل لذا فإنه يستخدم فقط عند الضرورة القصوى.
الرضاعة: يفرز في لبن الأم لذا يستخدم بحذر.

الإحتياطات والتحذيرات:

يجب إتخاذ الحجة اللازمة مع المصابين بقصور وظائف الكبد حيث حدث قصور كبدي مع حدوث بقران أو عدم حدوثه في الأطفال والكبار. ربما يصاحب بخمول وغبان وفقر ونقص مموي وحمى، ينصح بوقف الدواء إذا حدث ذلك . من الممكن أن يمنع أو يؤخر أعراض احتضان السيلان أو الزهري لذلك يجب عمل إختبارات الحساسية والمزرعة قبل البدء في الإستخدام . قد يحدث التهاب كاذب في غشاء القولون لدى المرضى الذين يعالجون بالمضادات الحيوية مثل الماكروليد. يجب استخدام أزيترومايسين بحذر مع المرضى الذين يعانون من خلل شديد في وظائف الكلى. لم يتم إثبات الأمان والفاعلية على الأطفال أقل من 6 شهور الذين يعانون من التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الرئوي، وعلى الأطفال أقل من عامين ممن يعانون من التهاب الحلق واللوزتين.

موانع الإستعمال:

يمنع تناول عقار أزي- ونس في المرضى المعروفين بالحساسية ضد أزيترومايسين أو أي نوع من مجموعة الماكرولايد أو لأي من مكونات المستحضر.
الأعراض الجانبية - إن أزي- ونسTM جيد الإحتمال في الجسم والأعراض التي سيتم ذكرها تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة. (1% إلى 10%) أعراض ذات علاقة بالجهاز الهضمي مثل الإسهال ، الغثيان، التقيؤ (خاصة مع الجرعات العالية). أقل من 1%: قصور كلوي حاد، تحسس شديد، سلوك حاد، فرط الحساسية، خرب وعائي، عدم الإتساق (المحتوي على زيادة ضربات البطين) بقران، قلة السمع، التهاب الأمعاء، الحامى، تشنجات (نادراً)، صداع وبخاصة مع الجرعة الزائدة، التهاب الكبد وضيق أو عته، زيادة الضغط والتهاب الكلى، قلة الكريات البيضاء، التهاب البنكرياس، حكة و التهاب كاذب في غشاء القولون، تشنجات، متلازمة جونسون (نادراً)، تغيير التذوق، قلة الصفائح الدموية، ملتقيين، تغير لون اللسان (نادراً)، الشرى ودوار.

الجرعات الزائدة:

أعراض مثل الغثيان، القيء، الإسهال والتعب الشديد . يوصى باتخاذ الإجراءات العامة لعلاج الأمراض المساندة في هذه الحالات حسب مايلزم.

التفاعلات الدوائية:

التأثير على إنزيم CYP3A4 (P-450) (ضعيف) . وتقليل CYP3A4 (ضعيف) زيادة الأزيثرومايسين مع اليموزايد نتيجة لتأثيره الضار على القلب - يزيد الأزيثرومايسين غالباً من مستويات تاكروليماس، فينتونين، الإرجوت القلوي، الفينيتالين، الستيرويد، الستيروئيد، برومكريبتين، كرابامازيبين، سيكلوسبورين، ديجوكسين، ديسوبراميد وترايزولام لذا يجب أخذ هذا في الإعتبار. على الرغم من أن الأزيترومايسين لم يؤثر على إستجابة / مستويات كرابامازيبين، تيرفينادين، تيرفينادين، الوارافارين مع ذلك يجب أخذ الحذر عند الجمع بين تلك الأدوية. نيليفينايفر قد يزيد مستويات الأزيترومايسين في المصل لذا يجب ملاحظة ظهور أعراض جانبية. انخفاض التأثير يحدث انخفاض في مستوى أزيترومايسين في المصل عند استخدامه مع مضادات الحاموضة التي تحتوي على الألومنيوم والماغنسيوم (بنسبة 24%) على الرغم من أن الإمتصاص ككل لا يتأثر.

الدواء وعلاقته بالوجبات الغذائية:

سرعة ومدى الإمتصاص من المعدة قد يختلف بناء على شكل المستحضر، إعطاء أزي- ونسTM المعلق مع الطعام يزيد الإمتصاص بنسبة 6%

الخواص الفارماكولوجية:

يعمل أزيترومايسين على تثبيط عملية تكوين البروتينات في البكتريا وذلك عن طريق الإتحاد مع جزء من وحدة ريبوزوم S50 كما أنه يمنع انتقال البيبتيد.

خواص التأثيرات الدوائية / الخواص الحركية للدواء:

الإمتصاص : سريع.
التوزيع داخل الجسم : يتم التوزيع بسرعة داخل الأنسجة المختلفة للجلد، الرئتين، البصاق، اللوزتين وعنق الرحم. إختراقه لسائل المخي النخاعي ضعيف، الأيضي عن طريق الكبد.
الإتاحة الحيوية: حوالي 27%
إفراز العمر التنفسي للدواء : 8 ساعات.
يصل الدواء إلى قمة تركيزه في المصل بعد 2-4 ساعات.
الإفراز: من 5-12% عن طريق البول و 5-10% عن طريق البراز وبدون تغيير.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

الأطفال < 6 شهور
التهاب الأذن الرئوي: 10 / مجم / كجم في اليوم الأول (بعد أقصى 500 /مجم / يوم) . ثم 5 /مجم / كجم / يوم مرة واحدة يومياً في الأيام من 2 إلى 5 (بعد أقصى 350 /مجم / يوم) التهاب الأذن الوسطى:
نظام اليوم الواحد: 20 /مجم / كجم كجرعة واحدة (بعد أقصى 100 /مجم) .
نظام الثلاثة أيام: 10 /مجم / كجم جرعة واحدة لمدة 3 أيام (بعد أقصى 500 /مجم / يوم) .
نظام الخمسة أيام: 10 /مجم / كجم في اليوم الأول (بعد أقصى 500 /مجم / يوم) . ثم 5 /مجم / كجم / يوم مرة واحدة يومياً في الأيام من 2 إلى 5 (بعد أقصى 350 /مجم / يوم) .
التهاب الحلق واللوزتين 12 /مجم / كجم مرة واحدة يومياً لمدة 5 أيام (بعد أقصى 500 /مجم / يوم) .
أوقاية من التهاب بطانة القلب: 15 /مجم / كجم قبل الإجراءات بساعة.

المرضى المصابين بقصور في وظائف الكلى:

يستخدم بحرص مع المرضى الذين يقل معدل إستخلاص الكرياتينين لديهم عن 10 مل / دقيقة.

الحيوانات:

معلق متوفر في ثلاثة أحجام:
زجاجة 150 مل 3000 /مجم / 5 مل
زجاجة 225 مل 2000 /مجم / 5 مل
زجاجة 300 مل 2000 /مجم / 5 مل

التخزين:

يحفظ مسحوق الأزيترومايسين تحت درجة حرارة 25 درجة مئوية، بعد إضافة الماء (محلول) يحفظ في درجة حرارة ما بين 15 و 25 درجة مئوية.

إرشادات الإستعمال:

1- رج الزجاجة المحتوية على المسحوق قبل إضافة الماء.
2- أضف الماء الفوق للعلبة.
3- قبل إستعمال المعلق رج الزجاجة جيداً.
تخلص من أي محلول غير مستخدم بعد 5 أيام من فتحه.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينقعه وضره.
- لانقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيادلة العرب

General MedicineTM

أزي - ونس ، مستحضر عالي الجودة من إنتاج

مجموع فارما
Jamjoom Pharma

ص.ب: 6277 - جدة 21442 - المملكة العربية السعودية

06-21-11/01 Rev-1096217321