

## تايلينول®

تايلينول تحميلات ١٠٠ ملجم و ٢٠٠ ملجم و ٣٥٠ ملجم للأطفال

### تركيب الدواء

المادة الفعالة : باراسيتامول (أسيتامينوفين).

### قائمة المكونات:

مضادات الأكسدة : بيوتيل هيدروكسي أنيسول (إي ٣٢٠)، بيوتيل هيدروكسي تولوين (إي ٣٢١) مسوغات أخرى : سيليكات غروانية، بوليمسوربات ٢٠، زيت نباتي

### دواعي الاستعمال:

- يستخدم تايلينول تحميلات للتسكين المؤقت للأوجاع والآلام البسيطة والمتوسطة الشدة مثل:  
الصداع - احتقان الحلق - أوجاع الأسنان (وتشمل آلام التنسج) - الأوجاع والآلام البسيطة والتوسطة الشدة الناتجة من نزلات البرد العادية والأنفلونزا.

- خفض الحرارة (بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة عقب تلقي اللقاحات).

### الجرعة / طريقة الاستعمال:

يجب دائماً أن يخضع إعطاء تحميلات تايلينول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر وكذلك استعماله لأكثر من ثلاثة أيام في الأطفال على إختلاف أعمارهم، الرقابة الطبية المستمرة، في الحالات التي يجب فيها وزن الطفل خارج نطاق الوزن المناسب مع المدى العمري المصاحب والمين أثناءه، يجب تحديد الجرعة على أساس وزن الجسم. يتراوح الفاصل الزمني بين الجرعات في كل الأعمار بين ٤ إلى ٨ ساعات.

المدى العمري	وزن الجسم	الجرعة	أقصى جرعة / يوم
١٢-٣ شهراً	تحميلات ١٠٠ ملجم		
٦-٢ أشهر	٧٠٥ كجم	تحميلة واحدة ٣-٢ مرات يومياً	أربعة تحميلات (٤٠٠ ملجم) / يوم
١٢-٦ شهراً	١٠٠ - ٤ كجم	تحميلة واحدة ٤-٣ مرات يومياً	خمسة تحميلات (٥٠٠ ملجم) / يوم
٣-٦ سنوات	٢٠٠ تحميلات ملجم		
٣-٦ سنوات	١٥٠ - ١٠ كجم	تحميلة واحدة ٣-٢ مرات يومياً	٤-٣ تحميلات (٦٠٠ ملجم) / يوم
٦-٣ سنوات	٢٢٠ - ١٥ كجم	تحميلة واحدة ٤-٣ مرات يومياً	٥-٤ تحميلات (٨٠٠ ملجم) / يوم
٦-٦ سنة	تحميلات ٣٥٠ ملجم		
٦-٦ سنوات	٢٢٠ - ٢٢ كجم	تحميلة واحدة ٣-٢ مرات يومياً	٤-٣ تحميلات (١٤٠٠ ملجم) / يوم
١٢-٩ سنة	٤٠٠ - ٢٠ كجم	تحميلة واحدة ٤-٣ مرات يومياً	٦-٥ تحميلات (١٧٥٠ ملجم) / يوم

### تعليمات خاصة بالاستعمال

- قم بتزييت الطرف الذئب للتحميلات إما باستخدام الماء أو زيت ماني.

- أدخل الطرف المزيت لتحميلات في فتحة الشرج  
- ادفعها إلى الداخل مستخدماً أصبع السبابة (أو إصبع الخنصر للأطفال الأصغر سنًا) ما استمر في الضغط على جدار المستقيم لبضععة ثوانٍ فسوف تحافظ هذه الطريقة على بقاء التحميلة في مكانها.

### موانع الاستعمال:

يحظر استخدام الدواء إذا كان الطفل مصاباً بقرط الحساسية لمادة باراسيتامول (أسيتامينوفين) أو أي من المسوغات.

### تحذيرات واحتياطات خاصة متعلقة بالاستعمال

- لا تستعمل تايلينول تحميلات تزامناً مع أي مسكن آخر يحتوي على مادة باراسيتامول (أسيتامينوفين).

- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

- إذا استمر الألم أو الحمى أو تطورت أي منهما إلى الأسوأ أو ظهرت أعراض جديدة، فإنه يجب المبادرة باستشارة الطبيب. فقد تكون تلك الأعراض إشارات إلى حالة مرضية خطيرة.

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

- التحذير من تجاوز الجرعة: إن تناول جرعة أكبر من الجرعة المسموح بها (تجاوز الجرعة) قد يسبب تقيؤاً باليد. في حالة حدوث تجاوز الجرعة، عليك بطلب المساعدة الطبية على الفور حتى وإن لم تحظ ظهور أية علامات أو أعراض.

- استشر الطبيب عند وجود قصور في وظائف الكبد و وظائف الشديدة وظائف الكلى قبل استخدام هذا المنتج

### استعمال الدواء مع وجود مرض كبدى

يمكن استخدام باراسيتامول في المرضى المصابين بمرض كبدى وقد تمت دراسة استعماله كجرعة واحدة أو جرعات متعددة في المرضى من البالغين الذين يعانون من مرض كبدى مزمن مستقر. بعد تناول جرعة واحدة من باراسيتامول تقدر بـ ١٠٠ ملجم/كجم، لم تظهر صورة الحركة الدوائية للدواء اختلافاً ذا أهمية فيما يتعلق بالمرضى من الأطفال المصابين بمرض كبدى بسيط أو متوسط الشدة أو شديد.

### استعمال الدواء مع وجود مرض كلوى

لا يوجد ما يدل على حدوث تغير في التأييض الكبدى في المرضى المصابين بمرض كلوى. وتدل معلومات منسقة من الإفشاف عليها بصورة محكمة على أنه يمكن استخدام باراسيتامول في المرضى المصابين بقتل كلوى يتراوح بين المتوسط والشديد دون الحاجة إلى تعديل الجرعة.

### التفاعلات

إن تناول المزامن لمادة باراسيتامول مع العقاقير المضادة للتشنج بالجرعات الموصى بها، لا يزيد من احتمالية حدوث تشنم كبدى.

### التأثيرات غير الرغوية

إن التفاعلات الدوائية العكسية التي تم تعريفها أثناء تجربة ما بعد التسويق والمصاحبة لتحويل العلاجية من باراسيتامول تم إرجاعها أثناء بحسب فة تكرار حيث تم تقديرها من معدلات التحويل التلقائي.

- اضطرابات الجهاز الهضمي

- اضطرابات الجهد والتشنج خت الجهد

- تآزر جدا (>١٠٠٠٠٠ /) وتشمل التقارير المنزلة: - الفعالت الاستهلاكي فربط الحساسية

- تآزر جدا (>١٠٠٠٠٠ /) وتشمل التقارير المنزلة: - شرى، طفح جلدي حكي وطفح جلدي.

### تجاوز الجرعة

قد يسبب باراسيتامول - في حالة تناول جرعة كبيرة جداً - تشنم كبدى، وذلك فإن الرعاية الطبية السريعة تكون في غاية الأهمية حتى وإن لم تكن هناك علامات أو أعراض ظاهرة. قد تشمل الأعراض المبركة - التي تعقب تناول جرعة زائدة يتمثل أن تسبب سمية كبدية - ما يلي: فقدان الشهية للطعام والغثان والتقيؤ والتقرح والشحوب والأضياء العام. قد لا تظهر الدلائل السرورية والخبرية السمية الكبدية حتى ينضي ٤٨ إلى ٧٢ ساعة من تناول الجرعة. في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً تجاوز الجرعة المعتاد (>١٠٠٠ ملجم/كجم) لا يصاحبه تشنم كبدى إذا زادت الجرعة عن ٢٠٠٠-٩٥٠ ملجم/كجم أو كانت الكمية التي تم تناولها غير معروفة، فإنه يجب قياس مستوى مادة الباراسيتامول في البلازما بأسرع ما يمكن ولكن ليس قبل مرور أربع ساعات على تناول الجرعة. إذا تم قياس مستوى مادة باراسيتامول في النصل خلال شان ساعات على ابتلاع الجرعة، فإنه ليس من اللازم بدء العلاج بعقار أستيتيل سيستاتين إلى حين الحصول على نتيجة القياس. في حالة مرور ما يقرب من ٨ ساعات بعد تناول الدواء، فإنه يجب البدء فوراً بالعلاج بعقار أستيتيل سيستاتين. إذا لم يكن في الإمكان قياس مستوى مادة الباراسيتامول في المصل وكانت كمية الباراسيتامول التي قد تم تناولها قد تجاوزت ١٥٠ ملجم/كجم، فإنه يجب بدء العلاج بعقار أستيتيل سيستاتين واستمرار فيه لحين اكتمال إعطاء مجموعة الجرعات المقررة.

معلومات أخرى  
يحظر إعطاء الأدوية التي تحتوي على مادة باراسيتامول للأطفال الذين تناولوا الكحول عن طريق الخطأ.

### فترة الصلاحية

يحظر استخدام تايلينول للأطفال بعد التاريخ المشار إليه بالأحرف «EXP» على العبوة.

### احتياطات خاصة التخزين

يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م

تحفظ الأشربة في العبوة الخارجية

### احتياطات خاصة التعامل مع الدواء

يتحول تايلينول تحميلات للأطفال إلى مادة سائلة أو بلبين إذا زادت درجة الحرارة عن ٣٥ درجة مئوية. لإعادة جفها جاهزة للاستعمال، قم بتبريدها بوضعهما تحت ماء بارد جار. هذه الطريقة لا تغير من خواص التحميلات. أثناء تبريد التحميلات، تكد من أن طرفه المستقر موجه إلى الأسفل هذه الطريقة تضمن أن تستعيد التحميلات صلابتها على الهيئة اللازمة للاستعمال.

العيوات  
تحميلات تايلينول ١٠٠ ملجم: (عبوة بها ١٠ تحميلات)  
تحميلات تايلينول ٢٠٠ ملجم: (عبوة بها ١٠ تحميلات)  
تحميلات تايلينول ٣٥٠ ملجم: (عبوة بها ١٠ تحميلات)

### الشركة المصنعة:

لوسوميديكامينتاسيد، تيكنيكا فارما سويتكا، س. ا. استرادا كونسيليري بيديروسو ب ٦٩ كراول دي يابيكوس ٥٥٠ - - ٦٧٣٠ ياركارينا، البرينغال.

الشركة مالكة حق التسويق في سويسرا:

جانسن سيلاج ج.ج. ١٦٤٠ بار سويسرا

### تاريخ مراجعة النص

٢٠١٠ مارس

### ( إن هذا الدواء )

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافًا للتعليمات بعرضه للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الطبيب الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما اللذين هما اللذين بالادواء وينفعه وضرمه.

- لا تعلق مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- مجلس وزراء الصحة العرب، واتحاد الصيادلة العرب.