

فيفادول[®] تحاميل

خافض للحرارة ومسكن للألم للأطفال.

التكوين :

تحاميل 100، 200، 350 ملجم باراسيتامول.

التأثيرات الويائية :

يتميز باراسيتامول بغواصه المسكنة والمخافضة للحرارة المشابهة للأسيتيل سالييلات دون مشاركة في العديد من الأعراض الجانبية.

دواعي الاستعمال :

يستعمل فيفادول تحاميل للرضع والأطفال كخافض للحرارة ومسكن للألم في الحالات المساحبة للتهاب اللوزتين، الزكام والإنفلونزا وفاعلات ما بعد التغذية والصراع.

يستعمل أيضاً فيفادول تحاميل لتخفيف الآلام الناتجة عن التسنين عند الأطفال وكذلك خلع الأسنان وبعد استئصال اللوزتين واللحمية.

تعليمات عند الاستعمال :

يجب إعطاء فيفادول للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر فقط عندما يوصف بواسطة طبيب. وينطبق نفس الشيء على الأطفال في أية مرحلة من العمر في حالة استعمال الدواء لفترة أطول من العشرة أيام.
تحاميل فيفادول تصبح سائلة أو تلين إذا حفظت عند درجات حرارة أعلى من 35°م إلا أن جودتها النوعية لا تتأثر مطلقاً. فالترديد في ماء بارد جارٍ يجعلها هينة للاستعمال مرة أخرى.

الجرعة وكيفية الاستعمال :

3 - 6 أشهر : تحميلة 100 ملجم، 2 - 3 مرات يوميا.

6 - 12 شهر : تحميلة 100 ملجم، 3 - 4 مرات يوميا.

من 1 إلى 3 سنوات : تحميلة 200 ملجم، 2 - 3 مرات يوميا.

من 3 إلى 6 سنوات : تحميلة 200 ملجم، 3 - 4 مرات يوميا.

فوق 6 سنوات : تحميلة 350 ملجم، 2 - 4 مرات يوميا.

موانع الاستعمال :

الحساسية لمادة باراسيتامول.

تحذيرات :

لا تتجاوز الجرعة المحدودة.

قد تحدث أعراض جسيمة بالكبد وذلك في حالة تناول طفلك جرعة يومية أكثر من المقررة.

تغيير خاص بالتهاب الحلق: يجب استشارة الطبيب المعالج في الحال وذلك في حالة حدوث التهاب الحلق بصورة خطيرة أو استمراره لمدة تزيد عن يومين أو إذا كان مصحوباً أو تم صدوره متبوعاً بحمى، صداع، طفح جلدي، غثيان، أو قيء.

لا يجوز استعمال هذا المستحضر مع منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول.

التحليل الخاص باستخدام الكحول: يجب توخي الحذر في حالة التعرض للكحول بشكل مستمر، إذ أن تناول الكحول ومادة الباراسيتامول سوياً قد يتسبب في تضرر الكبد.

استشر الطبيب قبل تناول طفلك هذا هذا الدواء في حالة ما إذا كان يعاني من قصور شديد في وظائف الكبد أو الكلى.

يجب التوقف عن تناول الدواء واستشارة الطبيب في حالة استمرار الآلام أو زيادة حدتها لأكثر من 5 أيام، أو استمرار ارتفاع الحرارة أو زيادة حدتها لأكثر من 3 أيام، أو في حالة ظهور أعراض أخرى مثل احمرار الجفد، طفح جلدي، أو تورم.

التفاعل مع الأدوية الأخرى والأنواع الأخرى من التفاعلات:

مضادات التخثر: إن الاستخدام الإضيادي والممتد للباراسيتامول قد يعزز من فعالية الوارفارين.

قد يزيد تأثير باراسيتامول على الكبد عند الاستخدام المصاحب للكحول ولأدوية معينة مثل (مجموعة علاجات الباربيتورات، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات) والتي تعزز أيضاً باراسيتامول في الكبد.

التأثيرات الجانبية :

إذا استعمل باراسيتامول بجرعاته المحددة فإنه لا يحدث أية آثار جانبية تذكر.

قد يحدث طفح جلدي طفيف (وتشمل أعراض في الدم (وتشمل نقص الصفائح الدموية، الغموية، كريات الدم البيضاء، نقص الخلايا المتعادلة).

معلومات مهمة: قد يحدث التلف الكبدي (و التالف الكلوي ولكن بمعدلات أقل) في حالة فرط الجرعة.

الجرعة المفرطة :

إن استخدام جرعة مفرطة تتجاوز 10 جم من الباراسيتامول قد يسبب ضرراً للكبد. الأعراض المبكرة لهذه الأعراض هي شعوب لون البشرة، غثيان، تقيؤ، زيادة في التعرق وتوعلت صحي بشكل عام.

قد يؤدي فرط الجرعة من باراسيتامول إلى حدوث ضرر شديد بالكبد. وفي بعض الأحيان قد يحدث نخر حاد بالتهيبات الكلوية.

يجب اتخاذ تدابير طبية فورية في حالة الجرعة المفرطة. حتى وإن لم تظهر أعراض الجرعة المفرطة. يلزم تناول الفحم النشط وذلك عند مرور أقل من ساعة على تناول باراسيتامول. قد لا تظهر الأعراض السريعة والدلائل المخبرية لتضرر الكبد قبل مرور 48 إلى 72 ساعة على تناول الجرعة الزائدة. يجب علاج حالة الجرعة الزائدة فوراً وذلك بغسيل المعدة بتجعه استخدام أسيتيل سيستين أو ميتيونين عن طريق الحقن الوريدي وعدم انتظار نتائج فحص مستوى الباراسيتامول في البلازما.

يترتب على تحليل مستوى الباراسيتامول في البلازما والمدة الزمنية التي انتقضت منذ تناول الجرعة الزائدة إمكانية تناول المادة المضادة للتسمم. في حالة وجود اشياء حدثت استخدام جرعة زائدة من الباراسيتامول، يجب توفير رعاية طبية فورية للبالغين والأطفال على السواء، حتى وإن لم تظهر أعراض أو علامات تدل على ذلك. كما يجب أن تتوفر تدابير داعمة عامة.

الحفظ :

يحفظ في التلاجة لمدة 30 دقيقة قبل الاستعمال.

العصوات المتوفرة :

يتوفر فيفادول على هيئة تحاميل بتركيز 100، 200، و 350 ملجم.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات بحرصك للحفظ.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ويتبعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تتركه للأدوية في متناول أيدي الأطفال

يجلس وزراء الصحة العرب
والنقاد الصيدالة العرب

إنتاج الدوائية

مصنع الأدوية بالقصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

المملكة العربية السعودية.