

علاج نزلات البرد والزكام

التركيب:

تحتوي كل ٥ مل ترايبيروليدين هيدروكلورايد (دستور الأدوية البريطانية) ١.٢٥ ملجم وسودوافيدرين هيدروكلورايد (دستور الأدوية البريطانية) ٣٠ ملجم.

المواد الإضافية: جليسول، محلول سوريتول، سكرين صوديوم، صوديوم ميتايل هيدروكسي بنزويت، صوديوم بنزويت، إيثانول، صوديوم كلورايد، نكهة الكرز وماء مطهر.

الأثر الطبي:

يقوم شراب فلو-كير بمعالجة أعراض الأنفلونزا حيث أنه يقوم بتخفيف الاحتقان بشكل سريع وذلك خلال ٢٠ دقيقة. كما أنه يقلل العطس من خلال مفعوله المضاد للحساسية.

دواعي الاستعمال:

ينصح باستعمال شراب فلو-كير لمعالجة التهاب الأنف الحاد أو الالتهاب التحسسي للأنف الناتج عن استنشاق الغبار، حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات، كما ينصح باستعماله في حالات الأنفلونزا وأعراضها المصاحبة.

موانع الاستعمال:

يفضل أن لا يستعمل مركب ترايبيروليدين وسودوافيدرين مع:
 • المرضى تحت المعالجة بمثبطات أو أكسيداز الأمينات الأحادية (مضادات الاكتئاب)، أو المعالجة بالفيروزوليدون (المطهرات البولية).
 • المرضى الذين يعانون من اضطرابات كبدية حادة، الجلوكوما (الزاوية المغلقة) في العين، الحساسية المفرطة لأحد من مكوناته أو في حالة الورم الغدي البروستاتي.
 • لعلاج أمراض البرد والسعال للأطفال أقل من ست سنوات من العمر.

الاحتياطات:

يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال في الحالات التالية:
 • الأمراض القلبية، الإفراف في إفراز الغدة الدرقية، مرض السكر، الإختلال العقلي، ارتفاع ضغط الدم أو الاضطرابات الكلوية والكبدية.
 • يفضل عدم استعمال مركب ترايبيروليدين وسودوافيدرين مع المرضى الذين يستخدمون الحبوب النومة (خاصة الباربيتوريت) أو مع متعاطي الكحول.

التحذيرات:

• إذا لم تتحسن الأعراض خلال سبعة أيام أو إذا كانت الأعراض مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة فيجب مراجعة الطبيب.
 • لا يصرف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

الأثار الجانبية:

هذا الدواء قد يسبب بعض الأثار الجانبية مثل:
 أعراض جانبية جلدية والتي تختفي بعد إيقاف المعالجة، خفقان، جفاف الفم، غثيان، تقيؤ، قلق، مشاكل في النوم وإثارات وهذه الأعراض تختفي بعد إيقاف المعالجة.

الاستعمال أثناء الحمل والرضاعة:

يجب استشارة الطبيب قبل استعماله خلال فترة الحمل والرضاعة.

الجرعات:

البالغون والأطفال أكبر من ١٢ سنة: ١٠ مل ٣ مرات في اليوم.

الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنة: ٥ مل ٢ مرات في اليوم.

لا يصرف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

فترة العلاج:

- فترة العلاج تتراوح ما بين ٥ إلى ٦ أيام.
- يمكن إيقاف المعالجة عند اختفاء الأعراض.

التخزين:

يخفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥ - ٢٥) درجة مئوية.
 يجب عدم استعمال الدواء بعد انتهاء صلاحيته.

الشكل الصيدلاني:

شراب:

قارورة تحتوي على ١٠٠ مل.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مشاكل في الجودة:

المركز الوطني للتنظف والسلامة الدوائية:

• فاكس: ٠٦٦٢-٠٢-٠٦٦٦

• البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.s.gov.sa

• الموقع الإلكتروني: www.sfd.s.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالتطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينبغي وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العربي

واتحاد الصيدلة العربي



الرياضي
فارما

إنتاج الرياض فارما

شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة

الرياض - المملكة العربية السعودية

الرياضي
فارما