

التركيب:

شراب: تحتوي كل ٥ مل على أمبروكسول هيدروكلورايد (دستور الأدوية البريطاني) ١٥ ملجم.

مكونات أخرى: حامض بينزويك، محلول سوريبتول ٧٠٪ لا كريستالي، جلسيرول، حامض سيتريك، نكهة كريم البرتقال (٢٢-١١٠-٣٦) ومياه منقاة.

الأثر الطبي:

يعمل ريابروكسول على زيادة إفراز المجرى التنفسي وكذلك يعمل على تحفيز إنتاج العنصر الفعال السطحي وينبه النشاط الهديبي.

وقد تبين تحسين التصفية المخاطية الهدبية في الدراسات الدوائية الإكلينيكية. ويؤدي إلى تحسن إفراز السائل والتصفية المخاطية الهدبية إلى تسهيل طرد البلغم وتخفيف السعال.

دواعي الاستعمال:

يستعمل الريابروكسول كمذيب للبلغم.

موانع الاستعمال:

لا ينبغي استعمال أمبروكسول هيدروكلورايد للمرضى الذين يعرف أن لديهم حساسية مفرطة لهذا الدواء.

التفاعلات الدوائية:

عند إعطاء الأمبروكسول مع المضادات الحيوية (أموكسيلين، سيفيوروكسيم، اريثروميسين ودوكسيسيكلين) فإنه قد يؤدي إلى زيادة تركيز المضاد الحيوي في النسيج الرئوي. لم ترد تقارير عن أي تأثيرات سلبية ذات دلالة إكلينيكية بالتداخل مع أدوية أخرى.

الأثار الجانبية:

نادراً ما يحدث آثار جانبية كالتهابات التحسسية وأعراض جانبية خفيفة في القناة الهضمية.

الاحتياطات:

يجب أن يؤخذ أمبروكسول هيدروكلورايد أثناء تناول الوجبات.

الاستعمال أثناء الحمل والرضاعة:

يجب مراعاة الاحتياطات المعتادة بشأن استعمال الأدوية أثناء الحمل، خاصة في الشهور الثلاثة الأولى. الدواء يفرز في حليب الأم لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الرضيع عند استعمال الجرعات العلاجية، ولكن في كلتا الحالتين يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

الجرعات:

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة: ١٠ مل ٣ مرات يومياً. لعلاج الاضطرابات الحادة بالمجرى التنفسي وللعلاج الابتدائي للحالات المزمنة حتى ١٤ يوماً يمكن زيادة الجرعة إلى ٢٠ مل مرتين يومياً.

الأطفال ٦ - ١٢ سنة: ٥ مل ٢ - ٣ مرات يومياً.

الأطفال ٢ - ٦ سنوات: ٢.٥ مل ٣ مرات يومياً.

الأطفال أقل من سنتين: ٢.٥ مل مرتين يومياً.

الجرعات الزائدة:

الجرعات المفرطة قد تؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب، إحساس بالقىء، القيء، وانخفاض في ضغط الدم. أما في حالة التجاوز الشديد للجرعة سواء العارضي أو المتعدي، فيجب مراقبة الجهاز القلبي الوعائي وعند اللزوم، يجب علاج الأعراض المترتبة على زيادة الجرعة.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥-٢٥) درجة مئوية.

يجب عدم استعمال الدواء بعد انتهاء صلاحيته.

الأشكال الصيدلانية:

شراب: قارورة تحتوي على ١٠٠ مل.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مشاكل في الجودة:
المركز الوطني للتفتيش والسلامة الدوائية:
٠ فاكس: ٤٦٦٢-٠٢٥-١٠٠٠
٠ البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa
٠ الموقع الإلكتروني: www.sfd.a.gov.sa/npc

إن هبذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغي وضروره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالنة العرب



إنتاج الرياض فارما

شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة
 الرياض - المملكة العربية السعودية