

التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف على:

١٠ ملجم ثنائي هيدروكلوريد السيتريرزين.

السواغات: لاکتوز، سيليلوز، بوفيدون، ستيرات المغنيسيوم، ثنائي أوكسيد السيليكون، هيدروكسي برويل ميثيل سيليلوز، تالك، بولي إيثيلين الجلايكول و E171.

الخواص:

ارتيز هو عامل مضاد للحساسية و مناقض لمستقبلات الهيستامين H1 خالي من أي تأثيرات يعتقد بها لمضاد إفراز الكولين و مضاد إفراز السيروتينين. كما يقلل السيتريرزين من استرجاع الكريات البيضاء الحمضة الناتجة عن تفاعل الأجسام والمواد المضادة، يصل لأعلى مستوى له في الدم خلال ساعة واحدة بعد أخذه عن طريق الفم. يبلغ عمر النصف النهائي ١٠ ساعات تقريباً عند البالغين، ٦ ساعات عند الأطفال ما بين ٦ إلى ١٢ سنة. يكون مستوى البلازما خطياً حسب الجرعة المعطاة. نسبة عالية من السيتريرزين ترتبط ببروتينات البلازما البثرية.

دواعي الاستعمال:

يوصف ارتيز لمعالجة حالات الحساسية المستجيبة لمضادات الهيستامين H1. - التنفسية: التهاب الأنف التحسسي (الفصلي، السنوي)، حمى القش. - الجلدية: حالات تحسس الجلد المصاحبة للحكة مثل الشرى.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال ارتيز للمرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من مكوناته. لا يجب إعطاؤه للمرضعات حيث أن المادة الفعالة تفرز في حليب الأم، و لا يجب إعطاؤه في حالة الحمل. لا يستخدم هذا الدواء لعلاج أمراض البرد و السعال للأطفال أقل من ست سنوات من العمر.

الاحتياطات:

من الضروري أخذ الاحتياطات و ضبط الجرعة عند المرضى المصابين بخلل متوسط أو شديد في الوظائف الكلوية، المرضى الذين يحتاجون لعمليات ديلزة، و المرضى المصابين بخلل في وظائف الكبد.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

لم تثبت الدراسات حدوث أي تفاعلات مع الدايازيبام و السيميتيدين. لا توجد تفاعلات دائنية مع الثيوفيللين (عند جرعة منخفضة)، الأزيثرومايسين، السودوافيدرين، الكيتوكونازول أو الأيرثرومايسين. تسبب جرعة ٤٠٠ ملجم ثيوفيللين في انخفاض بسيط في تصفية السيتريرزين. الاستعمال المتزامن مع مثبطات الجهاز العصبي المركزي و مضادات المنبهات بالكولين يزيد من سميتهما.

المحاذير:

احذر قيادة السيارة، تشغيل آلات موضعية خطيرة، شرب الكحول أو استعمال مثبطات الجهاز العصبي المركزي بشكل متزامن مع تناول السيتريرزين لأن ذلك يزيد من قلة الانتباه و الخلل في أداء الجهاز العصبي المركزي.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

البالغون و الأطفال أكبر من ١٢ سنة: قرص واحد يومياً. الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنة: نصف قرص مرتين يومياً أو قرص واحد مرة يومياً.

زيادة الجرعة:

يمكن أن يكون النعاس عارض لزيادة الجرعة عند البالغين، عند الأطفال يمكن أن يحدث تهيج. يجب أن يشمل العلاج علاج الأعراض و المعالجة المساندة مع عمل غسيل للمعدة.

الأثار الجانبية:

أثار خفيفة و مؤقتة مثل: صداع، دوار، نعاس، تهيج، جفاف في الفم، زيادة الشهية، عصبية و اضطراب معدي معوي. يمكن حدوث تفاعلات حساسية متضمنة تفاعلات الجلد و الحزب الوعائي. يجب مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلاني في حالة ظهور أي عرض جانبي.

الاحتياطات الصيدلانية:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥-٣٠ م).

لا تستعمل الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته أو عند ملاحظة أي علامة تلف فيه.

العبوات:

عبوة تحتوي ١٠ أقراص.

تتوفر عبوات خاصة بالمستشفيات.

Ⓞ علامة تجارية

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الدواء وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضروره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيداللة العرب.

إنتاج: شركة تبوك للصناعات الدوائية، ص.ب ٣١٣٣، تبوك-المملكة العربية السعودية

