

لعلاج التهاب المفاصل وحمايتها

التركيب:

أقراص:

يحتوي كل قرص مغلف على جلوكوسمين سلفيت بوتاسيوم كلورايد (دستور الأدوية الأمريكي) ما يعادل جلوكوسمين سلفيت ٥٠٠ ملجم وكوندرويتين سلفيت صوديوم (دستور الأدوية الأمريكي) ما يعادل كوندرويتين سلفيت ٤٠٠ ملجم. المواد الإضافية: مايكروكريستلين سليولوز، كروسكارميلوز صوديوم، كولويد سليكا لامائي، مغنيسيوم ستيريت ومادة مغلفة (أوبادري أي ام بي أصفر).

خصائص:

يعتبر جلوكوسمين سلفيت من السكريات الأمينية الأولية التي يتم تصنيعها في الجسم ويحتوي على الجلوكوز والحمض الأميني، والجلوتامين من الأحماض الأمينية الأساسية الذي يزود العظم، الغضاريف، الجلد وأنسجة أخرى بالبناء الصحيح. يساعد تصنيع الغضاريف وهي جزء من بروتين المادة اللغيفية التي تربط المفاصل مع بعضها عن طريق تحسين وظيفة المفصل ويساعد على تقليل الألم المصاحب لالتهاب المفاصل.

يعتبر كوندرويتين سلفيت من الجليكوسامينوجليكينات المتوفرة طبيعياً في الغضاريف، العظم وصمامات القلب. يسهل الكوندرويتين الانزلاق في المفاصل عن طريق كسح المواد المغذية على هيئة سائل إلى الغضاريف فيعمل السائل كإسفنجة لامتصاص الصدمات.

جلوكوسمين وكوندرويتين يعملان على تحفيز إعادة تكوين الغضاريف وحفظ التوازن بين عمليتي الهدم والبناء في الغضاريف عن طريق التحكم في الأنزيمات الضارة لتكوينها.

دواعي الاستعمال:

كإعلاج مساعد للتهاب العظمي المفصلي.

موانع الحساسية:

الحساسية من المحار.

الاحتياطات:

- من الممكن أن يغير من معدل السكر في الدم (لذلك يجب ضبط تركيز السكر في الدم قبل العلاج وبشكل دوري بعد ذلك).
- من الممكن أن يؤدي إلى مرض القلب الوعائي (لذلك يجب مراقبة معدل الكوليسترول في الدم).
- يستخدم بحذر للمرضى الذين يعانون من داء الربو.

الأثار الجانبية:

غثيان، ألم في البطن، عسر الهضم، إسهال، إمساك، صداع وتعب. الأقل شيوعاً: تهيج وطفح جلدي، حكة، زيادة نسبة الكوليسترول في الدم تم تسجيلها أيضاً.

التفاعلات الدوائية:

جلوكوسمين يزيد من فعالية مضاد التخثر للوارفرين (لذلك يجب الامتناع عن تناولهما في نفس الوقت).

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة:

لا توجد معلومات، لذلك يجب عدم تناوله خلال فترة الحمل والرضاعة.

الجرعات:

قرص واحد ثلاث مرات يومياً أو حسب إرشادات الطبيب.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥-٢٥) درجة مئوية، بعيداً عن الضوء.

الشكل الصيدلاني:

أقراص: عبوات تحتوي على (٣٠) قرص مغلف من جلوكوسمين بلس.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مشاكل في الجودة:

المركز الوطني للتحقق والسلامة الدوائية:

٠ فاكس: ٧٦٦٢-٢٠٥-١-٩٦٦

٠ البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

٠ الموقع الإلكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يمرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من لقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب



إنتاج الرياض فارما

شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة

الرياض - المملكة العربية السعودية