

سقاتن ١٠ ملج - ٢٠ ملج - ٤٠ ملج

أشرف مقلقة نادر تركيز ١٠ ملج ، ٢٠ ملج ، ٤٠ ملج من السيفلانساتين.

الشكل الصيدلاني

أقراص مقلقة.

الإستعمالات

علاج مرض التهاب المفاصل الروماتويدي نوبأب الإرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

خلوف حديد متوطن في البشران التاجي والإحشاء الغير مهلك.

خلوف حديد المتعرضات ترويم (أصبة القلب (أرضي جنوبية أكاديمية وتقييم وعائي عن طريق الجلد للشران

التاجي).

يستخدم سفاتن مع الحقبة الغذائية خصوصاً نخضت الكورتيزون الإجمالي المرغوبة، وكورتيزون البروتين الشحمي

بغض الكافية، والبروفين الشحمي نوبأب (إرتداد الحاد المرضي الذي يتجاوز مستوى الكورتيزون لديهم في الحصل بعد تناول الطعام ٥ ، ٥

ملحوظة : والتهالسين والبروفين صفة واحدة وذلك للخلط من

344 P450 عند الجرعات المألوية إلا إذا كانت الفائدة من تناول العلاج المتزامن تفوق المخاطرة المتزايدة (أنظر إحتياطات وتحذيرات خاصة بالإستعمال).

مشتقات الكورمان: لوحظ في دراستين سربيتين أن سيفمستاتين يحدث نشاطاً متوسطاً في تأثير مشتقات الكورمان وفي المرضى الذين يتناولون مشتقات الكورمان، يجب تحديد وقت طليمة التخثر قبل البدء بتناول سيفمستاتين، وأن قدر بقدر التامة بدأ بداية العلاج لتأكد من عدم وجود تغير واضح في وقت طليمة التخثر. عند بداية هذا الوقت، يمكن مراقبة الطليمة على فترات متباعدة أثناء المرضي بها، وإذا تغيرت جرعة سيفمستاتين، فيجب إعادة نفس الحفظوات، وبخاصة العلاج بالسيفمستاتين حدوث أي ترفيف أو تغير في وقت طليمة التخثر في المرضى الذين لا يتناولون مضادات التخثر. وفي المرضى الذين يتناولون في وقت مشتقات الكورمان والتبرجات المحفزة للكورتيزون، يجب إذا تم إيقاف الأخير، قد يتعرض المرضى لخطر الإصابة بالترنق، لذلك يلزم عدم إيقاف الترونج، تعديل الجر الكورمان قبل بدء العلاج بالسيفمستاتين.

التبويرين: مفاد التبويرين يعبركم الدواء التي تستقبل نظام (P450) للسيفمستاتين تأثير بسيط وقد يحسسون على التغير في التوزيع الأيوني للتبويرين في المرضى (المصابين بالسيفمستاتين متزامن الكورتيزون في الدم).

يوروفانولول: في التطويقين الأصحاء، له يوجد أي مضاربات سريرية واضحة من ناحية حركة الدواء أو تداخلية مع تناول جرعات مفردة من سفاتن والبروبرانولول في نفس الوقت.

ديجوكسين: أي إعطاء سفاتن مع ديجوكسين في نفس الوقت للمتعولين للأصحاء إلى ارتفاع بسيط (أقل من ٠,٢ ملغم/ل) في تركيز الدواء، (بعد قياس التفاضل الإجماعي للجديوكسين في) الحاصل صفة بإعطاء العلاج الوهمي في نفس الوقت مع ديجوكسين.

علاج حرقان: عند أخذ الحقنة عند سفاتن مع نفس الوقت مع أدوية مثبطة للمناعة، أو مع التراكول أو أوساين أو كورتيزون وإحتياطات خاصة بالإستخدام. في المرضى (المرضى الذين يتناولون سفاتن مع حشرات بنيا، حشرات البق، حشرات الكمل، الكمل، مدرات الألى ومضطحات كولريتا، بروتيناجلاندين، أو جدول دليل على حدوث مضاربات خاصة معطوفة.

الحمل والرضاعة: يجب استعمال سفاتن أثناء الحمل. المعلومات جرعة كافية حول تأثير الدواء، كما جاء في التجارب التي أجريت على الحيوانات تشير إلى انخفاض نسبة التخصيب، حدوث التسمم، حدوث وفاة مبكرة ومن آثار الترونج عن إجمال (سيفمستاتين) أثناء فترة الحمل أن تركيز الدواء في المنة الطليمة أقل من فترة الحمل الإبتدائي. بالإضافة إلى أن سفاتن لا يمتص في وقت مبكرة أثناء الحمل، والجرعة الكافية من كورتيسات لنمو الجنين، بما في ذلك تركيز التبرويات أو الأوعية الخلفية، ربما أن يحدث HMG-CO. سفاتن على القدرة على الحد من مستويات الكورتيزون وربما إحداث مضتحات أخرى خاصة مع الحقبة التركيب الكورتيزون، يجب فحص إعطاء سفاتن أثناء الحمل. ويعطى سفاتن اللواتي من الحمل شرط أن تكون الأم الحرة بعد فؤلا العلاج وتقييم عبدة الإحتمال. وإذا وصلت الحرة أثناء تناولها للدواء، ينبغي التأكيد فوراً عن تناول سفاتن وتقييم عبدة المرضة أثناء من حدوث، أو عدم حدوث، خطر كان على الجنين. وصلت نفس التقارير الطبية حول التطورات الختلفة التي تسبب أثناء الحمل، كما تم تناول سفاتن HMG-CO أثناء الحمل.

حفظوات الإستعمال،) وفي ملاحظة لحوالي ١٠ حالة مستتفيلة بعد إتمام الحمل، تعرضت لسيفمستاتين أو مركب آخر أو مرفقة مع سفاتن HMG-CO، كانت نسبة حدوث تشوهات جنين، إحصاس فؤوي، وفاته الجنين، كما تم. تتجاوز ما توقع حدوثه في عموم العلاج، ويجب توقيت سلامة هذا الدواء في المدة الحمل ولا يوجد فائدة إضافية للعلاج بالسيفمستاتين أثناء فترة الحمل، ويجب تجنب العلاج فور معرفة حدوث الحمل. من المعروف أن سفمستاتين، أو نتواته الأصبغة، يفرز في حليب الثدي، وأيضاً أن تركيزه من الدواء يفرز في الحليب، ولوجود إحتمال كامن بحدوث ردود فعل سلبية خطيرة قد يسببها سفاتن في الأطفال الرضع، يجب أن تمتنع النساء اللواتي يتناولن سفاتن عن إرضاع أطفالهن (راجع سفاتن في الإستعمال).

تأثيره على قيادة السيارات وتغيش الآلات: إذا حدث الدوار، فيجب الأبعد يحد الإعتبار الأثر السليم الذي سيقع على قيادة السيارات وتغيش الآلات.

الأثار الجانبية غير المرغوبة: في الدراسات المرافية السريرية لفترة ما قبل تسويق الدواء، وجد أن الآثار الدوائية التي تحدث بنسبة ١٠٪ أو أكثر وكانت تغير من قبل أفعال محتملة أو ممكنة من نوع الدواء، كما هيب العامة في ألم في البطن، إسهال، إمتحان، إكتئاب، الأكتية الأخرى التي كانت تحدث بنسبة ٥٪، أو ١٠٪، أو ٢٠٪، أو ٣٠٪، وأيضاً ما كان يحدث الإعتلال الضوئي، والآثار الجانبية الإضافية التالية تم تسجيل حدوثها في الدراسات السريرية الأخرى المرافية أو أثناء تسويق الدواء: غثيان، إسهال، طفح، عسر حصم، حكة جلدية، صداع، إكتئاب حاد، ألم عضلي، التهاب الكبد، إكتئاب، عجز، احتلال عضلي طرفي، قيء، إرتداد حاد، حكة جلدية، تضخم كبدية، يرقان، وفوق، وأيضاً ما تم تقرير حدوث ملامحة طفح السيلسية الأوتجة، والذي يعمل على إحصاس التهابية، الأوريميا، الزبانية ملامحة تشبه ألم عضلي عند تقيء، التهاب الأوعية، طفح الصبغة الجلدية، كدمات، كدمات، زيادة معدل ترسب الكريات الحمر، التهاب الغضاريف، المفصل، ترنق، حساسية الضوء، عسر، أمراض دموية التنض.

تأثير الخصوات الصيدلانية: نادراً ما يوجد في التقارير الطبية حدوث زيادات ملحوظة ثابتة في المخائر الناتجة للبروتينات (ترانس أمينيز) الكلية. مع تغير إرتفاع الكالين فوسفاتيز وجاما جلوبيولين ترانس أمينيز. وتأثير الخصوات الصيدلانية على الخلل في إحصاس وظائف كبد، وبصورة عامة، صفيقا ومعتاد، كما ذكرت حدوث زيادات في مخائر كرياتينين كينيزي لتصلية مشتقة من الهيكل العظمي (راجع تحذيرات وإحتياطات خاصة بالإستعمال). إذا كانت الجائبة الألية تم تسجيل حدوثها، وعموماً، لا تثبت علاقة بين سيتها ونسبها ونسبها للإستعمال؛ إحباط، العمالي المتأخرة، بما في ذلك ملامحة ستيفن-جوسون، قلة الكريات البيض، وفر فؤوي.

تأثير الجرعة: خاصة حالات تلوث من الإفراط في تناول الجرعة، ولم يصب أي مرضي أعراض مميزة، وقد شئء مع المرضى بدون حدوث أي ضرر لاحق، وأقصى جرعة تم تناولها كانت ٤٥٠ ملج. يجب إتخاذ إجراءات عامة وافية وبقية الكبد.

قامة الـ HPC-LH2، HPC-LH2، LAMC، سيولتاز، ديوكسي أسيدول، هيدروكسي بروبيل سيليلوز (HPC-LH2، HPC-LH2، LAMC، سيولتاز، ديوكسي أسيدول، هيدروكسي بروبيل سيليلوز)

مدة الصلاحية: عدم الصلاحية منبوعة على التلاف الخارجي.

إحتياطات تخزين: يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

الأشكال الصيدلانية المتوفرة :

سفاتن ١٠ ملج في عبوات تحتوي من ٣٠ قرص.

سفاتن ٢٠ ملج في عبوات تحتوي من ٣٠ قرص.

سفاتن ٤٠ ملج في عبوات تحتوي من ٣٠ قرص.

(ان هذا دواء)

- الدواء مستحضر يتر على سحكت واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة الصفة وطريقة الإستعمال المتفوصلة فيه وتعليمات الصيدلاني الذي صرف لك.

- فاقليبي بالصلاحيات ما يخبرون بألم وبنفثه وضوهر.

- لا تقم من العلاج المبدد على من نغاث نفسك.

- لا تترك صرف الدواء بعد موعده.

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

صنع في ساجا الصيدلانية المحدودة

الشركة العامة السعودية للأدوية للمنتجات الصيدلانية

جدة - المملكة العربية السعودية

تاريخ المراجعة ديسمبر ٢٠١٠-٢٠٠٠

محيط وزارة الصحة العرب واتحاد الصيدلانية العرب

25BSMAA

٢٠١٠