

# اميدرامين

شراب للسعال - طارد للبلغم

## التكوين

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مليلتر) من الشراب أو كل كيس على:  
المواد الفعالة: هيدروكلوريد الدايفينهيدرامين

١٣.٥ ملغم

١٣١.٥ ملغم

٥٧ ملغم

١ ملغم

كلوريد الأمونيوم

سترات الصوديوم

منثول

المواد غير الفعالة: سكارين الصوديوم، حمض الستريك، بنزوات الصوديوم، سكروز، جليسيرول، إيثانول، نكهة التوت، لون الكراميل، وماء مقى.

## الخواص

يمتاز اميدرامين بكونه شراباً طارداً للبلغم له خواص مضادة للهستامين، يستعمل لعلاج السعال الناتج عن الإصابة بنزلة البرد أو الحساسية. يعمل اميدرامين على طرد البلغم عن طريق تقليل لزوجة في الشعب الهوائية.

## دواعي الاستعمال

يستعمل اميدرامين لعلاج السعال سواء كان ناتجاً عن نزلات البرد أو حالات عدوى القناة التنفسية العلوية الأخرى أو الحساسية.

## الجرعة

الكبار والأطفال فوق ١٢ سنة: ١-٢ ملعقة صغيرة أو ١-٢ كيس

الأطفال من ٦-١٢ سنة: ملعقة صغيرة واحدة أو كيس واحد.

تكرر الجرعة كل ٤ ساعات، أو حسب إرشادات الطبيب.

ملاحظة: لا يوصى بإعطاء هذا الدواء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات.

يفتح الكيس من المكان المشار إليه، ويتم تناول محتوياته عن طريق الفم مباشرة.

إذا سهوت عن تناول جرعة

يجب تناولها في أسرع وقت ممكن حال تذكرها.

- إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فيستحسن الاستمرار في جدول الجرعات دون أخذ تلك الجرعة.

- يجب عدم تناول جرعتين في أن واحد.

## نواهي الاستعمال

لا يستعمل هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من مكوناته، وكذلك للمرضى الذين يعانون من قصور شديد في وظائف الكبد وذلك بسبب تأثيرات المستحضر المسببة للنعاس.

## احتياطات

بعد استعمال المستحضر أمناً في حالة المرضى المصابين بالبورفيريا.

بما أن دايفينهيدرامين-مضاد الهستامين الداخل في تركيب المستحضر- قد يسبب النعاس، فلذلك يوصى بتوخي الحذر عند القيام بالأعمال التي تتطلب تركيزاً ذهنياً بما في ذلك قيادة المركبات أو تشغيل الآلات.

يجب استعمال المستحضر بحذر للمرضى الذين يعانون من الصرع، أو الماء الأسود في العين (جلوكوما)، أو انسداد بوابي-إثني عشرى، أو أمراض الكبد الطفيفة إلى المتوسطة، أو خلل وظائف الكلى (قد يستدعي الأمر تخفيض مقدار الجرعة)، أو تضخم البروستاتا، أو احتباس البول.

يجب توخي الحذر عند استعمال المستحضر للمرضى الأطفال وكبار السن إذ أنهم يكونون أكثر عرضة لحدوث التأثيرات الجانبية للدايفينهيدرامين (مضاد الهستامين).

كما هو الحال مع المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مضادات الهستامين، يوصى بإيقاف استعمال المستحضر قبل حوالي ٧٢ ساعة من القيام باختبارات الحساسية بسبب احتمال ظهور نتائج سلبية خاطئة.

الحمل: حيث أنه لم يتم إجراء دراسات كافية وحكمة بشأن استعمال هذا المستحضر للنساء الحوامل، لذلك فإنه يوصى بتجنب استعماله أثناء فترة الحمل.

الرضاعة: على الرغم من أن المواد الداخلة في تركيب هذا المستحضر لا تنسب أي ضرر يذكر بالطفل الرضيع، إلا أنه يفضل تجنب استعماله من قبل الأمهات المرضعات.

## التأثيرات الجانبية

بصورة عامة، يعد اميدرامين جيد التحمل. قد يعاني المريض من الشعور بالنعاس، ولكن هذا

التأثير قد يكون له فائدة في تأمين النوم المريح أثناء الليل. على أية حال، فإن الشعور بالنعاس قد يزول بعد استمرار العلاج لأيام قليلة.

نادراً ما قد يحدث تحفيز. وذلك على الأخص عند تناول الدواء بجرعات عالية أو عند الأطفال أو كبار السن.

في بعض الأحيان تم تسجيل بعض التأثيرات الجانبية كالصداع، واضطرابات نفس-حركية، والتأثيرات المضادة للكولين (المضادة للمسكارين) مثل احتباس البول، وجفاف الفم والحلق، وعدم وضوح الرؤية، واضطرابات القناة الهضمية (وتشمل فقدان الشهية، وغثيان، وفي وألم المعدة، وإمساك أو إسهال).

كما سجل أيضاً في بعض الأحيان القليلة حدوث تفاعلات فرط الحساسية كتقلص الشعب الهوائية، والوذمة الوعائية، والالتهاب، والطفح الجلدي، والحساسية للضوء.

نادراً جداً تم تسجيل حدوث تأثيرات خارج الهرمي. ودوار، وارتباك، واكتئاب، واضطرابات النوم، ورجفة، واختلاجات، وخفقان، وعدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات الدم، وقصور في وظائف الكبد.

## الجرعة الزائدة

تتضمن الأعراض والعلامات الناتجة عن تناول جرعة كبيرة جداً من الدواء الشعور بالنعاس، وتحفيز الجهاز العصبي المركزي، وهذيان، واختلاجات، وتأثيرات مضادة للكولين (مضادة للمسكارين)، وعدم انتظام ضربات القلب.

يجب التركيز في العلاج على معالجة الأعراض مع اتخاذ الإجراءات الداعمة وتوفير العناية الخاصة بوظائف القلب، والقناة التنفسية، والكلى، والكبد، وكذلك بالتزامن مع الوسائل والأدوية.

يوصى بإجراء غسيل للمعدة أو تحفيز المريض على التقيؤ باستعمال شراب الأبيكاك وذلك في الساعات القليلة الأولى من تناول الجرعة الزائدة. قد يتم تناول الفحم المنشط وعلاجات مسهلة من أجل تقليل امتصاص الدواء.

## التفاعلات الدوائية

بسبب احتواء المستحضر على مضاد الهستامين -دايفينهيدرامين- قد تحدث التفاعلات الدوائية التالية:

عند تزامن الاستعمال مع الكحول، ومضادات القلق، والأدوية المنومة قد تحدث زيادة في تأثيرات المستحضر المسببة للنعاس، بينما في بعض الأحيان قد يؤدي تزامن استعماله مع الأدوية المضادة للكولين (المضادة للمسكارين) إلى زيادة تأثيراته المضادة للكولين.

عند تزامن الاستعمال مع الأدوية المضادة للاكتئاب (ميثامفيتامين أوكسدة الأمين) ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات) قد تؤدي إلى زيادة تأثيرات المستحضر المسببة للنعاس والمضادة للكولين (المضادة للمسكارين).

يتوقع أن يعاكس تأثير كل من دايفينهيدرامين وبيتاهاستين (شبيه الهستامين) عند تزامن الاستعمال.

## العوارض

اميدرامين شراب: زجاجات سعة ١٢٠ مليلتر.

اميدرامين أكياس: عوارض تحتوي على ٢٠ كيساً سعة ٥ مليلتر.

\* يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى ٢٥ °م.

### (إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره .
- لاتقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب .
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال .

مجس وزراء الصحة العرب  
وإتحاد الصيادلة العرب

لإستفسار : الرجاء الإتصال بالرقم المجاني ٤٩٩٤-٨٠٠(٩٧١)

إنتاج: **جولفار**

الخليج للصناعات الدوائية،

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

