

زيتا- كورت[®]

كريم حمض الفوسيديك

و بيتاميثازون فاليريت

التركيب:

تحتوي كل ١٠٠ جم من الكريم على حمض الفوسيديك ٢ جم وبيتاميثازون فاليريت ما يعادل ٠,١ جم بيتاميثازون. السواغات: بروبيلين جلايكول، سيتوماكروجول، زيت معدني، كحول ستوستيريل، بارافين، بوتاسيوم سوريبت، فوسفات الصوديوم، وحمض الفوسفور.

الصفات:

يجمع زيتا- كورت بين تأثير حمض الفوسيديك الموضعي الفعّال المضاد للبكتيريا وتأثير بيتاميثازون المضاد للالتهاب والحكة. حمض الفوسيديك هو مضاد حيوي مستقل من فيوسيديوم كوكسينيوم، و هو فعّال ضد سلالات البكتيريا العنقودية، البكتيريا السبحية، الكورينوباكتيريا، الناييسيريا وبعض فصائل الكلوستريديا والباكتيرويد. يعزى تأثير حمض الفوسيديك المضاد للبكتيريا إلى قدرته على منع تصنيع بروتينات البكتيريا. بيتاميثازون فاليريت هو مركب ستيرويدي موضعي ذو تأثير سريع في حالات الالتهابات الجلدية.

دواعي الاستعمال:

يستعمل زيتا- كورت في حالات الالتهابات الجلدية المصحوبة بالانتانات والتي تتضمن: الاكزيما السطحية، الاكزيما القرصية، الاكزيما الموضعية التي تصيب الجزء الأسفل من الساق، التهابات الجلد القشرية في شعر الوجه والرأس، التهابات الجلد الاحتكاكية، الحزاز الجلدي البسيط المزمن، الصدفية، و الذئبة القرصية.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال زيتا- كورت من قبل المرضى الذين لديهم حساسية لأي من مكوناته. يجب عدم استعمال الكورتيكوستيرويدات الموضعية في الحالات التالية:

مرض السل الرئوي و التهابات الجلد الفطرية و الفطرية.

التهاب الجلد حول الفم.

الوردية والحالات المنقرحة.

الاحتياطات:

لا يجب استعمال الكورتيكوستيرويدات الموضعية بشكل مكثف على الحمل.

المحاذير:

يجب تجنب العلاج لفترة طويلة، خصوصاً على مناطق الوجه، الثنيات والسحجات، وعند الأطفال والرضع.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

تشققات الجلد المكشوفة:

يدهن الكريم ٢-٣ مرات يومياً.

تشققات الجلد المغطاة:

الاستعمال بمعدل أقلّ ممكن أن يكون كافياً.

الأثار الجانبية:

كما هو الحال مع باقي الكورتيكوستيرويدات الموضعية فإن المعالجة لفترة طويلة وبشكل مكثف قد تؤدي إلى حدوث بعض التغيرات بالجلد. نادراً ما يتم تسجيل حالات فرط الحساسية. استشر الصيدلاني أو الطبيب في حالة حدوث أي عرض جانبي.

الاحتياطات الصيدلانية:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥ - ٣٠ م°).

للاستعمال الخارجي فقط.

لا يؤخذ عن طريق الفم.

لا تستعمل الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته أو عند ملاحظة أي علامة تلف فيه.

العبوات:

توفر زيتا- كورت على شكل أنبوب من الألمنيوم يحتوي على ١٥ جم.

Ⓢ علامة تجارية

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضه للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الدواء وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب.

Dec.2007
44035/R3

إنتاج: شركة تبوك للصناعات الدوائية.
ص ب ٣٦٣٣ تبوك-المملكة العربية السعودية.

