

الخواص الدوائية:

حمض الفيوسيديك هو مضاد بكتيري فعال لا يحتوي تركيبه الكيميائي على الرابطة بيتا-لاكتام، وهو قابل للذوبان في الماء والدهون مع القدرة على اختراق (النفاذ) الجلد. حمض الفيوسيديك فعال تقريبا مع كل سلالات ستافيلوكوكس أوريص والتي تشمل السلالات المنتجة والغير منتجة لإنزيم البتملينيز. يكمن أثر حمض الفيوسيديك المضاد للبكتيريا في عمله على منع تكون البروتين البكتيري حيث يقوم بإعاقه عملية تحويل الأحماض الأمينية إلى بروتين في الريبوسومات. يتميز كريم فيوسيباكت بTM بفعالته ضد البكتيريا الموجبة لصيغة جرام وأنواع الجنس نميسيريا لكنه في المقابل غير فعال تقريبا مع البكتيريا السالبة لصيغة جرام. البيتاميثازون فاليريت هو إستيرويد قشري موضعي عالي الفعالية. الإستيرويدات القشرية هي فئة من المركبات تستخدم أساسا لتأثيرها المضاد للإلتهاب والحكة لفعالها المثبط للمناعة ولقدرتها على قبض الأوعية الدموية. قد يحدث إمتصاص نظامي للدواء ويمكن تقادي الأعراض الجانبية الناتجة عن هذا الإمتصاص إذا ما استخدم المستحضر وفقا للتعليمات. كريم فيوسيباكت بTM ملائم لكثير من الأعراض الجلدية. يمتص البيتاميثازون فاليريت عن طريق الجلد ، وتعتمد كمية الدواء الممتصة بهذه الطريقة على السائل المذيب للدواء وعلى درجة التلف في طبقة الجلد القرنية الناجم عن الإصابة الجلدية.

دواعي الإستعمال:

يوصى بإستعمال فيوسيباكت بTM في الإلتهابات الجلدية التي يصاحبها إصابات بكتيرية أو التي يتوقع أصابتها بالبكتيريا ويستعمل فيوسيباكت بTM في الإلتهابات الجلدية التي تشمل الإكزيما السطحية، الإكزيما القرصية ، والإكزيما الموضعية التي تصيب الجزء الأسفل من الساق والتهابات الجلد القشرية في شعر الرأس والوجه ، إلتهابات الجلد الإحتكاكية، الحزاز الجلدي البسيط المزمن، الصدفية ، والتئبة القرصية.

موانع الإستعمال:

الحساسية المفرطة لأي من مكونات المستحضر.

الإحتياطات:

عند الإستخدام المتكرر أو لفترة طويلة أدى الإمتصاص النظامي للإستيرويدات القشرية الموضعية إلى كبت كظري عكسي، وظهور أعراض مرض كوشنج وزيادة سكر الدم والبول. قد يتم إمتصاص كميات أكبر لدى الأطفال وبالتالي يكونون أكثر عرضه للسمية. عند إستخدام الإستيرويدات القشرية. يفضل عدم تغطية الكريم بالضمادات ويجب أخذ الحذر عند إستخدام الكريم قريبا من العينين. ينبغي على المرضى إخبار الطبيب عن أي آثار جانبية غير طبيعية.

الأثار الجانبية:

نادراً ما يحدث طفح جلدي ، لسعة وتهيج عند الإستخدام.

الجرعة وطريقة الإستعمال:

يدهن الكريم على المناطق المصابة من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

حفظ الدواء:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠°م.

العبوة:


فيوسيباكت بTM كريم ١٥ جم في أنبوبة ألومنيوم قابلة للطي.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ويتفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيدالة العرب



فيوسيباكت بTM ، مستحضر عالي الجودة من إنتاج



ص.ب : ٦٦٦٧ - جدة ٢١٤٤٢ - المملكة العربية السعودية

32171046 - Rev. 03S/17-08-10