

أو  
ج- أوميزين: ٢ ملجم مرة واحدة يومياً، كلازيتروميسين ٥٠٠ ملجم ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوعين.

تحتوي كل كبسولة أوميزين ٢٠ على ٢٠ ملجم أوميرازول.

### الملاحظة:

يجب منع الكسوة بحمية كافية من السوائل.  
يجب عدم مضغ أو طحن محتويات الكبسولة.  
يجب غلق العبوة بإحكام.

### الأثار الجانبية:

هناك مضاعفات الهيومانتيسوم في الدم اذا استخدم هذا الدواء بجرعة منخفضة كما تم ذكرها في التعليمات.  
الاستخدام المستمر لفترات اطول من سنة يؤدي إلى انخفاض في معدل الماغنيسيوم بالدم وبالتالي يمكن ان تشكل مضاعفات خطيرة تشمل تقلصات عضلية وعدم التوازن في شريات القلب ونسجات.  
على كل حال ، لا تظهر دائما هذه الاعراض على المرضى. لملاج مضاعفات الهيومانتيسوم العامة يتطلب استخدام الماغنيسيوم. المرضى الذين يستخدمون PPI وتظهر لديهم علامات الهيومانتيسوم قد يحتاجون الى التوقف عن استعمال PPI.

بوخة، قيء، صداع، إسهال، إسهال، آلام في البطن، غثاظة، حرش مصاحب بحكة جلدية، دوام الرأس، خدر، غثاظة، آرق، زيادة أنزيمات الكبد.

### في بعض الحالات القليلة يحدث التالي:

- الجلد: حساسية للضوء، الحماض المتشكلة، طفح الشمس.
- الجهاز العصبي المركزي والعضلي: ألم في المفاصل، ضعف عضلي، ورماتيزم في العضلات، تشوش عقلي، عصبية، اكتئاب، هلوسة خاصة عند المرضى ذوي الحالات الصعبة.
- الجهاز الهضمي: جناف في الدم، التهابات الدم، إصابات موية فطرية.
- الكبد: اعتلال دماغي لدى المرضى الحماضين بمرض شديد في الكبد، التهاب كبد، مصاحب أو غير مصاحب بالصفراء، أو فشل كبد. ويمكن ملاحظة زيادة في أنزيمات الكبد.
- القعدة والتصام: كبر حجم الثدي لدى الرجال.
- الدم: نقص كريات الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح الدموية.

### التفاعلات الدوائية:

قد يسبب أوميرازول تفاعلات في الأيض الكبدية لكن من التداخلات الدوائية، فيبتون وبعض الأدوية الأخرى التي تؤخذ بواسطة أنزيم سي٤٠٠٠ ب. ولذلك فإن تناول هذه الأدوية بالتزامن مع أوميرازول قد يؤدي إلى تأخير طرحها وزيادة تركيزها في الدم وبالتالي زيادة في تأثيراتها.  
قد ينخفض امتصاص كل من كيتوكونازول وانراكونازول عند تناولهما مع أوميرازول وقد يزيد تركيز كل من الدايجوكسين وتاكروليم في الدم عند تناول أوميرازول.

### الجرعة الزائدة:

الجرعة القوية الواحدة وفاقية ٤٠٠ ملجم لم تؤدي لأي أعراض شديدة، لم يتغير معدل الأيض مع زيادة الجرعة ولم يتطلب معالجة خاصة.

### العوية:

- أوميزين ٢٠ مطفر في
- عبوة تحتوي على ٢٨ كبسولة
- عبوة تحتوي على ١٥ كبسولة
- عبوة تحتوي على ١٩ اشربة، كل اشربة يحتوي على ثلثتين
- عبوة تحتوي على ١٠ اشربة. كل اشربة يحتوي على ١٠ كبسولات.

### تعليمات التخزين:

يحفظ في درجة حرارة بين ١٥-٢٥ درجة مئوية.  
يحفظ بعيدا عن الضوء والرطوبة.  
يحفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

### تاريخ اصدار هذه النشرة:

أبريل ٢٠١١

\* صلاحية تجارية

### الإفصاح:

يحمل أوميزين على التثبيط التوسمي لنظام الإنزيمي أدينوسين ثلاثي الفوسفات الهيدروجيني-يوتاسي (مضخة البروتين) وذلك عند مستوى سطح الإفراز في الخلايا الجدارية المبطنة للمعدة.  
ينجم عن ذلك خفض إفراز الحماض المعدي وذلك بعبرة يومية واحدة من أوميرازول.

### دواعي الاستعمال:

- يسمحل أوميزين لعلاج:
- قرحة المعدة: العلاج والتعويض أو الطويل الأمد لقرحة المعدة النشطة والحميدة وقرحة الأثنا عشر.
- الإرتداد المعدي المريئي.
- متلازمة زولينجر إليسون.

### موانع الاستعمال:

- يجب عدم استعمال هذا المستحضر من قبل المرضى ذوي الحساسية المفرطة ضد أوميرازول.
- لم تثبت سلامة خلال فترة الحمل والرضاعة.

### الجرعة وتعليمات الاستعمال:

يجب تناول الكبسولة وبلعها كليا مع كمية كافية من السوائل.

### قرحة الاثنا عشر:

٢٠ ملجم (كبسولة واحدة) يوميا لمدة ٢-٤ أسابيع.

### قرحة المعدة والارتداد المريئي:

٢٠ ملجم (كبسولة واحدة) يوميا لمدة ٤-٨ أسابيع.  
عند بعض المرضى الذين لديهم قرحة المعدة والارتداد المريئي المقام للعلاج الأخرى يمكن إعطاء ٤٠ ملجم (أوميزين مرة واحدة يوميا) لمدة ٨ أسابيع.

### متلازمة زولينجر إليسون:

الجرعة المبتدئة: ٦٠ ملجم أوميزين مرة واحدة يوميا ومن ثم يتم تعديل الجرعات حسب احتياجات كل مريض ويستمر العلاج طالما هناك حاجة لطبية.  
أكثر من ٧٥٪ من المرضى ذوي المرض الشديد يستمررون لفترات طويلة مع الجرعة المقادة ما بين ٢٠ ملجم - ١٢٠ ملجم يوميا.  
في حالة تجاوز الجرعة اليومية عن ٨٠ ملجم يجب تقسيمها على مرتين يوميا.

### الأطفال:

غير موصى باستخدامه لعدم توفر دراسات الأمان والفاعلية.

### كبار السن:

لا يوجد داعي لتغيير ضبط الجرعات عند كبار السن.  
المرضى الذين يعانون من اختلال في وظائف الكلى: لا يوجد داعي لتغيير ضبط الجرعات للمرضى الذين يعانون من اختلال في وظائف الكلى.  
المرضى الذين يعانون من اختلال في وظائف الكبد: نتيجة لزيادة الحيوية لتعمر العصبي للأوميرازول في البلازما عند المرضى الذين يعانون من اختلال في وظائف الكبد فإن الجرعة اليومية ٢٠ ملجم تكون عادة كافية.  
لم يتم التثبت بعد من سلامة استعمال أوميرازول لدى المرضى الذين يعانون من اختلال في وظائف الكلى ووظائف الكبد عند الاستعمال لفترات طويلة.

### نظم القضاء على ميكروب هايكوباكتر بيايوربي في حالات مرض القرحة المعوية:

- ١- نظام العلاج بالدواء الثلاثي،  
أ- أوميزين ٢٠ ملجم ١. أموكسيسيلين ٥٠٠ ملجم وكلازيتروميسين ٥٠٠ ملجم تعطى مرتين يوميا لمدة أسبوع.  
ب- أوميزين ٢٠ ملجم ٢. كلازيتروميسين ٢٥٠ ملجم ومترونيدازول ٤٠٠ ملجم (أوتشيدازول ٥٠٠ ملجم) تعطى مرتين يوميا لمدة أسبوع.  
أو  
ج- أوميزين: ٤ ملجم مرة واحدة يوميا مع أموكسيسيلين ٥٠٠ ملجم ومترونيدازول ٤٠٠ ملجم ثلاث مرات يوميا لمدة أسبوع.
- ٢- نظام العلاج بالدواء الثنائي،  
أ- أوميزين ٢٠-٨٠ ملجم مع أموكسيسيلين ٥٠٠ جرام يوميا.  
مقسمة على جرعات عدة أسبوعين.  
أو  
ب- أوميزين ٤٠ ملجم مرة واحدة يوميا مع أموكسيسيلين ٣-٥٠٠ جرام مقسمة على جرعات يومية لمدة أسبوعين.

### إن هذا الدواء

- مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات بمرضك للخطر.
- أتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء وينبغيه وضروه.
- لا تتعلم مدة العلاج الموصوف لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الدواء بدون استشارة الطبيب.

احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

مجلس وزارة الصحة العربي، اتحاد الصيادلة العرب