

أملوديين نيسيلات

كبسولات

التركيب:

كل كبسولة أمفاسكTM ٥ ملجم تحتوي على ٢,٥ ملجم أملوديين على هيئة قاعدة، كل كبسولة أمفاسكTM ٥ ملجم تحتوي على ٥ ملجم أملوديين على هيئة قاعدة، كل كبسولة أمفاسكTM ١٠ ملجم تحتوي على ١٠ ملجم أملوديين على هيئة قاعدة.

الخواص الفارماكولوجية:

تثبط نيسيلات الأملوديين أيون الكالسيوم من السريان عبر أغشية الخلايا بصورة انتقائية حيث أن تأثيره على خلايا العضلات اللاإرادية أكبر من تأثيره على خلايا عضلة القلب، وتتميز أملوديين بـ تخفيض الضغط العالي إلى التأثير المباشر في إنقباض العضلات الإرادية في الأوعية الدموية. على الرغم من أن الإمكانية الدقيقة لعالج أملوديين في الذبحة الصدرية لم تحدد بعد، إلا أنه من الثالث أنه يحسن من كفاءة عضلة القلب وذلك لتسبب التثاثير (مدر للبول) وميثامنت مستقبلة ألفا وبيتا وميثامنت الإزيم المحول للأنجيو تينسين. ١ - أملوديين يعمل على توسيع الشرايين الصغرى الطرفية وكذلك يقلل من المقاومة الطرفية الكلية في الشرايين التي تقوم عضلة القلب بحيد لضخ الدم مما يجعل معدل ضربات القلب يعمل ثانية بأولى إلى الإنقلاص من استهلاك طاقة عضلة القلب وبالتالي من كمية الأوكسجين المطلوبة لتأدية العملية. ٢ - الأملوديين يعمل أيضاً على توسيع شرايين القلب الرئيسية والدقيقة في انسجة القلب سواء الطبيعية أو الصناعية وعدم كفاية توصيل الدم إليها وهذا يعمل على زيادة توصيل الأوكسجين إلى عضلة القلب بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تقلص الشرايين التاجي (الذبحة الصدرية من نوع Prinzmetal أو الخنقة الأوراثية) ويمكن أن يعمل هذا أيضاً على مقاومة ضيق الشرايين في القلب الناتج عن التدخين.

موانع الإستعمال:

يعتبر أمفاسكTM الخط العلاجي الأول لارتفاع ضغط الدم ومن الممكن إستخدامه كعلاج وحيد للتحكم في ضغط الدم في أغلب المرضى. كما يمكن للمرضى الذين لا يستطيعون التحكم في ارتفاع ضغط الدم بصورة كافية باستخدام عقار واحد الإستفادة من إضافة أمفاسكTM الذي أثبتت فعالية كبيرة عند إستخدامه مع التثاثير (مدر للبول) وميثامنت مستقبلة ألفا وبيتا وميثامنت الإزيم المحول للأنجيو تينسين. ويستعمل أمفاسكTM أساساً لعلاج قصور التوصيل الدموي لعضلة القلب وذلك عند ما يكون ناتجاً عن انسداد دائم في الأوعية الدموية في عضلة القلب كما في الذبحة الصدرية المستقرة أو التقلص الشرايين (الذبحة الصدرية الخنقة الأوراثية). يمكن إستخدام أمفاسكTM فقط كعلاج قائم بذاته أو من الممكن إستخدامه مع أدوية أخرى للذبحة الصدرية بالنسبة للمرضى الذين لا يستطيعون بصورة كافية لعلاج مبركات التثاثير و/أو ميثامنت مستقبلة بيتا.

موانع الإستعمال:

يجب عدم إستعمال أمفاسكTM في المرضى الذين أظهروا تفاعلات حساسية حادة لأي عقار ينتمى لهذه المجموعة (مشتقات ديهيدروبيريدين) دجعة غير مستقرة وسددة قلبية.

الآثار الجانبية:

صداع، تورم دوخة، شب، شعور بالسخونة والإحمرار، غثبان، خفقان طفق جنسي، حكة، عتة، تقلص عضلي، ضغط وصرع عضلي.

إحتياطات خاصة:

الإستخدام في كبار السن: أملوديين يستخدم جرعات متساوية في كبار السن والأصغر سناً ولذلك يوصى باستخدام النظام المعتاد في كثير من الحالات. الإستخدام في حالات إختلال وظائف الكبد: كما يحدث في كل ميثامنت قوات الكالسيوم، فإن فترة نصف العمر للأملوديين تزيد في المرضى الذين يعانون من إختلال وظائف الكبد ولذلك يجب أن يعطى بحرص لهؤلاء المرضى.

الحمل الرضاعة:

الأهواء المرضعات يجب أن يتجنبن إستعمال هذا الدواء.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى أو الطعام:

تتفاعلات الدواء: يمكن تناول أملوديين بصورة آمنة مع التثاثير (مدر للبول)، ميثامنت مستقبلة ألفا، ميثامنت مستقبلة بيتا، ميثامنت الإزيم المحول للأنجيو تينسين، مبركات التثاثير طويلة المفعول، النيتروجلوسرين (تحت اللسان)، الأدوية غير الإستيهابية المضادة للإلتهاب، المضادات الحيوية، أدوية علاج السكر (من طريق الفم). وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على متطوعين أن تناول أملوديين مع عقار الديجوكسين لا ينتج عنه تغير في تركيز الديجوكسين بالدم أوسعرة تخلص الجسم منه عن طريق البول. تتناول المسهباتين مع أملوديين لا يظهر من الخواص الحركية الدوائية للأملوديين وقد أوضحت الدراسات المعنية على البلازما أن أملوديين ليس له تأثير على درجة ارتباط الأدوية الأتية ببروتينات البلازما: ديوكسين، فينتونين، وأرقارين، النوميبتاسين. وفي دراسة على متطوعين ذكر أعماراً، ثبت أن تناول أملوديين لا يتعارض ملحوظة من تأثير الوارفارين على إختبار وفق الإستجابة للدوروثرومين. أملوديين لا يتعارض بصورة ملحوظة الخواص الحركية لتركيب السيكلوسبورين.

الجرعة والإستعمال:

كبسولة واحدة من ٥ مللجرام يومياً، يمكن زيادة الجرعة اليومية إلى ١٠ مللجرام كبسولة واحدة يومياً إذا مازدت الحاجة لذلك، يمكن تناول أمفاسكTM مع / قبل أو بعد الطعام.

العيوات:

كبسولات ٢,٥ ملجم في عبوة تحتوي على ٢٠ كبسولة، كبسولات ٥ ملجم في عبوة تحتوي على ٢٠ كبسولة، كبسولات ١٠ ملجم في عبوة تحتوي على ٢٠ كبسولة.

الحفظ:


يحفظ أمفاسكTM كبسولات بكامل قاعدتها حتى التاريخ المدون على العبوة عند حفظه في درجة حرارة الغرفة (١٥-٢٥ درجة مئوية)، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المتخصص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضروره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيدالة العرب



أمفاسكTM ، مستحضر عالي الجودة من إنتاج



ص.ب: ٦٢٦٧ - جدة ٢١٤٤٢ - المملكة العربية السعودية

32171061 - Rev. 00/23-05-07