

بيتاسيرك BETASERC

أقراص بيتاسيرك لعلاج الدوخة و الدوار

AHMED ABDELBAKY

الأثار الجانبية

إرشادات
الإستعمال

دواعى
الإستعمال

2015

بيتاسيرك أقراص : التعريف بالدواء و استخداماته

- المكون الفعال فى بيتاسيرك أقراص عبارة عن عقار يسمى بيتاهستين .
BETAHISTINE .
- يستخدم بيتاهستين لتخفيف أعراض مرض منيير Ménière's disease ، و مرض منيير هو حالة تصيب الأذن الداخلية ، و تتسبب فى هجمات من الدوار (الشعور بالدوار او الدوخة) ، وفقدان السمع، والطنين (رنين فى الأذن). و هذه الهجمات يمكن أن تختلف فى شدتها، و معدل حدوثها ، و بيتاسيرك أقراص يساعد على تخفيف ومنع الأعراض المذكورة لمرض منيير.
- مادة البيتاهستين (المكون الفعال فى بيتاسيرك أقراص) ، عبارة عن مادة منازرة و مشابهة لمادة الهستامين و تستخدم لتخفيف أعراض مرض منيير فى البالغين.
- يتوافر بيتاسيرك أقراص فى عدة تركيبات و اشكال دوائية ، و تشمل :
 1. بيتاسيرك 8 مجم أقراص .
 2. بيتاسيرك 16 مجم اقراص .
 3. بيتاسيرك 24 مجم اقراص .
- يعتقد أن بيتاهستين (المادة الفعالة فى بيتاسيرك أقراص) تعمل عن طريق تحسين تدفق الدم فى الأذن الداخلية ، ما يساهم فى تقليل تراكم الضغط و يخفف الاعراض المذكورة سالفاً .

بيتاسيرك أقراص : إرشادات الاستعمال

- يجب تناول بيتاسيرك أقراص تماما كما يقول الطبيب لك.
- فى العادة ما تكون الجرعة فى البداية ، 16 مجم ثلاث مرات يوميا ، ثم بعد السيطرة على الأعراض ، قد يخفض الطبيب الجرعة الى 8 مجم ثلاث مرات يوميا .

- بقدر الامكان ، يفضل تناول بيتاسيرك أقراص مع شيء من الطعام أو مباشرة بعد وجبة الطعام.
- من المنصوح به ، تناول بيتاسيرك أقراص فى الاوقات نفسها كل يوم .
- فى حال نسيان الجرعة ، فلا داعى للقلق ، فقط تذكر ان تتناول الجرعة التالية فى ميعادها ، و لا تضاعف الجرعة لتعويض الجرعة المنسية .
- إذا كنت سائقا، يجب عليك التوقف عن القيادة عندما يتم تشخيصك بمرض منيير .
- بيتاسيرك أقراص لا تؤثر على القدرة على القيادة ، و لكن الحالة المرضية هى التى تؤثر على القدرة على القيادة نتيجة الدوخة و الدوار ، و يجب عدم الرجوع إلى قيادة المركبات إلا بعد استقرار الحالة تماما .
- من غير المرجح ان ينجح بيتاسيرك أقراص فى وقف جميع هجمات مرض منيير ، و لكنه سيقبل من عددها و شدتها ، و قد يستمر العلاج بدواء بيتاسيرك أقراص لمدة قد تمتد م 6 إلى 12 شهر .
- بعض الناس المصابين بمرض منيير ، يعتقدون ان أعراضهم تتحسن باتباع نظام غذائي قليل الملح، أو بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو بالتوقف عن التدخين، أو بالاستغناء عن الكافيين والكحول ، و لكن الأدلة لأثبات ذلك قليلة ، و على الرغم من ذلك فمن المفيد المحاولة .
- أسأل الصيدلى او الطبيب عن الأدوية التى تتناولها ، لتتحقق من أنها مناسبة لتناولها مع بيتاسيرك أقراص_ ، و فالادوية المضادة للحساسية (الادوية المضادة للهستامين) تقلل من مفعول بيتاسيرك أقراص .

بيتاسيرك أقراص : الاثار الجانبية

- الشعور بالغثيان، و عسر الهضم ، و لذلك فمن المهم تناول بيتاسيرك أقراص أثناء او بعد الوجبة .
- الصداع ، و يمكن السيطرة عليه بتناول مسكن مناسب .

• الانتفاخ في البطن أو عدم الراحة ، و تناول بيتاسيرك أقراص بعد الوجبة يقلل من ذلك .

• ردود فعل جلدية مثل الحكة والطفح الجلدى ، و يمكن استخدام كريم مرطب للسيطرة على هذه الاعراض ، و لكن فى حال كونها متفاقمة او شديدة ، فيجب اللجوء إلى الطبيب

خاص بموقع PHARMACIA1.COM