

أقراص مكسوة، شراب، وأمبولات مضاد للتقلصات

التركيب

أقراص

يحتوي كل قرص ذي كسوة على:

المادة الفعالة:	هايويسين-ن-بيوتاييل برومايد	١٠ ملغم
المواد غير الفعالة:	نشا، نشا مجلتن، بوفيدون، لاكتوز أحادي الهيدرات، إستيرات المغنيسيوم، كروس بوفيدون، هيبروميلوز، ثنائي أكسيد التيتانيوم، وذلك.	

شراب

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مليلتر) من الشراب على:

المادة الفعالة:	هايويسين-ن-بيوتاييل برومايد	٥ ملغم
المواد غير الفعالة:	سكروز، سوربيتول، مثيل البارابين، بروبيول البارابين، سكارين الصوديوم، كلوريد الصوديوم، حمض الستريك، ستيرات الصوديوم، نكهة فواكه، نكهة التوت، نكهة الفراولة، وماء منقى.	

أمبولات

تحتوي كل أمبولة ١ مليلتر على:

المادة الفعالة:	هايويسين-ن-بيوتاييل برومايد	٢٠ ملغم
المواد غير الفعالة:	حمض الهيدروبروميك وماء معد للحقن.	

الخواص

إن المادة الفعالة في سكوبينال هي عامل مضاد للمسكارين ذات مركز فعالية خاص في العقد الجاراسميتاوية في جدران الأحشاء، بناء على ذلك يكون له تأثير مضاد للتقلص على العضلات المساءة للقنوات العدية-العوية والصفراوية والبولية، ويظهر هذا التأثير قبل فترة طويلة من حدوث التأثيرات الأخرى المميزة للمواد شبيهة الأتروبين، لهذا السبب لا يلاحظ حدوث تأثيرات جانبية على الجهاز العصبي المركزي أو الغدد اللعابية لدى إعطاء سكوبينال في حدود الجرعات العلاجية.

دواعي الاستعمال

يوصف سكوبينال لعلاج متلازمة القولون المتيج، القولون المتقلص، الاضطرابات التشنجية في القناة الصفراوية والكلى والحالب، إضافة إلى تسكين الألم التشنجي في عسر الطمث.

كما يوصف سكوبينال أيضاً في علاج قرحة الجهاز الهضمي كعلاج مصاحب لمضادات الحموضة أو مضادات الهستامين هم وذلك لتقليل إفراز حمض المعدة وإطالة الزمن اللازم لإفراغ محتويات المعدة.

تستعمل أمبولات سكوبينال في حالة الإصابة بنوبات الغص والتقلص الحادة وكوسيلة مساعدة في العمليات التشخيصية والعلاجية، والتي يمثل فيها التقلص مشكلة، مثل الفحص بالمنظار للمعدة والإثني عشرى والتصوير بالأشعة.

الجرعة

ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك، يوصى باتباع النظام التالي للجرعات:

الأقراص (يجب تناولها كاملة مع كمية كافية من الماء)

الكبار والأطفال أكبر من ٦ سنوات: ١-٢ قرص ٢-٣ مرات يومياً.

الشرب

الكبار والأطفال أكبر من ٦ سنوات: ٢-٤ ملعقة صغيرة ٢-٣ مرات يومياً.

الأطفال أكبر من سنة واحدة: ١-٢ ملعقة صغيرة ٢-٣ مرات يومياً.

الأطفال الرضع: ملعقة صغيرة واحدة ٣ مرات يومياً.

الأمبولات

الكبار: يحق محتوى أمبولة واحدة (١ مليلتر) في الوريد ببطء، أو في العضل، أو تحت الجلد ٢-٤ مرات يومياً، بصورة عامة، يمكن تكرار الجرعة بعد نصف ساعة إذا لزم الأمر، كما يمكن زيادة عدد مرات الحقن في حالة الفحص بالمنظار.

الرضع والأطفال الصغار: في الحالات الشديدة، يتم حقن ٢,٥-٣ مليلتر ٣ مرات يومياً.

دواعي الاستعمال

يجب عدم استعمال المستحضر من قبل المرضى الذين لديهم حساسية مفرطة لهايويسين-ن-بيوتاييل برومايد أو لأي من المواد الأخرى الدالطة في تركيبه.

يجب عدم استعمال هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد من قبل المرضى الذين يعانون من الماء الأسود في العين بالزاوية المغلقة (جلوكوما)، الوهن العضلي الوبيل (ولكنه قد يستعمل لتقليل التأثيرات الجانبية لمضادات الكولين إستيريز)، أو ضيق بواب المعدة، أو شلل الأمعاء، أو تضخم القولون، أو تضخم البروستاتا، أو بورفيريا.

احتذات

كما هو الحال مع بقية الأدوية المماثلة، يوصى بالحذر لدى إعطاء هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد للمرضى الذين يعانون من الارتجاع المعدي-المرئي، الإسهال، التهاب القولون التقرحي، احتشاء العضلة القلبية الحاد، ارتفاع ضغط الدم، الحالات المرضية التي تمتاز بتسارع ضربات القلب (من ضمنها زيادة إفراز الغدة الدرقية، عدم كفاية وظائف القلب، عمليات القلب)، أو حمى. يجب توخي الحذر أيضاً عند استعمال المستحضر للمرضى الأطفال وكبار السن.

يوصى بالحذر أيضاً في حالة مرضى متلازمة داون بسبب زيادة خطر التأثيرات الجانبية.

نظراً لحدوث اضطرابات في التكيف البصري، يجب على المرضى تجنب قيادة السيارات أو تشغيل الآلات عقب استعمال حقن هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد إلى أن يعود البصر إلى حالته الطبيعية.

بما أنه لا توجد دراسات كافية حول استعمال هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد من قبل الإنسان، لذلك يجب استعماله أثناء الحمل فقط عندما تكون الفوائد المرجوة من العلاج للأمر تفوق المخاطر التي قد يتعرض لها الجنين.

الرضاعة: حيث أن هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد يفرز في حليب الثدي بكميات تعد ضئيلة جداً على إحداث أضرار بالطفل الرضيع إلا أنه يوصى بالحذر عند استعماله من قبل الأمهات المرضعات.

التأثيرات الجانبية

بصورة عامة، يعد سكوبينال جيد التحمل وذلك عند تناوله بالجرعات العلاجية الموصى بها، ومع ذلك فقد يعاني بعض المرضى من تأثيرات جانبية طفيفة مثل احمرار الوجه، توسع بؤبؤ العين مع اضطرابات في التكيف البصري، عدم تحمل الضوء، قلة إفرازات الشعب الهوائية، وجفاف الفم والحلق والأنف والجلد.

نادراً ما يحدث ارتباك (على الأخص عند كبار السن)، غثيان، قيء، دوام، إسهال، تباطؤ مؤقت في ضربات القلب (لحمية تسارع في ضربات القلب، خفقان، وعدم انتظام ضربات القلب)، الحاجة للمحة للتبول واحتباس البول.

نادراً جداً ما سجل حدوث تفاعلات الحساسية، وهي تظهر على الأخص في الجلد. في حالة المرضى الذين لديهم تاريخ مسبق من الربو الشعبي أو الحساسية، تم تسجيل حالات نادرة جداً حدث فيها ضيق في التنفس.

الجرعة الزائدة

في حالة الجرعة الزائدة قد تحدث أعراض ناتجة عن التأثيرات المضادة للكولين مثل احتباس البول، وجفاف الفم، واحمرار الجلد، وتسارع ضربات القلب، وتنبيط حركة القناة الهضمية، واضطرابات بصرية مؤقتة.

يجب التركيز في العلاج على معالجة الأعراض مع اتخاذ الإجراءات الداعمة وتوفير العناية الخاصة بوظائف أعضاء الجسم المختلفة.

يوصى بإجراء غسيل للمعدة أو تحفيز المريض على التقيؤ وذلك في الساعات القليلة الأولى من تناول الجرعة الزائدة. قد يتم تناول الفحم المنشط من أجل تقليل امتصاص الدواء.

التفاعلات الدوائية

قد يتم تحفيز التأثيرات المضادة للمسكارين (المضادة للكولين) لبعض الأدوية عند تزامن استعمالها مع هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد. تشمل هذه الأدوية فنيغومام، ديسوباميراميد، كورتينيد، منظمات أكسدة الأمين الأحادي ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات. مضادات الهستامين، فينوتازين (ولكن مع انخفاض تركيزه في البلازما)، بيوتيروفينون، كلوزابين، وأمانتادين.

إن تزامن استعمال هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد مع مضادات الدوبامين مثل ميتوكلوبراميد قد يؤدي إلى تقليل تأثيرات كل منهما على الجهاز الهضمي.

قد تتحذف التأثيرات المسرعة لضربات القلب لأدوية بيتا الأدرينالية عند تزامن تناولها مع هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد.

قد يعمل هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد على تقليل امتصاص كيتوكونازول وعلى الأغلب ليفودوبا عند تزامن الاستعمال.

إن تزامن استعمال هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد مع الكحول، ومضادات القلق، والأدوية النومة، الأدوية المضادة للاكتئاب (مثبطات أكسدة الأمين الأحادي ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات) قد يؤدي إلى زيادة تأثيرات المستحضر المسببة للغثاس.

قد تتحذف تأثيرات هاويوسين-ن-بيوتاييل برومايد عند تزامن تناوله مع ميمانتين.

العوات

سكوبينال أقراص مكسوة: عبوة تحتوي على ٢٠ قرصاً.

عبوة للمستشفيات تحتوي على ٢٠٠ أو ١٠٠٠ قرص.

سكوبينال شراب:

زجاجة سعة ١٠٠ مليلتر.

سكوبينال أمبولات: عبوة تحتوي على ٥ أو ٥٠ أمبولة، تحتوي كل أمبولة على ١ مليلتر.

* يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى ٢٥°م. يحفظ الشراب بعيداً عن الضوء.

تحفظ الأمبولات بعيداً عن الضوء والحرارة.

(إن هذا الدواء)
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما المخبران بالدواء ويتبعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيدالة العرب

لاستفسار: الرجاء الاتصال بالرقم المجاني ٤٩٩٤-٨٠٠ (٩٧١)، م.ع.١.

إنتاج: جلفار

المخبر للصناعات الدوائية،
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

