

أقراص هيدروكلوريد فيكسوفينادين

التركيب:

فيكسودين ٦٠ ملجم: يحتوي كل قرص على ٦٠ ملجم هيدروكلوريد فيكسوفينادين.
فيكسودين ١٢٠ ملجم: يحتوي كل قرص على ١٢٠ ملجم هيدروكلوريد فيكسوفينادين.
فيكسودين ١٨٠ ملجم: يحتوي كل قرص على ١٨٠ ملجم هيدروكلوريد فيكسوفينادين.
السواغات: سيليلون، نشا، بوفيدون، كروسكارميلوز صوديوم، ستيرات المغنيسيوم، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلون، جلايكول متعدد الايثيلين، تالك، E171، E172، سيميكون.

الخواص:

فيكسوفينادين هو الناتج النشط لعملية أيض حمض الكاربوكسيل في التيرفينادين، وهو مضاد اختياري لمستقبلات الهيستامين H₁ ولا يسبب النعاس.
يبدأ تأثير فيكسوفينادين المضاد للهيستامين خلال ساعة واحدة من تناول الجرعة، يصل إلى أقصى تأثير له بعد ٦ ساعات، ويستمر لمدة ٢٤ ساعة.
بعد أخذه عن طريق الفم يتم امتصاصه بشكل سريع عن طريق الجهاز الهضمي و يوزع إلى باقي أنحاء الجسم في وقت أقصاه ٣-١ ساعات تقريباً بعد تناول الجرعة.
يصل إلى أعلى تركيز له في بلازما الدم خلال ٢,٦ ساعة.
يرتبط بروتينات البلازما بنسبة ٦٠-٧٠٪، تتم عملية إخراجها بشكل رئيسي عن طريق المصارة الصفراوية في الكبد، بينما يتم إخراج ١٠٪ من الجرعة المأخوذة عن طريق البول بدون أن يحدث لها أي تغير.

دواعي الاستعمال:

يستعمل فيكسودين لمعالجة الأعراض المصاحبة للتهاب الأنف التحسسي الموسمي والحكة المزمنة غير معروفة السبب.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال فيكسودين للمرضى الذين يبدون حساسية لأي من مكوناته.
يجب عدم إعطاء الدواء للأطفال تحت عمر ١٢ عاماً.

الاحتياطات:

مع أن فيكسوفينادين لا يسبب النعاس، إلا أنه قد يتم الشعور به عند عدد قليل من الأشخاص، لذلك يجب التأكد من سلامة تأثيره على الأشخاص قبل تشغيل الماكينات وقيادة السيارات. كما يمكن أن تزداد احتمالية الشعور بالنعاس عند أخذ الدواء بشكل متزامن مع شرب الكحول أو مع تعاطي أحد مضطبات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.
لا ينصح بإعطاء فيكسوفينادين خلال فترة الحمل أو الإرضاع.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

يؤدي الاستعمال المتزامن للفيكسوفينادين مع الأريثروميسين أو الكيتوكونازول إلى زيادة نسبة التوافر الحيوي للفيكسوفينادين.
لم يتم هنالك حدوث أي تفاعلات بين الفيكسوفينادين والأوميفرازول.
لقد أدى تناول مضادات الحموضة المحتوية على هيدروكسيد الألمنيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم قبل ١٥ دقيقة من تناول الفيكسوفينادين إلى خفض مستوى التوافر الحيوي، لذا ينصح بترك فترة زمنية مقدارها ساعتين بين تناول فيكسودين ومضادات الحموضة هذه.

المحاذير:

يجب استعماله بحذر عند المرضى كبار السن و عند المرضى المصابين بخلل في وظائف الكبد أو الكلى.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

الجرعة اليومية الموصى بها هي ٦٠ ملجم مرتين يومياً أو ١٢٠ - ١٨٠ ملجم مرة واحدة يومياً.
الجرعة اليومية الموصى بالبدء بها عند المرضى المصابين بهبوط في الوظائف الكلوية هي ٦٠ ملجم مرة واحدة يومياً.

زيادة الجرعة:

في حالة زيادة الجرعة يجب أن تكون المعالجة داعمة ومعالجة للأعراض.
لا يمكن إزالة الفيكسوفينادين عن طريق الديليزة.

الآثار الجانبية:

لقد تم تسجيل الحالات التالية:
صداع، نعاس، غثيان، دوار، شعور بالتعب.
يجب مراجعة الصيدلاني أو الطبيب المعالج في حالة ظهور أي عرض جانبي.

الاحتياطات الصيدلانية:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥-٣٠ م°).
لا تستعمل الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته أو عند ملاحظة أي علامة تلف فيه.

العبوات:

فيكسودين ٦٠ ملجم: عبوة تحتوي على ١٤ قرص.
فيكسودين ١٢٠ ملجم: عبوة تحتوي على ١٤ قرص.
فيكسودين ١٨٠ ملجم: عبوة تحتوي على ١٤ قرص.
تتوفر عبوات خاصة بالمستشفيات.

Ⓢ علامة تجارية

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر بوترل على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات معرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الدواء وتعليمات الصيدلاني الذي صدره لك.
- الطبيب والصيدلاني هما المهيومان بالدواء ولنفعه وضروبه.
- لا تطلب مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالنة العرب.



إنتاج: شركة تبوك للصناعات الدوائية.
ص.ب. ٣١٢٢، تبوك-المملكة العربية السعودية.