

# لوراداي

## لورادايين

### اسم المنتج

أقراص لوراداي ١٠ ملجم.  
شراب لوراداي.

### التركيب

أقراص لوراداي : كل قرص يحتوي على ١٠ ملجم لورادايين.  
شراب لوراداي: كل ٥ مل تحتوي على ٥ ملجم لورادايين.

### العبوات

أقراص لوراداي متوفرة في عبوات من ١٠ و ٣٠ قرص.  
شراب لوراداي متوفر في عبوات زجاجية حجم ١٠٠ و ١٢٠ مل.

### دواعي الاستعمال

لوراداي مضاد هستاميني طويل المفعول ذو تأثير مضاد لمستقبلات (H<sub>1</sub>) الطرفية ، ليس له أي تأثير مركب عندما يستخدم بالجرعة الموصى بها، يستخدم لوراداي للتخفيف من أعراض حساسية الأنف الموسمية وأعراض الأرتيكاريا المزمنة بالإضافة إلى أمراض الجلد التحسسية.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

أقراص لوراداي:  
- للبالغين والأطفال ٦ سنوات وما فوق: قرص لوراداي مرة واحدة يومياً.

شراب لوراداي:  
- للأطفال ٥ - ٥ سنوات: ملعقة صغيرة (٥ مل) مرة واحدة يومياً.  
- للبالغين والأطفال ٦ سنوات وما فوق: ملعقتان صغيرتان (١٠ مل) يومياً.

### التحذيرات

- يستخدم بحذر للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد والكلية مع ضرورة تخفيض الجرعة.  
- الإستخدام الآمن والفعال للورادايين من قبل الأطفال ما دون السنتين لم يثبت إلى الآن.  
- لا يوصى باستخدامه خلال فترة الحمل والإرضاع المالم بوصف من قبل الطبيب المختص.

### موانع الاستعمال

يمنع استخدامه في حالة المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه اللورادايين.

### الأعراض الجانبية

لوراداي لا يسبب نعاس ملحوظ عندما يستخدم بالجرعة الموصى بها. أكثر الأعراض الجانبية التي وردت شملت: صداع، شعور بالتعب، اضطرابات معوية وجفاف في الفم.

### التداخلات الدوائية

الإستخدام المتزامن للورادايين مع الإريثروميسين، الكيتوكونازول، السيميتيدين ومضادات الفيروسات كالأمبيرنافير قد يزيد من تركيز اللورادايين في بلازما الدم.

### حركية الدواء

يمتص اللورادايين سريعاً بعد تناوله، ويصل لذروة تركيزه في البلازما بعد ساعة تقريباً. يستقلب اللورادايين في الكبد بشدة متحولاً إلى مستقلب فعال (الديسلورادايين) والذي يملك تأثير مضاد هستاميني قوي.  
يفرز اللورادايين ومستقلباته بشكل ملحوظ في حليب الثدي كما يتم طرح اللورادايين ومستقلباته بشكل متساوي عن طريق البول والبراز.

### الجرعة المفرطة

أعراض فرط الجرعة للورادايين تشمل الوهن والصداع والزيادة في ضربات القلب.  
اللورادايين غير قابل للديليزة ولايعرف له أي ترياق محدد حتى الآن، لذا في حال فرط الجرعة يجب أن يبدأ العلاج العرضي والمساعد فوراً.

### التخزين

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥° مئوية، بعيداً عن الضوء.

## أن هذا المستحضر " دواء "

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً للتعليمات قد يعرضك للخطر.
- اتبع إرشادات وصفة الطبيب بتطبيق طريقة الإستعمال على نحو صارم ودقيق وكذلك تعليمات الصيدلي الذي قام بصرفها أو بيعها لك.
- فالطبيب والصيدلي هما خبيران بنفع الدواء وضرره.
- لا توقف من تلقاء نفسك وبدون مبرر مدة العلاج المحدد لك بموجب الوصفة الطبية.
- لا تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبية.

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيداللة العرب



الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية. K.S.C. (Closed) Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co.

ص.ب. ٥١٢ الصفاة - المرز البريدي: ١٣٠٥١ دولة الكويت - هاتف: +٩٦٥ ٤٧٤٥٠١٢/٢٤ - فاكس: +٩٦٥ ٤٧٤٥٣٦١  
P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Tel: +965 4745012/3/4 - Fax: +965 4745361