

بيسكور®

بيسوبرولول فيوماريت

المعلومات الفارماكولوجية

بيسكور® هو حاصر انتقائي لمستقبلات بيتا 1.

الاستجابات

- فرط ضغط الدم
- الذبحة الصدرية

الجرعة وطريقة الاستخدام

- جرعة بيسكور® تقيم بشكل دائم بناءا على حاجة المريض الجرعة الاعتيادية تبدأ من 5ملغم مرة واحدة يوميا. إذا لم تكون الاستجابة كاملة ترفع الجرعة إلى 10ملغم وبعد ذلك إذا استمدت الحاجة يمكن زيادتها إلى 20ملغم.
- لا حاجة لتعديل جرعة البيسكور® للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي أو فشل كلبي بسيط أو متوسط.
- في حالة الفشل الكلوي الشديد (تصفية الكرياتينين أقل من 20مل/دقيقة) وفي حالة الفشل الكلوي الشديد الجرعة اليومية يجب أن لا تتجاوز 10ملغم.

الحمل والإرضاع

- يصنف بيسوبرولول ضمن الفئة C ويستخدم فقط إذا كانت الفائدة المتوخاة تفوق المخاطر المتوقعة.
- يمنع إعطاء بيسوبرولول خلال الحمل ولكن فيما لو كان قد استخدم فيجب وقف استخدامه قبل 72 ساعة من موعد الولادة المتوقع. وذلك لتجنب هبوط ضغط الدم والنقص وانخفاض سكر الدم للوليد. وفي حال تعذر ذلك يجب مراقبة الوليد بشكل مكثف لمدة 48 إلى 72 ساعة بعد الولادة.
- لا يعرف حتى الآن فيما إذا كان بيسوبرولول يفرز في حليب الأم. يجب توخي الحذر عند استخدامه بواسطة الأم المرضع.

الأعراض الجانبية

- بيسكور® يتم احتماله بشكل جيد بشكل عام. يمكن أن تظهر بعض الأعراض الجانبية وخصوصا خلال بداية فترة العلاج والتي تتلاشى تقريبا خلال أسبوع واحد إلى أسبوعين. ومن هذه الأعراض الجانبية: دوخة، صداع بسيط، تعرق، اضطراب في النوم، مزاج اكتئابى. وفي بعض الحالات النادرة يمكن ملاحظة الأعراض التالية:- اضطرابات معوية (إسهال، إمساك، غثيان وآلم بطني). تفاعلات جلدية (إحمرار، حكة). انخفاض ملحوظ في ضغط الدم والنقص، اضطرابات في التوصيل الأثني البطيني نحر ويرة في الأطراف- ضعف العضلات وتشنجها. قلة الدموع، زيادة مقاومة القنوات التنفسية، ضعف احتمال السكر عند مرضى السكري الكبار في السن.

الاحتياطات والتحذيرات

- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحالات التالية:
- كبار السن الذين يعانون من مرض السكري وحموضة الدم، وذلك لأن بيسوبرولول يمكن أن يسبب ضعف في احتمال السكر لديهم.
- كما هو الحال مع حاصرات بيتا الأخرى. قد يخفي بيسوبرولول أعراض انخفاض السكر في الدم عند مرضى السكري.
- ربما تتأثر القدرة على قيادة السيارة وتشغيل الماكينات وخصوصا في الفترات الأولية لبدء العلاج أو عند تغيير العلاج أو عند تناول الكحول. وذلك يعود إلى اختلاف الاستجابة للعلاج من شخص لآخر.
- يجب عدم إيقاف العلاج بشكل مفاجئ بل تدريجيا.
- يجب إعلام المرضى الذين يستخدمون العدسات اللاصقة حدوث احتمالية في انخفاض إفراز الدموع لديهم عند استخدام بيسوبرولول.
- مرضى العرج المتقطع وداء رينود. وذلك لأن حاصرات بيتا بما فيها بيسوبرولول قد تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية المحيطية.
- مرضى الربو، وذلك لتجنب أية انقباضات محتملة للقصبات الهوائية.

التداخلات الدوائية

- إن الاستخدام المتزامن لبيسوبرولول مع الأدوية المنخفضة لضغط الدم قد يزيد من مفعولها.
- الإستخدام المتزامن للتيكيديين قد يزيد من الأثر الخافض لضغط الدم

للبيسوبرولول.

- يجب مراقبة المرضى بشكل حثيث في حال إعطاء بيسوبرولول بشكل متزامن مع حاصرات قناة الكالسيوم وخصوصا فيراباميل وديلتازم وأي دواء آخر يستخدم لعلاج اضطراب نبضات القلب كون ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والنقص وعدم انتظام ضربات القلب.
- يمكن أن يؤدي ريفاميسين إلى نقصان عمر النصف لطرح (بيسوبرولول) لكن ذلك لا يستدعي أي تعديل على الجرعة اليومية.
- كميته من حاصرات بيتا. يزيد (بيسوبرولول) من تأثير الأسولين والأدوية الخافضة لسكر الدم إذا أعطيت بشكل متزامن لذا يجب مراقبة مستويات الدم بشكل منتظم لأن بيسوبرولول يمكن أن يخفي أعراض انخفاض السكر في الدم.
- يجب التعامل بحذر مع المرضى الذين يعطوا مواد التخدير.
- يجب مراقبة المرضى بشكل حثيث في حال أعطوا ريزيرين. أنفا ميلل دوبا، كلونيدين، أو أوجانفاسين مع بيسوبرولول بنفس الوقت لتجنب أي انخفاض شديد في ضربات القلب.
- إذا توجب إعطاء بيسوبرولول مع كلونيدين بنفس الوقت فيجب عدم إيقاف كلونيدين إلا بعد عدة أيام من إيقاف بيسوبرولول.

مضادات الاستطباب

- فصور عضلة القلب غير العلاج احتشاء عضلة القلب حديثا، الصدمة، حصار القلب الأثني البطيني من الدرجة الثانية والثالثة. حصار القلب الجيبي الأثني ضعف النقص الشديد، انخفاض الضغط، الربو القصبي المراحل المتقدمة من اضطراب الدورة الدموية الطرفية، مرض جيب القلب، الحمل والإرضاع.
- وعند الأطفال يمكن إعطاء بيسوبرولول في حالة سرطان الغدة فوق الكلوية فقط بعد إعطاء حاصرات ألفا.

فرط الجرعة

- يجب إيقاف الدواء مباشرة وإعطاء الترياقات التالية معا أو بشكل متتابع إذا لزم الأمر: أتروبين بالحقن الوريدي 0.5-2 ملغم، حقن وريمي بطى من أورسيزينالين إلى أن يظهر مفعوله، وجلوكاجون من 1-5 أو 10 ملغم.

المكونات غير فعالة للأقراص

- فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة نشا الذرة، بوفيدون -ك، جلايكوليت نشا الصوديوم، ميكروكريستالين سيليلوز، ستيريت المغنسيوم، ثنائي أكسيد السيليوم اللامائي الغروي، اوبادري ابيض، مادة ملونة (sunset Yellow) (FCF)

شروط التخزين

- يحفظ بدرجة حرارة دون 25°م.

العبوات

- بيسكور® 5ملغم أقراص مغلفة بفلم: بيسوبرولول 5ملغم/أقراص (متوفر بعبوات مختلفة).
- بيسكور® 10ملغم أقراص مغلفة بفلم: بيسوبرولول 10ملغم/أقراص (متوفر بعبوات مختلفة).

إن هذا دواء - لا تشرك الأروسة في مشاركون أسدي الأطفال

- دواء بيسكور® يؤثر على سكره ويسبب انخفاضه لذلك تجنبك قيادة للسيارة
- خذ دواء بيسكور® مع وجبة طعام أو مشروب
- لا تشرب دواء بيسكور® مع مشروبات تحتوي على الكافيين
- لا تشرب دواء بيسكور® مع مشروبات تحتوي على الكافيين
- لا تشرب دواء بيسكور® مع مشروبات تحتوي على الكافيين

