

ميفوكسين MIFOXIN



ميفوكسين أقراص : MIFOXIN tablet التعريف و المكونات

ميفوكسين ، مضاد حيوى واسع المجال (أى مضاد للبكتيريا المسببة للأمراض ، و البكتيريا كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ، و هذه البكتيريا عندما تصيب جسم الانسان تؤدي لاصابة بالامراض) .

المادة الفعالة فى ميفوكسين ، هى سيبروفلوكساسين (سيبرو- فلوكسا-سين ، ciprofloxacin) و هى مادة تنتمى لعائلة من مضادات الجراثيم تسمى كينولون ، Quinolone و المادة الفعالة فى ميفوكسين فعالة ضد مجموعة واسعة من البكتيريا و الجراثيم المسببة للأمراض.

ميفوكسين أقراص : MIFOXIN tablet دواعى و إرشادات الاستعمال

يجب توضيح ما يلى قبل الشروع فى الحالات التى يعالجها ميفوكسين اقراص :

- الطبيب يحدد المضاد الحيوى المناسب للحالة بناء على عدة عوامل منها : الحالة المرضية نفسها ، الميكروب المسبب للحالة المرضية و مدى تأثرة بالمضاد الحيوى ، الحالة الصحية العامة للمريض ، و عوامل اخرى.
- قد يلجأ الطبيب الى طلب تحاليل معملية معينة ليستطيع تحديد المضاد الحيوى المناسب للحالة المرضية.
- الحالات المذكورة فى المقال ، لا تشمل كل الحالات التى يمكن ان يعالجها ميفوكسين اقراص، ولكنها الحالات الأكثر شيوعا ، و الاصل فى استخدام المضاد الحيوى هو الكشف على الميكروب (البكتيريا) و تحديد بدقة ثم وصف مضاد حيوى فعال تجاة هذا الميكروب (البكتيريا أو الجرثومة.)

دواعى إستعمال ميڤوكسين

اولا: العدوى البكتيرية التى تصيب الجهاز التنفسى العلوى و تتسبب فى الحالات التالية :

1. التهاب الاذن الوسطى. otitis media
2. التهاب الجيوب الانفية. sinusitis
3. التهاب اللوزتين. tonsillitis
4. التهاب الحلق و البلعوم. pharyngitis
5. غيرها من حالات الالتهاب البكتيرى التى تصيب الجهاز التنفسى العلوى.

ثانيا : العدوى البكتيرية التى تصيب الجهاز التنفسى السفلى و تتسبب فى الحالات التالية

- الالتهاب الرئوى. pneumonia
- التهاب الشعب الهوائية (القصبات bronchitis) بنوعية الحاد و المزمن.

ثالثا العدوى البكتيرية التى تصيب الجهاز البولى و تتسبب فى التهابات المسالك البولية مثل

1. التهاب المثانة البكتيرى. cystitis
2. التهاب حويصلة الكلى. pyelonephritis
3. التهاب مجرى البول. urethritis

رابعا : العدوى البكتيرية التى تصيب الجلد و الانسجة الرخوة , او الوقاية منها مثل

1. الجروح و الحروق.
2. بعد الاجراءات التى قد تتم على الجلد مثل الخياطة و عمليات التجميل او الرسم على الجلد (التاتو.)

خامسا : فى اجراءات الاسنان

1. فى حالة الخراييج فى اللثة.
2. بعد اجراءات خلع الاسنان او اى اجراء اخرى للوقاية من حدوث اى التهاب بكتيرى و خصوصا التهاب الشغاف البكتيرى او. endocarditis

سادسا : استخدامات متنوعة

- علاج مرض السيلان الحاد غير المصحوب بمضاعفات و التهاب فى عنق الرحم.
- قد يستخدم هذا الدواء لعلاج حالات مرضية غير المذكورة سالفاً.

ميڤوكسين أقراص: MIFOXIN tablet الجرعة

الجرعة اليومية و مدة تناولة تختلف بحسب العوامل التالية

1. الحالة المرضية.

2. حدة الحالة.
 3. الحالة الصحية للمريض المتناول.
 4. عمر المريض.
 5. عوامل اخرى.
- و لكن هناك جرعة مقترحة موصى بها لمعظم الحالات فى السن او العمر المستهدف و هى قرص واحد كل 12 ساعة لمدة تتراوح من 5 الى 10 ايام.

مع ضرورة التنوية الى التالى :

- الجرعة المقترحة المذكورة للبالغين و الاطفال اكبر من 8 سنوات.
- الطبيب سيقوم بتقرير و تقدير الجرعة و المدة المطلوبة.
- الجرعة المقترحة و المدة الموصى بها قد تتغير بالزيادة او النقصان وفقا للعوامل سالفة الذكر.

ميفوكسين أقراص : MIFOXIN tablet أرشادات الأستعمال

- يستخدم هذا الدواء لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية.و لا يستخدم فى علاج العدوى الفيروسية.
- الاستخدام غير الضروري أو إساءة استخدام أي مضاد حيوي يمكن أن يؤدي الى تناقص فعالية.
- يتم تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع او بدون الطعام, حسب توجيهات الطبيب، و فى العادة مرتين فى اليوم فى الصباح والمساء.
- توصى الشركة المنتجة لهذا الدواء بتناول القرص بأكمله دون سحق أو مضغ , و لكن فى حال تقسيم القرص الى نصفين فقد يشعر المتناول بطعم مر فى الفم عند التناول.
- من المنصوح به شرب الكثير من السوائل أثناء تناول هذا الدواء ما لم يوصى الطبيب بخلاف ذلك.
- هناك ادوية اخرى قد تتسبب فى تناقص فاعلية هذا الدواء فى حال تزامن تناولهما معا , و لذلك يوصى بتناول هذا الدواء قبل 2 ساعة على الأقل أو بعد 6 ساعات من هذه الادوية و من امثلة هذه الادوية : كوينابريل، سوكرفات والفيتامينات / المعادن (بما فى ذلك الحديد ومكملات الزنك)، والمنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم، الألومنيوم، أو الكالسيوم (مثل مضادات الحموضة، مكملات الكالسيوم).
- الأطعمة الغنية بالكالسيوم، بما فى ذلك منتجات الألبان (مثل الحليب واللبن)، يمكن أيضا أن تقلل من تأثير هذا الدواء.و لذلك ينصح بتناول هذا الدواء قبل 2 ساعة على الأقل أو بعد 6 ساعات من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.
- المضادات الحيوية تعمل بشكل أفضل عندما يتم الاحتفاظ بكمية الدواء فى الجسم عند مستوى ثابت. ولذلك ، يجب تناول هذا الدواء على فترات متباعدة بشكل متساو (أى كل 12 ساعة بالفعل).
- يجب مواصلة تناول هذا الدواء حتى يتم الانتهاء من كامل الجرعة المنصوص عليها، حتى لو اختفت الأعراض بعد بضعة أيام.لأن وقف الدواء فى وقت مبكر قد يؤدي إلى عودة العدوى.

ميفوكسين : احتياطات و تحذيرات

مقدمة هامة

- المقال التالي يتناول الاحتياطات و الاجراءات التى يجب على المريض اتباعها و الالتزام بها خلال فترة تناول لعقار ميفوكسين أقراص , و ذلك لتجنب و لتقليل الاثار السلبية التى يمكن ان تنتج من استخدام.
- المادة الفعالة فى ميفوكسين أقراص هى (سيبروفلوكساسين) و خلال سطور المقال سيتم استخدام الكلمتين بالتبادل (ميفوكسين أقراص = سيبروفلوكساسين) , فكلاهما مترادفان.
- هذا الجزء من المقال سيكون مقسم على شكل موضوعات , و كل موضوع يتناول مشكلة يمكن ان يسببها عقار ميفوكسين أقراص بالشرح و التفصيل ثم يتبعها الاجراءات و الاحتياطات الواجب اتباعها.
- الاجراءات و الاحتياطات المذكورة فى المقال , يجب الحرص على اتباعها بشدة فى الحالات التى تستدعى تناول عقار ميفوكسين أقراص لفترات طويلة (تزيد عن 10 ايام) .
- الاجراءات و الاحتياطات التى سيتم ذكرها فى المقال تنطبق على جميع التركيزات و الأشكال الدوائية لدواء ميفوكسين أقراص ... (ميفوكسين 250 مجم اقراص , 500 مجم اقراص , 750 مجم اقراص) .

الاحتياطات و التحذيرات بخصوص ميفوكسين

اولا : الحساسية لمركبات الكينولون

- الحساسية للمادة الفعالة المكونة لعقار ميفوكسين أقراص (مادة سيبروفلوكساسين) أو للمواد المشابهة فى التركيب رد فعل خطير , و لكنه نادر الحدوث , و تتمثل اعراضه فى ظهور طفح جلدى , مع تورم خصوصا فى الوجه و اللسان مع ضيق فى التنفس.
- اذا كنت تعلم أنك تعاني من حساسية تجاه مادة سيبروفلوكساسين أو اى مادة فعالة أخرى تنتمى الى فئة الكينولون مثل النورفلوكساسين، جيمفلوكساسين، الليفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، أو أوفلوكساسين... فيجب فى هذه الحالة اخبار الطبيب المعالج بذلك.... قبل البدء فى استخدام و تناول ميفوكسين أقراص.
- فى العادة ما تظهر اعراض التحسس للمادة الفعالة بعد تناول اول جرعة, و فى حال ظهور الاعراض التحسسية السالفة الذكر (تورم و طفح جلدى و ضيق فى التنفس) , يجب التوقف عن تناول الدواء , و مراجعة الطبيب , مع ضرورة التوجه لمكان مجهز طبيا فى حال ما اذا كانت الاعراض التحسسية متفاقمة .

ثانيا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet يمكنه أن يؤدي الى التهاب الاوتار

- الوتر هو النسيج الذى يربط العضلات مع العظام , و التهاب الاوتار من الحالات التى قد يسببها تناول هذا الدواء.
- تزيد احتمالية حدوث التهاب الاوتار نتيجة تناول ميفوكسين أقراص فى الاطفال و المرضى كبار السن.
- اذا كان المريض يتناول عقاقير تنتمى الى الاستيرويدات (مشتقات الكورتيزون) مثل هيدروكورتيزون او بريدنيزولون خلال فترة تناول سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) فان احتمالية حدوث التهاب الاوتار تزداد.
- لذلك فمن المنصوح به تجنب الانشطة الرياضية العنيفة او القاسية خلال فترة تناول هذا الدواء , و خصوصا اذا كان التناول لفترات طويلة.

ثالثا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet يمكنه ان يؤثر على انتظام ضربات القلب

- فى الشخص الطبيعى الصحيح تقوم عضلة القلب بالانقباض و الانبساط بمعدل و معيار ثابت و منتظم , و لكن كنتيجة لحالات مرضية معينة قد يحدث اضطراب فى معدل و انتظام ضربات القلب , الامر الذى بالضرورة يؤدي الى مشكلات اخرى.
- مادة سيبروفلوكساسين، المادة الفعالة فى اقراص ميفوكسين أقراص ، قد تؤدي الى أختلال فى معدل و انتظام ضربات القلب , فى حالة تعرف ب... (QT prolongation) و فيها يحدث اضطراب و عدم انتظام فى معدل ضربات القلب , و هذا الأختلال فى ضربات القلب قد يؤدي الى الاغماء المفاجيء أو الاصابة بتشنجات , و فى حالات نادرة عندما ينبض القلب بشكل متقطع لفترات طويلة فقد يؤدي ذلك الى الموت المفاجيء.
- خطورة حدوث مشكلات نتيجة (QT prolongation) تزداد اذا تم تناول سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) مع ادوية اخرى او حالات مرضية معينة , من شأنها هى الاخرى ان تسبب عدم انتظام فى ضربات القلب...مثل الحالات و الادوية التالية:

1. انخفاض مستويات البوتاسيوم و المغنسيوم فى الدم.
2. التعرق الشديد أو الاسهال و القيء الشديد.
3. استخدام الادوية المدرة للبول.
4. تاريخ عائلى مع مشاكل فى القلب تؤدي الى QT prolongation
5. فشل فى عضلة القلب (حالة يعجز فيها القلب عن ضخ ما يكفى من الدم.)
6. المرضى الذين عانوا مؤخرا من نوبات قلبية.

لذلك يجب الحذر عند تناول ميفوكسين أقراص فى الحالات السالفة الذكر .

رابعا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet يمكنه ان يؤثر على مستويات السكر فى الدم و خصوصا فى مرضى السكر

- سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) قد يزيد من قدرة و فاعلية بعض ادوية السكر , و بالتالى قد يؤدي ذلك الى انخفاض نسبة السكر فى الدم , فذلك من المنصوح به لمرضى السكر الذين يتناولون سيبروفلوكساسين ان ينتبهوا الى اعراض انخفاض نسبة السكر فى الدم (لتعرق المفاجيء، والرعشة ، سرعة ضربات القلب، والجوع، عدم وضوح الرؤية، والدوخة، أو وخز اليدين / القدمين.)
- إذا كنت تعاني من أعراض انخفاض السكر فى الدم، فيمكن رفع نسبة السكر فى الدم عن طريق استخدام أقراص الجلوكوز أو تناول مصدر من السكر مثل سكر المائدة أو العسل، أو حلوى، أو شرب عصير الفواكه.
- من المنصوح به لمرضى السكر الذين يتناولون ميفوكسين أقراص ما يلى:

1. تناول وجبات الطعام طبقا لجدول منتظم.
2. عدم تخطى وجبات الطعام.

3. ابلاغ الطبيب في حالة انخفاض مستويات السكر في الدم , حيث سيقوم بتبديل المضاد الحيوى من سيبروفلوكساسين الى أى مضاد حيوى اخر مناسب للحالة او تعديل فى ادوية السكر الخاصة بالمريض أو تعديل فى جرعاتها.

خامسا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet قد يسبب الدوار و الدوخة

هذا الدواء قد يجعل المريض يشعر بالدوار و الدوخة , و لذلك فمن المنصوح بة عدم استخدام الالات الميكانيكية أو قيادة المركبات او القيام بأى نشاط يتطلب اليقظة و الانتباه حتى يتأكد المريض من انه بكامل يقظته و اتزانة , كما ينصح بعدم تناول المشروبات الكحولية خلال فترة تناول (سيبروفلوكساسين) ميفوكسين أقراص .

سادسا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet قد يزيد من حساسية الجلد تجاه اشعة الشمس

هذا الدواء قد يجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس, و لذلك ينصح بالتالى أثناء تناول السيبروفلوكساسين :

1. تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
2. تجنب عملية الـ tanning او صبغ الجلد بأستخدام الأشعة فوق بنفسجية و المصابيح الشمسية.
3. استخدام مستحضرات واقية من الشمس وارتداء ملابس واقية عند الخروج أثناء النهار.
4. تجنب استخدام الادوية و العلاجات الاخرى الموضعية التى من شأنها ان تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس خلال فترة تناول سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) مثل ترتينوين (رين أية كريم) أو هيدروكينون (الدوكين كريم) .

سابعا : ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet قد يؤثر على فاعلية تطعيمات و لقاحات معينة

سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) قد يؤدي الى عدم فاعلية تطعيمات و لقاحات معينة مثل (لقاح التيفوئيد) , و لذلك فمن المنصوح بة عدم تناول اى جرعات تطعيمية او لقاحات خلال الفترة التى يتم فيها تناول سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) .

ثامنا : الاطفال أكثر حساسية للاعراض الجانبية لعقار ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet

قد يكون الأطفال أكثر حساسية للاثار الجانبية لهذا الدواء و خصوصا مشكلة التهاب الاوتار التى يمكن ان يسببها عقار سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص.)

تاسعا : كبار السن اكثر حساسية للاعراض الجانبية لعقار ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet

كبار السن اكثر حساسية لاعراض سيبروفلوكساسين الجانبية

قد يكون كبار السن أكثر حساسية للاثار الجانبية لهذا الدواء, و خصوصا مشكلة التهاب الاوتار و تزيد المخاطر للاصابة بالتهاب الاوتار فى المرضى الذين يتناولون عقاقير الستيرويدات (مشتقات الكورتيزون) مثل بريدنيزون أو الهيدروكورتيزون)

تزداد مخاطر QT prolongation فى المرضى كبار السن نتيجة تناول ميفوكسين أقراص.

ملحوظه هامة

ما سبق يعتبر أشهر الاجراءات و الاحتياطات الواجب اتباعها فى حال تناول دواء ميفوكسين أقراص , و لا يعتبر المقال حصر كامل و شامل لجميع الاجراءات و الاحتياطات الواجبة .

ميفوكسين أقراص : MIFOXIN tablet الاعراض الجانبية و الآثار الغير مرغوب بها

مقدمة هامة

- قبل الشروع فى سرد الاعراض الجانبية التى يمكن ان تترتب على استخدام (ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet) يجب توضيح النقاط التالية:
- الطبيب المعالج قام بوصف هذا الدواء بعد ان تأكد من أن المنافع المترتبة على استخدامة تفوق الاضرار و الآثار السلبية التى يمكن ان تحدث نتيجة استخدامة.
- ليس بالضرورة ان يختبر المريض الذى يتناول الدواء كل الاعراض الجانبية التى سيتم ذكرها فى المقال , و لكن يمكن يختبر عرض واحد او اثنان , و يمكن ان لا يشعر بأى اعراض جانبية على الاطلاق.
- الأطفال و كبار السن اكثر حساسية للاعراض الجانبية التى يمكن ان تنتج من هذا الدواء.
- الجرعة و مدة الاستخدام من العوامل التى تتناسب طرديا مع امكانية حدوث الاعراض الجانبية , بمعنى انة كلما زادت الجرعات و زادة مدة الاستخدام , فان احتمالية حدوث الاعراض الجانبية تزداد , و لكن بالجرعات الموصى بها و لمدد صغيرة (من 5 الى 10 ايام) , فان الاعراض الجانبية تظل فى اطارها المحدود.
- ينبغي لهذه المعلومات الواردة فى المقال ان لا تحل محل الرعاية الطبية والمشورة من أخصائي الرعاية الصحية.

الأعراض الجانبية و الآثار الغير مرغوبة لـ ميفوكسين

ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet ينتمى الى فئة من المضادات الحيوية تسمى فلوروكينولون , و بشكل عام , لا يجب استخدام المضادات الحيوية بدون داعى أو ضرورة , و لأن الفلوروكينولون تعتبر من المضادات الحيوية الاكثر خطورة , فلا يجب استخدامها الا فى الحالات التى تستدعيها, و التى يقرها الطبيب المعالج المختص.

اولا : الاعتلال العصبى المحيطى Peripheral Neuropathy

و هو عبارة عن تلف يصيب أعصاب الذراعين و / أو الساقين . , و يتميز بالاعراض التالية:

- الألم، و احساس بالحرقان و الوخز، و تنميل ، والضعف، فى الذراعين او الساقين.
- تغير فى حاسة اللمس أو الاحساس بالالام او بدرجة الحرارة او تغير فى الشعور بوضعية الجسم.

ثانيا : اعراض تصيب الجهاز العصبى

و تشمل ما يلى : الدوخة، والشعور بالضيق، والضعف، والصداع والقلق والذعر، وفقدان الذاكرة، والذهان.

ثالثا : اعراض تصيب العضلات و العظام

تمزقات الأوتار، التهاب الأوتار، والضعف، وتورم المفاصل.

رابعا : اعراض تصيب الحواس

و تشمل : طنين فى الاذن ، تغيرات فى الرؤية , تغيرات فى حاسة الشم و السمع.

خامسا : أعراض تصيب الاوعية الدموية و القلب
عدم انتظام دقات القلب، وضيق في التنفس، ألم في الصدر، والخفقان.

سادسا : اعراض جلدية
الطفح الجلدي، وفقدان الشعر، والتعرق.

سابعا : أعراض تصيب الجهاز الهضمي
الغثيان، والتقيؤ، والإسهال، والام في البطن.

ميفوكسين أقراص : MIFOXIN tablet الأستخدام أثناء الحمل و الرضاعة

مقدمة هامة

- فى البداية يجب توضيح ما يلى أن كل امراة تحمل معرضة بنسبة من 3 الى 5 % الى ان تضع جنين مصاب بعيب خلقى ما, بدون اى سبب , و هذا يسمى علميا. (background risk)
- المقال التالى سيناقش ما اذا كان استعمال سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet خلال فترة الحمل يزيد من احتمالية الاصابة بعيوب خلقية (اى يرفع نسبة الاصابة اكثر من 5.) %
- بشكل عام هناك مضادات حيوية تمت دراستها بشكل موسع , و اجريت عليها دراسات عديدة ثبت من خلالها الامان التام لهذة المضادات الحيوية , اما بالنسبة للسيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet فان الدراسات تعتبر غير كافية و لذلك فأنه يجب عدم اللجوء الى استخدام السيبروفلوكساسين خلال فترة الرضاعة و الحمل الا فى الحالات التى لم تستجيب للمضادات الحيوية الاخرى التى تمت دراستها بشكل كافى.
- ينبغي لهذه المعلومات الواردة فى المقال ان لا تحل محل الرعاية الطبية والمشورة من أخصائي الرعاية الصحية.
- حتى تصل المعلومة بشكل صحيح و بطريقة واضحة , فقد وجدنا انه من الافضل ان يكون هذا الجزء من المقال ال على شكل سؤال و جواب , فهذة الطريقة ستساعد فى إيصال المعلومات بشكل اسهل و اوضح.

اولا : ميفوكسين أثناء الحمل

هل هناك خطر متزايد للإجهاض فى حال ما إذا تناولت الحامل سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص MIFOXIN tablet.) خلال الأشهر الثلاثة الأولى؟

عندما يتم تناولة بحسب الجرعات الموصى بها، فإن سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet من غير المرجح أن يزيد من خطر الإجهاض.

هل هناك خطر متزايد لاصابة الجنين بتشوهات خلقية أو حدوث مشاكل للحمل نفسة , فى حال ما اذا تناولت الحامل سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ؟

معظم الدراسات لم تجد زيادة فى نسبة الاصابة بالعيوب الخلقية عندما تتناول الحامل سيبروفلوكساسين أو المضادات الحيوية الاخرى المنتمية الى الكينولون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الدراسات المشار اليها شملت النساء اللاتى تناولن سيبروفلوكساسين لمدة من خمسة إلى سبعة أيام فقط ، و بالتالى فان آثار الاستخدام على المدى الطويل ليست معروفة جيدا. ومع ذلك، لم يكن هناك خطر متزايد للاصابة بالتشوهات الخلقية فى الاجنة الذين تعرضت امهاتهم الى سيبروفلوكساسين لفترات طويلة خلال فترة حملهن.

هل هناك خطر متزايد لحدوث تأثيرات ضارة للطفل في حال ما إذا تناولت الامهات الحوامل سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل ؟

استنادا إلى عدد صغير من حالات الحمل التي تم دراستها، لا يبدو أن هناك خطر متزايد للآثار الضارة على الطفل إذا تناولت الحامل سيبروفلوكساسين لفترة من الزمن في الثلث الثاني و الثالث من الحمل.

هل يوصى باستخدام سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet أثناء الحمل؟

- بشكل عام لا يجب أن يستخدم سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet في فترة الحمل أو من قبل الأطفال باستثناء الحالات التي لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية الأخرى المعروفة بأمانها , و التي تمت دراستها بشكل كافي.
- بالرغم من ان الدراسات التي تم اجراءها حتى الان على السيبروفلوكساسين تشير الى انة من غير المرجح أن يسبب سيبروفلوكساسين (ميفوكسين أقراص) MIFOXIN tablet تأثيرات ضارة على الجنين او الرضيع او على حالة الحمل نفسها , الأ انة من المفضل استخدام المضادات الحيوية التي تمت دراستها بشكل واسع و ثبت امانها للاستخدام خلال فترة الحمل.
- يجب اللجوء الى السيبروفلوكساسين فقط في الحالات التي لم تستجيب للمضادات الحيوية الاخرى المعروف امانها خلال فترة الحمل .

ثانيا : ميفوكسين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية .

- الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تعتبر سيبروفلوكساسين متوافق مع الرضاعة الطبيعية (أي يمكن استخدامه بواسطة المرضعات) . ويستند هذا على عدد صغير من الدراسات.
- بالرغم من ان سيبروفلوكساسين يتم افرازة في حليب الام الا ان الكمية التي تصل الى الرضيع من خلال حليب الام تعتبر ضئيلة , و لا يتوقع معها ان تتسبب في حدوث مشكلات صحية او آثار سلبية بالغة على الرضيع.
- بالرغم من ضآلة الكمية التي قد تصل الى الرضيع و عدم تسببها في اي مشكلة للرضيع الا انة من المفضل للأم المرضع ان تتناول مضادات حيوية أكثر أمانا اذا امكن ذلك.
- من المحتمل (كباقي المضادات الحيوية) في حال استخدام الام المرضع للسيبروفلوكساسين ان يصاب الرضيع بالاسهال.
- بشكل عام لا يفضل اللجوء الى استخدام المضادات الحيوية خلال الرضاعة الا تحت اشراف طبي مختص , و في الحالات التي تستدعي ذلك , و يجب اللجوء الى السيبروفلوكساسين فقط في الحالات التي لم تستجيب للمضادات الحيوية الاخرى المعروف امانها التام خلال فترة الرضاعة.



هذه الوثيقة تم إعدادها
بواسطة موقع فارماسيا

فارماسيا على الفاسبوك





فارماسيا على تويتر

للمزيد يمكن مطالعة قسم المضادات الحيوية فى فارماسيا .

PHARMACIA1.COM