

آلير

أقراص مغلفة وحلول يؤخذ عن طريق الفم

إسم الشركة : ويسترن للصناعات الدوائية.

الإسم التجاري : آلير ٥ مجم أقراص مغلفة

آلير ٢,٥ مجم / ٥ مللى محلول يؤخذ عن طريق الفم

الاسم العلمي :

ليفوسيتريزين داي هيدروكلورايد

التركيب :

آلير أقراص مغلفة

كل قرص يحتوي على ٥ مجم ليفوسيتريزين داي هيدروكلورايد

الصواغ :

كالمسيوم فوسفات ثنائي القاعدة، ماغنسيوم إستيرات، صوديوم جلايكولات النشا، كولويدل ثاني أكسيد أسيليكون، داي أكسيد التيتانيوم، تلك، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، بولي إيثيلين جليكول ٦٠٠٠، شمع الكروتيا.

آلير محلول يؤخذ عن طريق الفم

كل ٥ مللى يحتوي على ٢,٥ مجم ليفوسيتريزين داي هيدروكلورايد

الصواغ :

أسيتات الصوديوم - حامض خليك ثلجي - مالتوز سائل - جلسرين - ميثيل باربين صوديوم - بروبول باربين صوديوم - مكسبات طعم الموز - ماء نقى

الشكل الصيدلي :

أقراص مغلفة، محلول يؤخذ عن طريق الفم

ماهو آلير وماذا يستعمل؟

آلير هو مضاد للهستامين ويستعمل لعلاج علامات المرض في حالات:

حساسية الأنف (وتشمل حساسية الأنف المستديمة)

ارتيكاريا غامضة المنشأ

قبل استعمال آلير :

يحتوي محلول آلير على مادة السكروز، يجب إبلاغ الطبيب إذا كان لديك مشكلة في امتصاص وأيض بعض السكريات.

لا تستعمل آلير إذا كنت:

لديك فرط حساسية من المادة الفعالة أو أي من المواد الأخرى الموجودة في تركيب آلير

ضعف شديد في وظائف الكلى (فشل كلوي حاد و تصفية الكرياتينين أقل من ١٠ مللى / دقيقة)

توخي الحذر عند استعمال آلير، حيث أنه

لا يوصى باستعماله للرضع أقل من ٦ شهور

تناول أدوية أخرى:

استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أخرى بما فيها الأدوية بدون وصفة طبية

تناول آلير مع الأكل والشرب:

لا يجب استعمال آلير متزامنا مع الكحوليات، تناول الأثنين معا أو تناول آلير مع بعض الأدوية الأخرى في بعض المرضى الحساسين قد

يؤثر على يقظتهم

الحمل والرضاعة :

استشر الطبيب إذا كنتي حاملا أو ترضعين طفلك قبل استعمال آلير

القيادة وتشغيل الماكينات:

في بعض المرضى، قد تحدث أعراض مثل النعاس، التعب والأرهاق عند بدء العلاج ب آلير

إذا كنت تنوي القيادة، المشاركة في أنشطة خطيرة أو تشغيل مكينات، فيجب عليك الانتظار ومابعة مدى استجابتك للدواء وقد أثبتت

الاختبارات الخاصة أن استعمال آلير مع المرضى الاصحاء لا يؤثر على اليقظة العقلية، القدرة على الاستجابة أو القدرة على القيادة

كيفية استعمال آلير :

لا يستعمل للرضع أقل من ٦ شهور

الكبار والأطفال أكبر من ٦ سنوات: ٥ مجم يوميا

(قرص واحد مرة يوميا أو ملعقة كبيرة (١٠ مللى) مرة يوميا)

الأطفال أكبر من ٦ شهور الى ٥ سنوات: الجرعة المبدئية الموصى بها هي ١,٢٥ مجم

(٢,٥ مللى □ ملعقة صغيرة) مرتين يوميا

مرضى الفشل الكلوي: الجرعة الموصى بها أقل من الجرعة المعتادة حسب خطورة أمراض الكلى لديهم، أما الأطفال سوف يحدد الطبيب

الجرعة طبقا لوزن الطفل

ينصح بعدم استعمال آلير مع مرضى الفشل الكلوي

مرضى اختلال وظائف الكبد يجب أن يتناولوا الجرعات المعتاد وصفها

المرضى باختلال في وظائف الكلى والكبد معا، يجب أن يتناولوا جرعات أقل حسب شدة أمراض الكلى التي يعانون منها وكذا في الأطفال،

سوف تحدد الجرعة حسب وزن الطفل

لا يوجد تعديل في الجرعات بالنسبة للمرضى كبار السن إذا كانت وظائف الكلى لديهم طبيعية

كيف ومتى تستعمل آلير؟

للاستعمال عن طريق الفم فقط.

يمكن استعمال آلير بدون تخفيف أو مخفف بالماء

يمكن استعمال آلير مع أو بدون الطعام

ما هي مدة استعمال آلير؟

يحدد الطبيب المدة المقررة لتلقى العلاج حسب حالتك والاعراض التي تعاني منها

إذا استعملت جرعات زائدة من آلير:

قد تشعر بالنعاس، أما الأطفال قد يحدث لهم اثاره وأرق و يعقبها نعاس

إذا كنت تظن أنك تناولت جرعات زائدة من آلير استشر الطبيب

إذا نسيت استعمال آلير:

إذا نسيت استعمال آلير أو إذا استعملت جرعة أقل من التي تم وصفها لك، لا تتناول جرعة مضاعفة استمر في تلقي الجرعات وخذ

الجرعة التالية في ميعادها

إذا توقفت عن استعمال آلير:

إيقاف العلاج ب آلير مبكرا ليس له أي آثار ضارة ولكن تعود اعراض المرض للظهور كما ظهرت قبل بدء العلاج ب آلير إسأل الطبيب أو

الصيدلي إذا كانت لديك أسئلة أخرى

الآثار الجانبية المتوقعة :

مثل باقي الأدوية، يسبب آلير بعض الاعراض الجانبية ولا يصاب بها كل المرضى

الاعراض الشائعة الحدوث: جفاف الفم، صداع، تعب، خمول و نعاس

غير شائعة: ارهاق، ألم في البطن،

أمراض أخرى: خفقان، تشنجات، اضطرابات بصرية، تورم، حكة، طفح جلدي، ارتيكاريا (تورم واحمرار وحكة بالجلد)، ضيق

التنفس، زيادة في الوزن، ألم في العضلات، سلوك عدواني، التهاب كبدى، اختلال وظائف الكبد، غثيان

إذا تطورت أي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي

العبوة والتخزين:

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

آلير أقراص مغلفة

عبوة كرتون تحتوي على شريطين (أومنيوم-أومنيوم) بكل شريط ١٠ أقراص مغلفة ونشرة داخلية.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف.

آلير محلول يؤخذ عن طريق الفم

عبوة كرتون بها عبوة زجاجية بنية اللون (نوع III) سعة ١٢٠ مللى ومييار ونشرة داخلية.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.

اقرأ النشرة الداخلية بعناية قبل البدء في الاستخدام

احتفظ بالنشرة قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى

إسأل الطبيب أو الصيدلي لمزيد من الأسئلة بخصوص المستحضر

لا تصف هذا الدواء لغيرك حتى إذا كانت له نفس أعراضك التي وصف من أجلها هذا المستحضر.

أبلغ الطبيب أو الصيدلي في حالة تفاقم الأعراض الجانبية أو ظهور أعراض جديدة غير موجودة بهذه النشرة.

إنتاج ويسترن للصناعات الدوائية