



# الداكتون<sup>(م)</sup>

منتج من مادة سيبرونولاكتون (حسب دستور الأدوية البريطاني)

## التكسيب:

يؤثر الداكتون في قرص نحوي على ٢٥ مجم أو ١٠٠ مجم سيبرونولاكتون.

## نوع الاستعمال:

ارتفاع الضغط الأساسي ، حالات التورم مثل التورم والاستسقاء الناتج عن هبوط القلب الاحتقاني ، ثلث الكبد ، ارتفاع الكالسيوم التورم مجهول السبب.

## الجرعة والنظام:

### ارتفاع الضغط الأساسي

الجرعة المعتادة ٥٠ إلى ١٠٠مجم يومياً على جرعة واحدة أو على جرعات مقسمة ويمكن أن تزيد تدريجياً في الحالات الصعبة أو الشديدة على فترات من أسبوعين إلى ٢٠٠ مجم يومياً.

ويجب أن يستمر العلاج في فترة أسبوعين على الأقل حيث أنه لا تحدث استجابة كافية قبل هذه الفترة . ويجب ضبط الجرعة فيما بعد حسب استجابة المريض. قد يثار الداكتون عمل مدرات البول أو عطلات ارتفاع الضغط الأثري فيجب خفض جرعتهم أولاً إلى ٧.٥٠ على الأقل حين ينضف الداكتون على العلاج ويعدا تعديل جرعتهم حسب الحاجة.

### حالات التورم:

قد تعطى الجرعة اليومية إما على جرعات مقسمة أو كجرعة واحدة يومياً .

### هبوط القلب الاحتقاني:

الجرعة المعتادة ١٠٠٠ مجم يومياً وقد تزيد الجرعة تدريجياً في الحالات الصعبة أو الشديدة إلى ٢٠٠ مجم يومياً ونحن نتمتع في التورم يكسون مستوى الجرعة الإستمرارية بين ٢٥ - ٢٠٠ مجم يومياً .

### تكوين الكبد:

إذا كانت نسبة السيبرونول في البول أكثر من ١٠٠ فكانت الجرعة المقترحة ١٠٠ مجم يومياً. وإذا نقلت النسبة أقل من ١٠٠ تكون الجرعة المقترحة ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ مجم يومياً . يجب تعديل الجرعة الإستمرارية لكل مريض على حدة .

### ارتفاع الكالسيوم:

عند ١٠٠ - ٢٠٠ مجم يومياً . إن سيبرونولاكتون ليس مثلاً للثلاث ولم ينصح أنه يؤثر على عملية المرضية الأساسية وأن استهلاكه ينصح به فقط عندما تكون جواركوتونوكويد بعد ذلك غير كافية للتأثير .

### التورم مجهول السبب:

الجرعة المعتادة ١٠٠٠ مجم يومياً .

### التورم في الأطفال:

يجب أن تعطى الجرعة اليومية الإبتدائية ١.٥ مجم تقريباً من الداكتون لكل رطل من وزن الجسم ( ٣.٢ مجم لكل كجم ) معطاه إما على جرعة واحدة أو جرعات مقسمة . ويعتمد على الضرورة تتحدر مطلقاً بطن القرص الداكتون مع عدة فترات من الجلسرين وإيثانول شرب الكرز . وهذا المطلق لمدة شهر إذا حطت بقايا .

### نوع الاستعمال:

صور الفلح الحاد - تتدهور الواضح في وقت الفلح - جيماس البول وفرط بوتاسيوم الدم أو الحساسية ضد سيبرونولاكتون.

### مقدمات:

بما إن سيبرونولاكتون من مدرات البول المحافظة للبيوتاسيوم فإنه لا ينصح بتعطى بوتاسيوم إضافي أو أية عناصر أخرى محافظة للبيوتاسيوم في نفس الوقت حيث يمكن أن يسبب ذلك فرط بوتاسيوم الدم .

### التحذيرات:

يقل سيبرونولاكتون استجابة الأوعية الدموية في مدة "توريانين" ولذلك يجب التحفظ في العلاج العام للمرضى المعرضين إلى التدهور الوعائي أو الفلح أثناء علاجهم بالعقاقير الداكتون.

قد أوضحت أن سيبرونولاكتون يزيد فترة نصف العمر للعلاج ديوكسين . وقد يحدث ذلك زيادة مستويات الديوكسين في الدم ومن ثم التسمم بالديوكسين . وقد يكون من الضروري خفض الجرعات الإستمرارية والإبتدائية للديوكسين حين يعطى سيبرونولاكتون . ويجب أن يكون المريض تحت المراقبة الدقيقة لتجنب حدوث زيادة أو نقصان الديوكسين .

قد يحدث عدة تقارير في المراجع عن احتمال تداخل سيبرونولاكتون مع التحسين الأشخاص الصناعي للديوكسين أو لنواتج تشيئه الفلح. هذا ولم يتم تقرير مدى أو الدلائل السريرية المتوقعة لمثل هذا التداخل ( والذي قد يكون مقتصراً على صنفية التحسين).

بما إن الفلح - كاريونوزونون - قد يسبب إحساس السيبرونول ومن ثم تقليل قابلية سيبرونولاكتون فإنه يجب تجنب استخدام الفلح من صلبين من حين إلى آخر في تقرير الفلح المتشابهة بالمدة لإمتداد حدوث فرط بوتاسيوم الدم . وامتداد ارتفاع كهر اللولينا في الدم خاصة في المرضى ذوي الصغر وقلق الكلى سيلاً والذي يجب في حالاتهم الموازنة بين خطر وفائدة العلاج .

قد تسبب حدوث متوضئة فرط كلور الدم القليلة للتحسين والمصاحبة عدة فرط بوتاسيوم الدم في بعض مرضى تليف الكبد الغير مرضى حتى في وجود وقلق كلى طويلاً .

### الاستعمال أثناء الحمل:

قد يعبر سيبرونولاكتون أو نواتجه خارج المشيمة ولذلك يتطلب استخدام الداكتون في السيدات الحوامل الموازنة بين الفائدة المرجوة والمخاطر المحتملة للجنين.

### المبرهنات:

يظهر مبرك كاربونيل. نتائج نشاط للتشليل الفلح لمدة سيبرونولاكتون في عين الفلح . فإذا كان استخدام الفلح حتماً فإنه يجب استخدام طريقة جيدة لتجنب الخطر .

### التفاعل على الفلح:

قد أوضحت أبحاث في التسمم المزمن على الفلح أن سيبرونولاكتون يحدث فوراً نمطاً على جرعات كبيرة بين ٢٥ - ٢٥٠ مرة عن الجرعة اليومية المعتادة لتتساق وأن مستوى هذه النتائج في مجال الاستخدام الإبتدائي غير موثوق . وقد تمتع من الإخراج والتشليل الفلح لمدة سيبرونولاكتون في الفلح مختلفة عن الـ ٣ سلق .

### أعراض جلوية:

قد يحدث تضرر عدة كبدية مصحفاً لإستعمال سيبرونولاكتون ويجب أن ينتبه الأطباء إلى بداية المتضمة ويثارى حدوث تضمة قد في خلال من مستوى الجرعة وطول فترة العلاج ويمكن التضمة عدة عندما يؤخذ الداكتون وقد يقل بعض تضمة في الفلح لفترة . والأعراض الجلوية الأخرى المصاحبة لإستعمال سيبرونولاكتون قابلة الحدوث وتشمل أعراض ضحية جلوية تشتمل تآكل - وسهول - بوحه - حرقان - صاع - طلع بارد - حنين - أو بصرى - ارتقار - ارتقار - ناس - حس - طلع الإترن - فلح الفترة على حدوث فرط إستمرارية - تنسب - عدم التعلق أو قحطاح - حمض - برف بعد من الفلح . قد سببت بعض حالات جواركوتونوكويد في بعض المرضى الذين يتناولون سيبرونولاكتون .

### التحذيرات:

الداكتون ٢٥ مجم : حطب من ٢٠.٠٠٠ أو ٥٠.٠٠٠ قرص

الداكتون ١٠٠ مجم : حطب من ١٠.٠٠٠ قرص

## شركة القاهرة للأدوية

والصناعات الكيمائية بتصريح من شركة سيريل / مونستكو العلمية

### ( إن هذا الدواء )

الدواء مستخدم بوزن على صلبه واستهلاكه خلافاً لتعليمات بحرفه للخطر .  
 - دمج بقاء وصحة - الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص على عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .  
 - والأشخاص والصيدلاني هذا الخبرين على يده ويعدده وصبره .  
 - لا تطلع مدة العلاج الممتدة لك من كفاءة صلبه .  
 - لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب  
 واتحاد الصيدلة العرب