

أوميروزول

يحب قراءة النشرة جيداً قبل البدء في تناول الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

- لو كان لك أي استفسارات أخرى ارجع إلى الطبيب أو الصيدلي.

- إذا وصف لك هذا الدواء فلا تنك بوسه المفرد لأنه قد يؤدي.

- لو أن الأمراض الجانبيه ازدادت سوءاً أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية أخرى غير مبررة في هذه النشرة يجب الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي.

١- ما هي كيسولات أوميروز وفيها تستخدم؟

تحتوي كيسولات أوميروز على عطر يطلق عليه أوميروزول، وينتمي هذا العطر إلى مجموعة أدوية يطلق عليها ميثيلات طبع المعاصر المعدي، وهي تعمل على تقليل كمية الحمض الذي تنتجه المعدة.

تستخدم كيسولات أوميروز في علاج الحالات التالية،

- مرض الارتجاع المعدي الريضي.
- سسراالتهضم الحشوي بموضه و الذي قد يسبب ألم بالمعدة و شعور بعدم الراحة (ثخمة/عسر هضم).
- الفرح العصابه بدموي هيليكوباكتر بيلوري و في هذه الحالة يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج العدوي والسماح للفرحة بالشفا.
- الفرح بالمعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء. المرض الذي يعالجون بمجموعة المضادات التي يطلق عليها مضادات الالتهاب الغير الستيرويدية و إذا زاد سوءاً بفرحة سابقه، تعمل كيسولات أوميروز على منع تكون الحمض أو علاج الوجع التي تكون موجوده فعلا.
- زيادة الحمض في المعدة والذي يسببه نمو البكتريا (عند الحالة تعرف بمتلازمة زولنجر-إيلسون).
- منع الضرر الذي قد يحدث للزرة و يسببه استئصال سائل من المعدة، وذلك أثناء العمليات الجراحية.

معلومات اضافية عن الفرح والارتجاع المعدي الريضي (إذا كنت تعاني من الارتجاع أو القرحة فإن هذا الجزء به معلومات من حالتك)

ماهي القرحة؟

القرحة هي قطع أو ثقب في الطبقة المخملية لبطان المعدة أو الأمعاء.

ماهي أسباب تكون القرحة؟

عاده ما يكون هناك توازن طبيعي بين الطبقة المخملية لبطان المعدة والأمعاء التي تحميها من الحمض المعدي و خروج الحمض المعدي، و تتكون القرحة عندما تكون هناك كميات كبيرة من الحمض أو أن حماية الجدار البطني للبطان أقل مما يجب. مضادات الالتهاب الغير الستيرويدية قد تسبب أحياناً فرح إذا كان المريض قد أصيب بفرحة سابقة و يجب أن يستمر في تناول مضادات الالتهاب الغير الستيرويدية، فقد يصف الطبيب كيسولات أوميروز لحماية المعدة أو الأمعاء. إن عدوي هيليكوباكتر بيلوري قد تسبب الفرح كذلك، لذلك قد يصف طبيبك مضادات حيوية لعلاج هذه العدوي مما يساعد على شفاء الفرح.

ماهو الارتجاع المعدي الريضي؟

الارتجاع هو خروج الأحماض من المعدة إلى المرئ و الذي ليست له طبقة تبطنه لتحميه من الأحماض، لذلك عند خروج هذه الأحماض إلى المرئ فإنها تسبب الألم و الالتهاب و حرقة بالمعدة.

ماذا تفعل إن لم تزول الأعراض؟

يجب أن تتحدث إلى طبيبك الذي سيقيم بعض الحالات و يراجع العلاج الموصوف لك.

كيف يساعد المرض نفسه؟

إذا كان المريض مصاب بالارتجاع المريضي أو عسرالتهضم و يعالج بكيسولات أوميروز فهناك عوامل تساعد أكثر على الشفاء مثل:

- الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة، و كذلك فإن الرقاد في وضع اقشبه بالجلوس حيث يرفع الرأس عن الفراش بموالي ٢٠ سم يساعد المريض كثيراً.
- افصاح الوزن إذا كان ذلك ممكناً، وعدم ارتداء ملابس ضيقة.
- الامتناع عن التدخين.
- تجنب تناول الكافيين، والكحول، و الطماطم، و الأطعمة الحليه حيث أنها قد تزيد الأعراض سوءاً.

٢- قبل أن تتناول كيسولات أوميروز

لا تتناول كيسولات أوميروز إذا كنت تعاني من الحساسيه المفرطة للأدوية أوميروزول أو أي من مكونات هذا الدواء.

تعالج بعض آثاراً جانبية (يستخدم لعلاج مرض الازيد).

لا يعالج المرض بكيسولات أوميروز إذا كان أي من الحالات السابقه متطابقه عليه، (إذ لم يكن المريض متأكداً عليه التحذير إلى الطبيب أو الصيدلي عن العلاج بكيسولات أوميروز).

يجب الحذر عند تناول كيسولات أوميروز

راجع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كيسولات أوميروز إذا كنت تعاني من مشاكل بالكبد حيث أن الطبيب قد يقلل جرعة الدواء في هذه الحالة. أظهرت العديد من الدراسات المشورة أن ميثيلات طبع المعاصر المعدي قد تسبب في زيادة خطر حدوث الكسور المرتميه بخاصه في العظام و ذلك في طبقة الحرقه و العصبم و لعموم الفترى. كما يزيد الخطر في المرض الذين يعالجون بجرعات كبيرة و متعمده. في اليوم الواحد، وتستخدم هذه

طوبية (سنة أو أكثر). كذلك يجب أن يأخذ المريض أقل جرعة ممكنة لأقل عدد حسب الحالة التي تتم معالجتها والمرضى الأكثر عرضة لهشاشة العظام يجب أن يعالجوا حسب الإرشادات العلاجية المثبتة.

- قد يؤدي تناول الأدوية الميثيلة لضع الحماض المعدي فحشرات طوبية (أكثر من سنة) إلى انخفاض مستويات الماغنسيوم في الدم، لذا يجب تناول مكملات الماغنسيوم و هذا لتحسين المستويات المنخفضة للمعادن، حيث يجب إيقاف تناول الأدوية الميثيلة لضع الحماض المعدي.

- انخفاض مستويات الماغنسيوم في الدم يؤدي إلى حدوث أعراض خطيرة (لا يعاني منها المرضي دائماً) منها،

- نقص العضلات، عدم انتظام ضربات القلب و التنشجات. علاج انخفاض مستوى الماغنسيوم في الدم، تناول مكملات الماغنسيوم مع التوقف عن تناول الأدوية الميثيلة لضع الحماض المعدي.

إذا كنت تتناول الأدوية الآتية:

أخير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي دواء آخر حالياً أو أي من مدة ليست بطويلة، بما في ذلك الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية، حيث أن أوميروز قد يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية وقد يؤثر أيضاً على معدل كسولات أوميروز.

لا تتناول كيسولات أوميروزا كنت تعالج بالأدوية التالية: اتازانابريف، إكسيفيدوك، أو إيسيدلي إذا كنت تعالج بأي من الأدوية التالية، كيتوكونازول، إيتراكونازول، فلوكونازول (أدوية تستخدم لعلاج العدوي بالفطريات).

دايزانيبام (دواء يستخدم لعلاج الحلق و بسف العضلات وعلاج الصرع).

فيتينيون (دواء يستخدم لعلاج الصرع)، إذا كنت تتناول فيتينيون فقد يحتاج الطبيب إلى متابعة عند بدء أو إيقاف العلاج بكيسولات أوميروز الأدوية التي تستخدم لزيادة سيولة الدم، مثل: وارفارين

وأي حاصرات أخرى كإنتامين قد قد يحتاج الطبيب إلى متابعتك عند بدء أو إيقاف العلاج بكيسولات أوميروز، فيجوسكين (دواء يستخدم لعلاج مشاكل القلب).

ثاكريليماس (دواء يستخدم بعد زراعه الأعضاء).

الجدول والرشاشه

قبل العلاج بكيسولات أوميروز، أخبري طبيبك إن كنت حاملاً أو ترضين في الأجواب أو إرضاع طفلك. وسيقرر الطبيب إن كنت تستلطين العلاج بكيسولات أوميروز في هذه الحالات.

قيادة السيارات و تشغيل الماكينات: لا تؤثر كيسولات أوميروز على قدرتك على قيادة السيارات أو استخدام المعدات أو تشغيل الماكينات، و يجب أن تتناول دواءك دائماً حسب إرشادات الطبيب بدقة، و الرجوع إلى طبيبك أو إلى الصيدلي إن لم تكن متأكداً.

تناول هذا الدواء

- يمكنك تناول الكيسولات، أي وقت من النهار أو الليل. - يمكنك تناول الكيسولات مع الطعام أو على معدة خالوه.

تناول الكيسولات مع كمية كافية من الماء، و يجب ألا تطبخ أو تضع الكيسولات، وذلك لأنها تحتوي على حبيبات مغلفه تحمي الدواء من أن يتكسر بالمحضر المعدي و لذلك من المهم المحافظة على هذه الحبيبات.

ماذا تفعل إن كنت تعاني من مشاكل في بلع الكيسولات، أو إن كان أشدك الكيسولات؟ يمكنك حل ذلك بأي من الطرق التالية:

1- فتح الكيسولة، وابع مخلوطها بالماء، و يجب ألا تطبخ أو تضع الكيسولات؛ يمكنك حل ذلك بأي من الطرق التالية:

يمكنك خلط محتويات الكيسولة و يحفظين في ماء الشرب (مياه فواره). ثم تذيب الخليط في كمية صغيرة من أي عصير فاكهه حمضي (مثل: عصير البرتقال، أو الليمون، أو الأناناس)، أو في قليل من صوص التفاح أو رايب الحليب، ويتم تناول هذا الخليط مباشرة أو في خلال ٣٠ دقائق من تحضيره، كما يجب تذيب الخليط في قليل من الماء و يشرب، و لتأكد من تناول كل الدواء يجب غسل الكوب بقليل من الماء وتناوله بحيث لا تضع أو تطحن الحبيبات الصلبة الصغيرة أثناء تناولها.

ماهي الكمية التي يجب أن تتناولها؟

سيخبرك طبيبك من كمية الكيسولات و عند ذلك العلاج بها حسب حالتك الصحية و السن و وظائف الكبد، و الجرعات المعتاده هي كالتالي: علاج حرقة المعدة التي يسببها مرض الارتجاع المعدي الريضي

الياتين

- الجرعة المعتاده هي ٢٠ مجم مرة يومياً لمدة ٤ أسابيع، وقد ينصح الطبيب باستمرار الدواء لمدة أطول أو جرعة أكبر، وذلك حسب الاستجابة للدواء، و فتح الأعراض من الرجوع قد ينصحك طبيبك باستمرار تناول جرعة ٢٠ مجم، أو تقليل الجرعة إلى ١٠ مجم.

- الأطفال (أكبر من سنة)،

- الجرعة تعتمد على وزن الطفل وعمره و الجرعة المعتاده هي ١٠ مجم أو ٢٠ مجم مرة يومياً لمدة أسبوعين إلى ٨ أسابيع.

الياتين

- الجرعة المعتاده هي ١٠ مجم أو ٢٠ مجم مرة يومياً لمدة أسبوعين إلى ٤ أسابيع، إذ لم تشعر بأحسن الأعراض التي تعاني منها، يجب الرجوع للطبيب.

علاج القرحة التي يسببها العدوي ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري

الياتين

- الجرعة المعتاده هي ٤٠ مجم مرة يومياً أو ٢٠ مجم مرتين يومياً لمدة أسبوع أو أسبوعين، قد يصف لك الطبيب نوع أو نوعين من المضادات الحيوية التالية، أوكسيتيسين، كلاريثروميسين، ميترونيدازول، تينيدازول.

البح للمعدات الطبية بدقة و عناية عند تناول الدواء و إن لم تكن متأكداً فراجع الطبيب.

الأطفال (أكبر من ٤ سنوات)

- الجرعة تعتمد على وزن الطفل، الجرعة المعتاده هي ١٠ مجم أو ٢٠ مجم مرتين يومياً لمدة أسبوع و سيعطى الطفل نوع من المضادات الحيوية مع كيسولات أوميروز، أوكسيتيسين أو كلاريثروميسين.

علاج الفرح بالمعدة و الجزء العلوي من الأمعاء

الياتين

- الجرعة المعتاده هي ٢٠ مجم مرة يومياً لمدة ٤ إلى ٨ أسابيع، الجرعة قد تزيد و تعتمد ذلك على استجابة المريض للعلاج، و فتح قرحة الجزء العلوي من الأمعاء من الرجوع مرة أخرى، تكون الجرعة المعتاده ٤٠ مجم يومياً، إلا إذا عانت الأعراض للظهور و في هذه الحالة قد ينصح الطبيب بزيادة الجرعة المعتاد من الدواء.

فتح حدوث و علاج الفرح التي يسببها مضادات الالتهاب الغير استيرويدي

الياتين

- إذا كان المريض يجب أن يتناول مضادات الالتهاب الغير الستيرويدية بشكل مستمر و كان قد عانى من فرحة سابقة، تكون الجرعة ٢٠ مجم يومياً لعلاج زيادة الفرح المعدل للحماض المعدي بسبب نمو البكتريا (متلازمة زولنجر-إيلسون)

الياتين

- الجرعة المبدئية المعتاده هي ٤٠ مجم يومياً، أو ٢٠ الجرعة أكبر من ٨٠ مجم يومياً، يفضل تناول نصف الجرعة صباحاً و النصف الباقى مساءً.

قبل العمليات الجراحية التي يعطى فيها التخدير الكلي.

الياتين، الجرعة المعتاده هي ٤٠ مجم لمطى قبل العملية الجراحية ليلة و جرعة أخرى ٤٠ مجم قبل العملية بمساعتين إلى ٦ ساعات.

لو تناولت كمية من كيسولات أوميروز أكثر مما هو موصوف لك و يجب اللجوء إلى الطبيب أو الصيدلي إذا تناولت جرعة من كيسولات أوميروز أكبر من الموصوف لك.

إذا نصبت تناول جرعتك من كيسولات أوميروز، عليك المصارعة بتناولها عندما تتذكر، إلا إذا كان موعد الجرعة التالية قد حان أو اقترب، فلا تتناول الجرعة المصية.

- لا تأخذ جرعة مضاعفة (جرعتين في نفس الوقت) من الدواء للتعويض عن جرعة منسية.

٤- الأمراض الجانبيه المحتملة

مثل كل الأدوية الأخرى فإن كيسولات أوميروز قد تسبب بعض الأمراض الجانبية، و مع ذلك فهي لا تسبب كل الذين يعالجون بالكيسولات، الأمراض الجانبية غالباً ما تكون بسيطة و تزول عندما تتوقف عن تناول الدواء.

إذا لاحظت أي من الأمراض الجانبية الخطيرة التالية فتوقف عن تناول كيسولات أوميروز و أخبر طبيبك أو توجه إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك فوراً،

- تورم الشفاه، اللسان أو الحلق، الحمى أو الكحة (تفاعلات حساسية شديدة).

- احمرار الجلد و تكون قشابع أو حبوب تقشير، أو إذا كان هناك قشابع كثيرة و خريف بالشفاه أو العين أو الدم أو الأضواء المتناقلة، قد يكون ذلك متلازمة ستيفين جونسون أو تنكسر جلدي تسمى.

هذه الأمراض نادرة، وقد تصيب أقل من شخص في الألف.

أعراض جانبية أخرى،

شائعة، (قد تصيب المريض بمعدل أقل من شخص في كل عشرة أشخاص)

- صداع.

- آثارات على المعدة أو الأمعاء، ألم بالمعدة إسهال، إنتفاخ.

- الأحاسيس بالمرض (الغثان) أو القئ.

- غير شائعة، - إضطرابات في النوم (أرق)

- دوخة.

- الشعور بالتعباس.

- الشعور بالإسهال و الإغماء.

- تغير في اختبارات الدم خاصة الاختبارات الخاصة بالكبد.

- الشعور العام بالتعب.

- عدوي فطرية تصيب المثم أو الأيغوم (فلاخ).

- زيادة في قرحة بالمثم.

- تغيرات في التئوق.

- التهابس (سماح أو رؤية أو الاحساس بأشياء غير موجودة).

- الطغح الجلدي عند التعرض لضوء الشمس.

- سقوف الشعر (باء الثعلب).

- تورم مؤلم بالمناصل.

- كسور بالعظام.

- اضطرابات بالكبد.

- اضطرابات الكبد، و يتضمن ذلك الإصابة بالسفراء و التي من أعراضها اصفرار الجلد وان يتغير لون البول إلى اللون القامق و احسان عام بالتعب.

- إضطرابات الكبد الشديدة، التي قد تؤدي إلى فشل كبدي و التهابات بالمثم.

- تضخم كبدى الدكتور.

- عدم القدرة على الإنتصاب (الحجز الجنسي).

- انخفاض نسبة الصوديوم في الدم، مما يؤدي إلى شعور بالضعف و التعب (حدث في) و حدوث تقلصات.

- اضطرابات بالدم مثل انخفاض عدد الخلايا البيضاء و الصفائح الدموية وقد يسبب هذا ضعف وكدمات كما قد يزيد من فرص الإصابة بالعدوي.

لا يجب أن يتناول المريض بهذ الأمراض الجانبية فقد لا تسبب أي من المرضي لكن لو أن أي من هذه الأمراض الجانبية أزداد خطورة، أو لو لاحظ المريض أعراض جانبية لم تذكر في النشرة عليه الرجوع للطبيب أو الصيدلي.

٥- كيفية حفظ كيسولات أوميروز

- تحفظ الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ °، وفي مكان جاف.

- احتفظ بالكيسولات في عبئتها.

- لا تستخدم الكيسولات بعد انتهاء صلاحيتها أو بعدو على التاريخ و يشير الناريخ على العبوة إلى آخر يوم في الشهر.

- لتتخلص من باقي الدواء، يلقى الدواء في صرف مائي أو قمامة منزلي.

يمكن الرجوع للصيدلي لمعرفة أفضل طريقة للتخلص من الدواء الغير مرغوب فيه، وهذه التصاح مهمة للحفاظ على البيئة.

٦- معلومات اضافية

على ماذا تحتوي كيسولات أوميروز؟

للمادة الفعالة في مستحضر أوميروز هي أوميروزول الكيسولات لها تراكيزت ١٠، ٢٠ و ٤٠ مجم و ٤٠ مجم من المادة الفعالة أوميروزول، المواد غير الفعالة، لاكتوزامال، بليديون K30، كرسوبوليون داي سوديوم هيدروجين فوسفات، بولي إيثيلين جلايكول ١٠٠٠، ميثاكريليك اسيدوبولييمر.

كيف تبدو كيسولات أوميروز وماهي محتوياتها البيوة؟

أوميروز كيسولات ١٠ مجم، و لونها أخضر مزرق وبيض وحتوى على حبيبات بيضاء إلى عاجية اللون.

أوميروز كيسولات ٢٠ مجم، و لونها أزرق و تركوأز وحتوى على حبيبات بيضاء إلى عاجية اللون.

أوميروز كيسولات ٤٠ مجم، و لونها أزرق و لوزرق فلاتح وحتوى على حبيبات بيضاء إلى عاجية اللون.

العبوة

أوميروز ١٠، عبوة كرتون تحتوي على شريطين (PVDC/AL) يحتوي كل شريط على ٧ كيسولات.

أوميروز ٢٠، عبوة كرتون تحتوي على شريطين (PVDC/AL) يحتوي كل شريط على ٧ كيسولات.

عبوة كرتون تحتوي على ١٠ شريط (PVDC/AL) يحتوي كل شريط على ٧ كيسولات.

أوميروز ٤٠، عبوة كرتون تحتوي ١٠ كيسولات في شريط (PVDC/AL).

إنتاج

الشركة الشرعية لأدوية (فارو فارما)

مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ - قطمة رقم (١) - الإسكندرية - ج.م.ع

