باكلوفين أقراص دستور الأدوية البريطانى ٢٠١١

١٠ مجم او ٢٥ مجم /القرص

باسط للعضلات وضد التقلصات

اقرا بعناية النشرة واتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها واتبع تعليمات الصيدلي الذي صرفها لانقطع الدواء من تلقاء نفسك .
لا تكرر تناول الدواء الا بتعليمات من الطبيب .
لا تترك الادوية فى متناول الاطفال .

ما هى تركيبة هذا الدواء :
باكلوفين اقراص بيضاء مستديرة يحتوى كل قرص على :

مواد فعالة : باكلوفين ١٠ مجم او ٢٥ مجم

مواد غير فعالة: باكلوفين ١٠مجم لاكتوز، ستيرات المغنسيوم ، بوفيدون ، كروسبوفيدون صوديوم ستارش جليكوليت
باكلوفين٢٥ مجم لاكتوز، ستيرات المغنسيوم ، بوفيدون ، كروسبوفيدون صوديوم ستارش جليكوليت فوسفات كالسيوم ثنائى القاعدة ، ميكروكريستالين سليلوز ١٠١

الشكل الصيدلى :

اقراص مستديرة بيضاء فى علبة تحتوى على شريط او شريطين كل شريط يحتوى على عشرة اقراص فى شريط الومنيوم مع بى فى سى

ما هو هذا الدواء:

هذا الدواء من مجموعة الادوية الباسطة للعضلات وضد التقلصات وهو يعمل عن طريق الجهاز العصبى المركزى .

ويستعمل الباكلوفين فى:

تخفيف التشنجات العضلية الطوعية الناتجة من التصلبات المتعددة ، والناتجة عن اصابات الحبل الشوكى (مثل حالات اورام النخاع الشوكى ، وامراض العصبون الحركية، والتهاب النخاع الشوكى المستعرض او القطع الجزئى فى الحبل الشوكى)
الباكلوفين يستعمل فى البالغين والاطفال لتخفيف التشنجات فى العضلات الطوعية الناتجة من اصابات الاوعية الدموية المخية والشلل المخى .

قبل استعمال هذا الدواء :

لا تستعمل هذا الدواء إذا كنت تعانى من إى حساسية من الباكلوفين او إحدى مكونات الدواء وتتمثل فى حكة او طفح جلدى صعوبة فى التنفس او انتفاخ فى الوجه او الشفتين او الحلق او اللسان .
اوكنت تعانى من قرحة بالمعدة او مرض البورفوريا وهو احدى الامراض الوراثية كذلك اتصل بطبيبك إذا كانت تعانى من حساسية من بعض انواع السكر مثل لاكتوز لانه يحتوى على لاكتوزكمادة غير فعالة .
او إحدى الامراض النفسية مثل مرض الإنفصام ، التشوش، نوبات من الصرع .

او تعانى من امراض فى الجهاز التنفسى او الكبد او الكلى او امراض المثانة .

او مرض البول السكرى . او ارتفاع فى ضغط الدم

كذلك راجع مع طبيبك او الصيدلى إذا كنت تتخذ احدى الادوية التالية :
*ادوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم مثل(البروبرانول ، نيفيدين ، كابتوبريل).

*ليثيوم لمرض الاحباط . *ايبوبروفين (مضاد للالتهاب وللالم) . *ليفودوبا لعلاج مرض الشلل الرعاش .

*مضاد الاحباط الثلاثية مثل (اميتريبتلين ، او اميبرامين) . ميمانتين (يستعمل فى حالات الزهيمر)

اخذ هذا الدواء مع المأكولات او المشروبات المختلفة :

لا ينصح باخذ هذا الدواء مع المشروبات الكحلية.

اسأل طبيبك اذا كان عندك اى اسئلة اخرى

الإستعمال مع الحمل والرضاعة :
يجب سؤال طبيبك او الصيدلى قبل اخذ اى دواء اذا كان هناك حمل او رضاعة .

القيادة او العمل على الالات :
باكلوفين اقراص يمكنك تشعر فى بعض الاحيان بعدم الاتزان ، او الزغللة ، او خفة فى الراس، او عدم اليقظة.

اذا حدث لك ذلك يجب عليك الا تقود سيارتك او تقف امام الالات او فى موقف يعرضك للخطر .

فى حالة إجراء عمليات او اخذ بنج :

يجب ان تذكر لطبيبك انك تأخذ باكلوفين.

لاخذ دوائك :

يجب اتباع تعليمات طبيبك ,ويتم مراجعة الجرعة مع الصيدلى لتتأكد من عدد الاقراص التى يجب ان تأخذها والطريقة التى تأخذ بها .

وعموما الجرعات تأخذ كالتالى :
الجرعة المستعملة

للكبار ٥مجم يتم زيادتها تدريجيا الى ان تصل الى ٢٥ مجم ثلاث مرات يوميا . وفى بعض الاحيان قد ينصح الطبيب بزيادة الجرعة لتصل الى ١٠٠مجم فى اليوم.
لكبار السن ينصح باستعمال جرعات اقل او حسب ارشادات الطبيب.

- للاطفال بإستشر الطبيب . قد ينصح الطبيب بجرعات قليلة ثم تزداد تدريجيا حتى تصل الجرعة المناسبة .

الاطفال من ١٢ شهر حتى سنتين ١٠-٢٠ مجم فى اليوم

الاطفال من٢-٦ سنة : ٢٠-٣٠ مجم فى اليوم

الاطفال من٦-١٠ سنة : ٣٠-٦٠ مجم فى اليوم

*المرضى الذين يعانون من مشاكل فى الكلى استشر طبيبك مكن اعطائك جرعات صغيرة تصل الى ٥مجم فى اليوم

*اذا كنت تعانى من الام ناتجة تقلص بالعضلات قد ينصح الطبيب بجرعة واحدة مسائية . كذلك قد ينصح الطبيب بجرعة باكلوفين ساعة قبل القيام ببعض الاعمال مثل الحلاقة,او ارتداء الملابس حتى يتحسن الاداء .

*يأخذ الدواء مع الماء . إذا كنت تعانى من غثيان ينصح بأخذ الدواء مع مشروب او لبن او مع الاكل

لا يستعمل الدواء الا حسب إرشادات الطبيب ولا يوقف بدون استشارة الطبية

*إذا كنت من كبار السن يجب اخذ الدواء والجرعة حسب وصف الطبيب .

ولا يأخذ جرعات زائدة عن التى وصفها الطبيب ,و إذا حدث ان تعاطيت جرعة زائدة عن التى حددها الطبيب يجب الذهاب لاقرب مستشفى او الاتصال بطبيبك واخذ باقى كمية الدواء حتى يعلم الطبيب الكمية التى اخذتها .

*لا يوقف الدواء مباشرة لاحتمال ان تسوء الاعراض او يحدث تشوش ،هلوسة،او تغير فى الحالة العصبية او تشنج ، او زيادة فى ضربات القلب . تخفض جرعة الباكلوفين ببطء وبالتدريج فى خلال فترة من اسبوع لاسبوعين .

بعد اخذ هذا الدواء :

فى بعض الاحيان يسبب إستعمال هذا الدواء بعض المضاعفات عند بعض الاشخاص وهى كالتالى :

* اثار على الجهاز العصبى : مثل نعاس او هدوء اثناء الاستعمال بالنهار . قد يجهد شعور بخفة الراس ، تشوش ، زغللة ، صداع او ارق. قد يحدث تشنجات بسيطة خصوصا عند مرضى الصرع . كذلك بعض الاعراض العصبية مثل وخز او ضعف فى العضلات اوالام فى العضلات او ترنح او ارتعاش او زوغان العين وعدم التركيز. وبعض الحالات النفسية مثل التحلل او هلوسة او كوابيس او حالات اكتئاب .

*اثار على بالجهاز الهضمى : غثيان،قىء،امساك ،اسهال ، جفاف بالحلق ، نادرا ما يحدث تغير فى وظائف الكبد . (كما يظهر بالتحاليل).

*اثار على الجهاز البولى : صعوبة او عسر او سلس بول

*اثار على الجهاز التنفسى : تنفس غير منتظم وبصعوبة

*اثار على الجهاز العضلى : نادرا ما يحدث الام فى العضلات او شعور بالضعف.

*اثار على القلب او الاوعية الدموية : انخفاض فى ضغط الدم وبطء فى ضربات القلب.

*اثار اخرى :نادرا قد يحدث طفح جلدى أو تغيير فى طعم الاكل ،او زيادة فى العرق.

لو حدث لك اى من هذه الاعراض او اى اعراض اخرى يجب ان تخبر طبيبك او تخبر الصيدلى فى الحال ,ويجب الا تنزعج لان معظم من يأخذ هذا الدواء لا يحس بأى من الأعراض السابقة الا نادرا.

العبوة علبة بها ٢ شريط ٢٠ قرص باكلوفين ١٠مجم او علبة بها ٢شريط ٢٠ قرص باكلوفين ٢٥ مجم

طرق التخزين و الحفظ:

لا يستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على العلبة .

يحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن درجة حرارة ٣٠°م فى مكان جاف يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال .

هذا الدواءلاستعمالك الشخصى فقط وممنوع اعطاءه او اى دواء اخر لاى فرد حتى لو كان عنده نفس الاعراض الابعد مشورة الطبيب، كذلك يفضل الا تحتفظ بباقى الدواء وممكن ان ترده للصيدلى حتى يمكن التخلص منه التخلص الامن.

الإنتاج والتداول: شركة مصر للمستحضرات الطبية
كيلو ٤ طريق مصر بلبيس الصحراوى– الخانكة القليوبية – مصر
ت٤٦٩٢١٠٣٠٦ فاكس ٤٦٩٢١٠٣٠٢
لصالح شركة الدلتا لتجارة الادوية
٣ميوسف عباس – مدينة التوفيق – مدينة نصر القاهرة ت/و فاكس ٢٢٦٢٠٨٣٥