

برونكوبرو^م

منظم لإفرازات المخاط

التركيب :

كل كبسولة طويلة المفعول تحتوي على هيدروكلوريد الأمبروكسول
كل ملعقة شاي (5 مليلتر) من الشراب تحتوي على هيدروكلوريد الأمبروكسول
كل 1 مليلتر من السائل يحتوي على هيدروكلوريد الأمبروكسول

الخواص :

ينظم هيدروكلوريد الأمبروكسول الإفرازات المخاطية عن طريق تغيير تركيب إفرازات القصبة الهوائية وذلك بواسطة تقليل وتكسير الألياف المخاطية مما يؤدي إلى إنقاص لزوجة المخاط مما يساعد على طرد البلغم.

وقد أوضحت الدراسات العلمية وجود تأثير إيجابي على أسطح الحويصلات الهوائية. كذلك ليس لهذه المادة الفعالة تأثير مشيط على الشعب الهوائية وليس لها تأثير مسكن ولكن لها تأثير ضعيف مضاد للسعال.

يتمتص هيدروكلوريد الأمبروكسول جيداً بعد تناول عن طريق الفم. ويبدأ عمله في خلال ثلاثون دقيقة ويستمر من 6 - 12 ساعة.
يفيد هيدروكلوريد الأمبروكسول في حالات إصابات الجهاز التنفسي المصحوبة باحتباس في الإفرازات المخاطية.

الاستخدامات :

إصابات الشعب الهوائية الحادة والمزمنة والمصحوبة بإفرازات مخاطية غليظة مثل التهابات الشعب الهوائية الحادة والمزمنة والحالات المشابهة للربو وأزمات الكحة المصاحبة باختلال نظام طرد الإفرازات. التمدد المرضي للشعب الهوائية. كذلك كعامل مساعد في إذابة المخاط في حالات التهابات تحويف البلغم الأتقي.

الجرعة وطريقة تناول :

ما لم يصف الطبيب غير ذلك.

الكبسولات :

يأخذ البالغون كبسولة واحدة يومياً بدون مضغ، مع بعض السوائل.

الشراب :

يبدأ البالغون بمعلقة شاي ثلاث مرات يومياً لمدة 2 - 3 أيام ثم يستكمل العلاج بمعلقة شاي 3 مرات يومياً.

الأطفال حتى سن سنتان : نصف ملعقة شاي مرتان يومياً.

من 2 - 5 سنوات : نصف ملعقة شاي 3 مرات يومياً.

أكثر من 5 سنوات : ملعقة شاي 2 - 3 مرات يومياً.

يمكن مضاعفة الجرعة بالنسبة للأطفال عند بداية العلاج ولمدة 2 - 3 أيام.

السائل :

البالغين تبدأ الجرعة بأربعة مليلتر 3 مرات يومياً ولمدة من 2 - 3 أيام ثم 2 مليلتر 3 مرات يومياً.

الأطفال حتى سن سنتان 1 مليلتر مرتان يومياً.

من 2 - 5 سنوات 1 مليلتر 3 مرات يومياً.

أكثر من 5 سنوات 2 مليلتر من 2 - 3 مرات يومياً.

يمكن مضاعفة الجرعة بالنسبة للأطفال عند بداية العلاج ولمدة 2 - 3 أيام.

يوجد مع مستحضر برونكوبرو السائل غطاء مدرج وبه علامات للمساعدة على ضبط الجرعة، كذلك يمكن تخفيف السائل مع الشاي العسير أو اللبن مثلاً.

- يجب تناول برونكوبرو بعد الأكل.

حالات حظر الاستخدام :

لا يستعمل الدواء في حالات الحساسية المفرطة لمادة أمبروكسول أو مادة برومهيكلين، بالرغم من عدم ثبوت سميته للأجنة فإنه لا يستخدم في الثلاث أشهر الأولى للحمل.

الأعراض الجانبية :

- نادراً ما تحدث اضطرابات في المعدة، إسهال، طفح جلدي.

- يحتوي برونكوبرو شراب وسائل على مادة بنزويل البنزوات والتي قد تظهر أمراض الحساسية عند بعض الأشخاص.

ملحوظة :

- برونكوبرو شراب خالي من الكحول ومناسب لمرضى السكر. 5 مليلتر من الشراب تكافئ 1.4 جرام من الكريوهيدرات.

- لا يستخدم بعد إنتهاء الصلاحية.

- يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن 30° م.

العبوة :

كبسولات، شراب، سائل.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

إنتاج :

شركة أكتوبر فارما ش.م.م - مدينة 6 أكتوبر - ج.م.ع



اكتوبر
فارما