



# بوسكوبان

هايسين - ن - بيوتيل بروميد



## الخواص :

ذو تأثير خاص على العقد العصبية الباراسيمبثاوية الموجودة في جدران الأوعية ولهذا فبوسكوبان له تأثير خاص مضاد للتشنج والتقلص في العضل الأملس الخاص بالجهاز المعدي المعوي والمسالك المرارية والبولية .  
وليس لبوسكوبان أية أعراض جانبية على الجهاز العصبي المركزي أو العين أو غدد اللعاب أو القلب ، متى أعطى في حدود الجرعات العلاجية :

## حالات الإستعمال :

التقلصات الخاصة بالجهاز المعدي المعوي ، وتقلص فتحة البواب عند الأطفال ، القيء الذي يحدث عقب العمليات الجراحية ، الإمساك التلقصي ، عدم قدرة المجارى المرارية على القيام بالحركات الإزائية ، وتقلصات المجارى البولية ، تأخر إرتخاء القسم الأسفل للرحم ، عسر الحيض .

## الجرعة :

للبالغين و أولاد المدارس : الجرعة العادية هي قرص إلى قرصين ( أقراص مغلقة بالسكر ) ، أو ١ - ٢ لبوس ( ١٠ ملليجرام في اللبوس ) تعطى من ٣ - ٥ مرات يوميا . ويمكن للطبيب زيادة هذه الجرعات . ويجب بلع الأقراص صحيحة كما هي مع قليل من الماء . أما اللبوس فينزع عنه الغطاء ويدخل الجزء المذيب منه أولاً في الشرج وفي حالات المغص الحادة تعطى حقنة واحدة ( ٢٠ ملليجرام ) تحت الجلد ، في العضل ، أو في الوريد بضع مرات يوميا . وفي حالات المغص المراري أو الكلوي الحاد يمكن إعطاء حقنة من بوسكوبان كومبوزيتم في الوريد ببطء وفي الحال يختفى الألم الشديد .

للأطفال و الرضع : لبوس واحد ( أطفال ) ٣ مرات يوميا ، وفي الحالات الحادة يمكن إعطاء  $\frac{1}{2}$  حقنة ٣ مرات يوميا

## العبوات :

أقراص مغلقة بالسكر	١٠ ملليجرام	علبة ٢٠ قرص
لبوس للكبار	١٠ ملليجرام	علبة ٦ لبوس
لبوس أطفال	٧,٥ ملليجرام	علبة ٦ لبوس أطفال
أمبول	٢٠ ملليجرام	علبة ٦ حقن

## الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة الغرفة ( ١٥ - ٣٠ ) م في مكان بارد وجاف .

إنتاج : شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد )

جيزة - ج.م.ع. - س.ت. ١٩٧١٧

بتصريح من : بورينجر إنجلهايم إنترناشيونال ليمتد

إنجلهايم أم راين - ألمانيا