



بوسكوبان® بلس



مج ١٠
مج ٥٠٠
مج ١٠
مج ٨٠٠

هويسين - ن - بيوتيل بروميد
باراسيتامول
هويسين - ن - بيوتيل بروميد
باراسيتامول

التركيب: يحتوي القرص الواحد على:

يحتوي كل قمع على:

الخواص: يعتبر الهويسين - ن بيوتيل بروميد أحد مضادات التقلص التي يمكن أن يتحملها الجسم بسهولة، حيث يعمل على إزالة تقلصات العضلات المسببة للمساء الموجودة بالمعدة والأمعاء والمرارة والمجاري البولية والأعضاء التناسلية للسيدات، وأثر الباراسيتامول المسكن للألام يعمل على زيادة فعالية مادة الهويسين - ن بيوتيل بروميد، والأثر المضاد للتقلص مع الأثر المسكن للألام يجعل مستحضر بوسكوبان بلس علاج مناسب لتلويبات الآلام التي تنشأ عن تقلصات مختلف الأعضاء الموجودة بالبطن.

المسارات الدوائية: بعد تناول الهويسين - ن بيوتيل بروميد عن طريق الفم فإنه يمتص عن طريق الأنسجة ثم يتركز على وجه الخصوص في أنسجة المعدة والأمعاء والكبد والكليتين، وترجع القابلية الشديدة لتركز هذا الدواء بالأنسجة إلى قصر فترة نصف العمر والتي تصل إلى حوالي ثلاثة دقائق (طور التوزيع) في الدم، بينما يكون معدل الإخراج بطيء ومن هذا يتضح أن مستوى تركيز مادة الهويسين - ن بيوتيل بروميد يكون منخفض بالدم ويبقى لفترة قصيرة، بينما تركيزه في الأنسجة المتأثرة به يظل عاليا لفترة طويلة.

ومادة الباراسيتامول تمتص بسرعة من القناة الهضمية، وتتم عمليات الأيض وإيقاف النشاط الخاص بها بالكبد وذلك عن طريق الاتحاد مع الجلوكورونيدات والكبريتات ومشتقات سيستين، كما أن مادة الباراسيتامول تفرز عن طريق الكليتين وتتراوح فترة نصف العمر المتعلقة بالإخراج إلى ما بين ٣ - ٤ ساعات.

دواعي الاستعمال: نوبات الآلام الناتجة عن الأمراض التي تسبب المعدة والأمعاء والآلام الناتجة عن التقلصات والاضطرابات الوظيفية للتقوالت المرارية والبولية والأعضاء التناسلية للسيدات (مثل عسر الطمث).

موانع الاستعمال: يجب عدم استعمال اليوسكوبان بلس في الحالات الآتية:

- نقص إنزيم جلوكوز - ٦ - فوسفات دي هيدروجينيز المحدود وراثيا.

- الحساسية لمادة الباراسيتامول.

- احتياطات خاصة: يستخدم بوسكوبان بلس بحذر في الحالات الآتية:

- قصور وظائف الكبد الناتج عن استخدام الكحوليات لفترة طويلة والتهايات الكبد.

- قصور وظائف الكليتين.

- مجموعة أعراض جيلبرت.

وفي هذه الحالات يستخدم بوسكوبان بلس تحت الإشراف الطبي حيث تقلل الجرعة أو تطول الفترات بين كل جرعة وأخرى.

الاستعمال في حالات الحمل والرضاعة: التجارب القليلة إكلينيكية متاحة، ولكنها محدودة حيث أوضحت هذه التجارب أنه لا توجد خطورة من الاستعمال بالنسبة لحيوانات التجارب، ولكن مأمونية استعماله في السيدات العوامل لم تتحقق بعد، لذا يجب اتباع الاحتياطات العامة الخاصة بعدم تناول هذا المستحضر خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل كسائر الأدوية الأخرى.

لم يتم بعد التحقق من مأمونية استعمال مادة الهويسين - ن بيوتيل بروميد أثناء فترة الرضاعة. أما فيما يخص المادة الفعالة الباراسيتامول فقد ثبت أنها تفرز عن طريق اللبن ولكنها لا تؤثر في الرضع إذا ما استخدمت في حدود الجرعات العلاجية.

الأعراض الجانبية: قد يحدث في حالات نادرة احمرار طفيف بالجلب عند تناول مستحضر بوسكوبان بلس كما يمكن أن تحدث أيضا حساسية مع طفح جلدي وفي حالات نادرة جدا يحدث انخفاض في عدد الصفائح الدموية أو كرات الدم البيضاء.

في بعض الحالات المتفرقة حدث نقص في عدد كرات الدم الحبيبية أو نقص في الخلايا الدموية بصفة عامة نتيجة لاستعمال الباراسيتامول.

وفي حالات متفرقة أيضا حدثت أزمات ربوية لدى بعض المرضى الذين لديهم قابلية للأزمات الربوية الناتجة عن استعمال الأدوية المسكنة للألام.

في حالة استخدام جرعات كبيرة من مستحضر بوسكوبان بلس قد يحدث أضرارا في الكبد وذلك لاحتوائه على الباراسيتامول.

التفاعلات البينية: قد تحدث الجرعات العادية من الباراسيتامول أثارا ضارة بالكبد إذا ما استعملت مع الأدوية التي تؤثر على النشاط الإنزيمي مثل الأدوية المنومة ومضادات الصرع (جلونيثيميد والفينوبربيرات والفينوتيون والكاربامازين) بالإضافة إلى الريفاميسين، واستخدام المواد الكحولية.

عندما تنبسط حركة التفرغ المعدي نتيجة لاستعمال بعض المواد مثل البروبانثولين، فإن معدل امتصاص الباراسيتامول يقل ويتأخر في تأثير هذا الدواء، بينما الأدوية التي تعمل على سرعة تفريغ المعدة مثل الميتوكلوراميد تساعد على امتصاص الباراسيتامول وينتج عن ذلك سرعة تأثير مادة الباراسيتامول.

الجرعة وطريقة الاستعمال: إذا لم يصف الطبيب خلاف ذلك ينصح بالجرعات الآتية:

الأقراص البالغين ١ - ٢ قرص ٣ مرات يوميا تآخذ مع قليل من السوائل. يجب ألا تزيد الجرعة اليومية عن ٦ أقراص.

الأطفال: البالغين قمع واحد بالشرح ٣ - ٤ مرات يوميا. يجب ألا تزيد الجرعة اليومية عن ٤ أقراص.

يجب عدم استعمال مستحضر بوسكوبان بلس بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، الأقراص والأقماع يجب ألا تستعمل مع الأطفال.

زيادة الجرعة:

الأعراض: أعراض التسمم بمادة الهويسين - ن بيوتيل بروميد لم تلاحظ بعد في الإنسان. وفي حالات التسمم الشديد بمادة الباراسيتامول (بعد تناول أكثر من ١٠ جرام من المادة النقية) يحدث هبوط بالدورة الدموية وقصور في وظائف الكليتين ويرقان وقد تحدث غيبوبة كبدية.

وفي حالة التسمم العزمن تحدث أنيميا وزرقة - وضعف ودوخة وصداع وعدم قدرة على النوم وصداع وفقد للذاكرة مع تهيج بالجهاز العصبي المركزي وقد تحدث تشنجات.

العلاج: عند زيادة جرعة الباراسيتامول يحدث تركز بالكبد. إذا حدث غثيان أو قيء بعد تناول البوسكوبان بلس فإنه يجب إيقاف العلاج فورا ويستشار الطبيب مع ملاحظة أن الأعراض قد تظهر بعد عدة أيام.

في حالة زيادة الجرعة يجب اتخاذ الخطوات الخاصة بالعلاج خلال فترة لا تزيد على عشر ساعات وتشمل هذه الخطوات إجراء (غسيل للمعدة وتناول مادة سيستامين ومادة ال- ميثيونين) وهذه المواد تساعد على تقليل الخطورة الناتجة عن إصابة الكبد والعلاجات الإضافية الأخرى تتوقف على مستوى الباراسيتامول بالدم (أكثر من ١٢٠ ميكروجرام/مليتر بعد أربع ساعات من تناول العار). يجب نقل المريض مباشرة لأقرب مستشفى متخصص في علاج مثل هذه الحالات.

العوية: عبوة تحتوي على أقراص أو أقراص شرجية.

إنتاج: شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)

الجيزة - ج.م.ع. - س.ت ١٩٧١٧

بتصريح من: بورنجر إنجلهايم إنترناشيونال ليمتد

انجلهايم أم راين - ألمانيا

هذا الدواء:

- يؤثر على صحتك واستعماله بخلاف التعليمات خطر عليك.

- اتبع بدقة تعليمات الطبيب، وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باعك هذا الدواء.

- الطبيب والصيدلي خبراء في الدواء وفوائده ومخاطره.

- لا توقف بنفسك فترة العلاج.

- لا تكرر نفس الروشة دون استشارة الطبيب.

احفظ الدواء بعيدا عن أيدي الأطفال