



بوسكوبان® كومبوزيتم

ضد التقلصات + مسكن للألم



«بوسكوبان» (هايبرسين - ن - بوتاييل برومايد) ذو تأثير انتقائي اختياري ضد تقلصات العضلات المسماة الكائنة في الجهاز المعدي المعوي والقنوات المرارية والبولية التناسلية وهو يتمتع بعميزة فريدة وهي عدم وجود الأعراض الجانبية التي تصاحب الأدوية المكونة من الأتروبين ومشتقاته.

«بوسكوبان كومبوزيتم» هو مركب ناتج عن اتحاد «بوسكوبان» مع دايبيرون (فيناييل ميثيل بيرازولون - ميثيل أمينو ميشين سلفونات صوديوم) ويستعمل للقضاء على المغص وآلام التقلصات العادة في الحالات التي يراد فيها الحصول على تأثير مسكن ومضاد للتقلص. ويوجد هذا المستحضر في ٣ طرق للإستعمال: عن طريق الفم - الحقن - الشرج

حالات استعمال بوسكوبان كومبوزيتم

المغص المراري - المغص الكلوي - حالات آلام البطن التي تجر على نوبات - حالات الألم المصحوب بتقلصات جهاز الأنثى التناسلي - عسر الحيف.

طريقة استعمال بوسكوبان كومبوزيتم

أقراص مغلقة بالسكر: للإستعمال عن طريق الفم للقضاء على آلام التقلصات الناتجة عن اضطراب الأجهزة المعدية المعوية، الكلوية، التناسلية للأنثى، وعسر الحيف.

جرعة الأقراص المغلقة بالسكر: قرص إلى قرصين ٣ مرات يوميا إذا اقتضى الأمر وحتى يزول الألم. ويجب بلع القرص كاملا كما هو.

أمبول: في المغص الكلوي والمراري وآلام البطن المبرحة تعطى حبة واحدة ٥سم ٣. ويفضل إعطاؤها ببطء في الوريد. وإذا لزم الأمر يجب إعطاؤها مرتين إلى ٣ مرات يوميا كل بضع ساعات، أما إذا تعذر إعطاء الحبة في الوريد فيمكن إعطاؤها صيفا في أحد الأرداف، لكن غير مسموح إطلاقا إعطاء الحبة تحت الجلد.

الفلوس: للإستعمال في تقلصات الأجهزة المعدية المعوية والتناسلية، وعسر الحيف.

الجرعة: ليوس واحد يكرر عند اللزوم كل ساعتين إلى ٤ ساعات وفي حالة تأكيد العلاج بعد استعمال حقن بوسكوبان كومبوزيتم يعطى ليوس واحد ٣ مرات يوميا.

ليوس أطفال: لمن هم أكبر من ١٢ شهرا للقضاء على المغص في منقطة السرعة، تقلصات المعدة والأمعاء، القيء الناتج عن الانتفاخ وآلام المعدة الناتجة عن مصادر وظيفية.

الجرعة: ليوس أطفال واحد مرة إلى ٣ مرات يوميا.

أما الأطفال تحت ١٢ شهرا فغير مصرح بإعطائهم بوسكوبان كومبوزيتم إطلاقا، ويمكن إعطائهم بوسكوبان عادي بدون دايبيرون.

مضادات استعمال بوسكوبان كومبوزيتم، واحتياطات خاصة

مع أن «دايبيرون» أحد مشتقات «الأمينوبايرين» السريعة الذوبان ويحتلها المرض جيدا، إلا أننا لا ننصح باستعمال بوسكوبان كومبوزيتم لمدة طويلة خصوصا للمرضى ذوي الضميمة، أو من يعانون من تغير في صورة الدم.

إرشادات خاصة: يجب مراعاة الطريقة الآتية عند إعطاء الحبة في العضلة الكتلية (انترا - جلوتيال): مكان الحبة: الربع الأعلى الخارجي لسطح الذرف (العضلة الكتلية المعشى).

تعليمات: يجب أن تكون الإبرة عمودية على سطح الجلد وفي اتجاه القمة العرقفية. العمق: لضمان وصول الحبة إلى العضلة يجب استعمال إبرة طويلة ورقيقة.

العقوبات: أقراص مغلقة بالسكر (بوسكوبان ١٠ ملليجرام + دايبيرون ٢٥٠ ملليجرام) : علية ٢٠ قرصا

أمبول ٥ سم ٣ (بوسكوبان ٢٠ ملليجرام + دايبيرون ٢٠٠ جرام) : علية ٣ حقن

ليوس (بوسكوبان ١٠ ملليجرام + دايبيرون ١ جرام) : علية ٦ ليوس

ليوس أطفال (بوسكوبان ٧.٥ ملليجرام + دايبيرون ٣٠٠ ملليجرام) : علية ٦ ليوس

إنتاج: شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)

الجيزة - ج.م.ع - س.ت ١٩٧١٧

بتصريح من: بورينجر انجهايم انترناشيونال ليمتد

انجهايم أم راين - ألمانيا