



فانيز مصر  
الشركة الداخلية

## بونستان\* فورت

المادة الفعالة: حمض اليفياميك  
لتخفيف الألم والتهاب

التركيب: يحتوي كل قرص على ٥٠٠ مجم من حمض اليفياميك.

الخواص:

حمض اليفياميك يمكن الالام، يخفف للحرارة مبيد للتهابات وكذلك يقلل نشاط البروستاغلاندين.

فوائده الإستعمال:

- الآلام المتعلقة الشدة كالصداع وآلم الأسنان.
- اضطرابات الدورة الشهرية وآلم الحوض، آلم الح.
- الآلام المصاحبة للورم أو التهابات النسي اللانسان الرضية أو الجراحية.
- حالات التوتج في المفاصل المتأكلة.
- إصابات العمود الفقري.
- التهابات المفاصل.
- الروماتيزم غير المعدية.
- موانع الإستعمال:

بحسب الإستنتاج عن تناول الدواء في الحالات التالية:

- الإستخدام في ضعف تشكل الدم.

- الحساسية المفرطة لحمض اليفياميك.

يمكن إعطاء هذا الدواء فقط بعد التقسيم الدقيق لمعدل التواتر في الحالات:

- المرضى الذين يشكون من إصابات معدية معينة ( كالإسهال المزمن) أو الذين سبق لهم الإصابة بقرحة معدية أو اثني عشرية أو التهابات معدية ( التهاب القولون الجرثومي، داء كرون).

- المرضى الحاملين بالمرض.

- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة.

يطلب من الطبيب إجراء مراقبة خاصة للمرضي في الحالات التالية:

- المرضى الذين يعانون من الربو، الأمراض المزمنة المصحوبة بضعف الحماض التنسيقية، حتى الكلى أو الورم المرمن لغشاء الأنف المخاطي ( البوليبات الأنفية)، لأن هؤلاء المرضى عرضي عليه الحوض. معربون لزود الفعل التحسسية (الدواء الربوية، الفطع القرصي، الأوية التحسسية المنشأ).

- المرضى الذين الظهور ردود فعل شديدة تجاه مضادات الالتهاب أو مخفضات الالتهاب، على سبيل المثال، تواتر بوية، فاعلات تحسسية حادة أو التهاب الفم حاد، يمكن إعطاء بونستان فورت لهؤلاء المرضى فقط في حال اتخاذ إجراءات معينة ( تأمن مستحضرات إسعافية).

- المرضى الحاملين باضطرابات كبدية أو كلوية.

- المرضى الحاملين بارتفاع الضغط الشرياني أو حوض في وظيفة القلب.

- المرضى الحاملين في السن.

الإستعمال أثناء الحمل والرضاع

يفضل عدم إستعمال بونستان فورت خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

يراعى عدم إستعمال بونستان فورت خلال السنة الأولى من الحمل وأثناء الرضاع، إلا بعد التأكد من أن مزايا الإستعمال تفوق احتمالات الضرر.

التأثيرات المعكسية:

كما أن تتكرر الشكاوى المعدية كآلم المعدة، الغثيان، الإسهال الحفيف والبراز المدي المرعى الحفيف الذي قد يقضي إلى فرط حم في بعض الحالات المعزلة وقد تحدث التأثيرات التالية أحياناً:

-القرحات المعدية المعوية، أحياناً مع التهاب نازف.

-إسهال شديد، في هذه الحالة يجب إيقاف إستعمال بونستان فورت فوراً في حالات نادرة يمكن توقع حدوث التأثيرات المعكسية التالية:

-إضطرابات، عصبية مركزية كالصداع / تشوش الرؤية / تعب / إكتئاب ودوار.

- في بعض الحالات النادرة قد تحدث ردود الأعمال حساسية مثل طفح جلدي، إستسقاء حشائي، ضيق في الشعب الهوائية وانخفاض في ضغط الدم لدرجة الدوخة الشديدة.

-نقص الفراز الصدويديوم والماء.

-خلل وظيفي كبدي.

وقد لوححت التأثيرات المعكسية التالية في بعض الحالات المعزلة:

-إضطراب تشكل الدم الذي قد يؤثر على كافة عناصر الدم ما ينتج عنه زيادة الاستعداد للإصابة بالعدوى (مثل ارتفاع درجة الحرارة، عسرة البلع، والبرق كالغراف) والذرق الخلفي غير اللسوي مرض) وعلامات فقر الدم (فوط الحصول والشحوب الشديدة). في هذه الحالات يجب إيقاف إستعمال بونستان فورت فوراً.

-زيادة الفراز المواد النسيجية في البراز والتهاب الكبد الحامض.

-إضطرابات الوظيفة الكلوية وفشل كلوي.

ملاحظات:

باستعماله حسب التوجيهات، قد يؤثر بونستان فورت على درجة الحرارة بما يؤثر بالتالي على قابلية المريض في تشغيل الآلات بما فيها العربات بمحركات، وهذا ينطبق على وجه الخصوص عند إستعماله مع تناول الكحول.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

قد يزداد تأثير مضادات التخثر باستعمالها مع بونستان فورت (احتمال حدوث نزف). لم تجر أبحاث كيميائية - دوائية حول التداخلات الدوائية بين حمض اليفياميك والمواد الفعالة الأخرى المعروفة. بغالبها على إحداث تفاعلات دوائية (مضادات ارتفاع الضغط، خافضات سكر الدم، الديمجركسين، الفيتونين، أنماح البيريديم الخ...).

المخاطر وطرق الإستخدام

يبلغ مقدار جرعة حمض اليفياميك الموصى بها ٧٥٠-١٥٠٠ مجم يومياً. وعموماً يتناول الياقون من بلغوا ١٤ سنة من العمر أو أكثر والبالغون قرصاً واحداً من بونستان فورت مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

طريقة ومدة الإستخدام:

بحسب إتلاف القرص مع كمية كافية من السوائل أثناء الطعام أو بعده.

إذا أعطى الدواء لفترة طويلة، يجب مراقبة تعداد الدم قبل وأثناء المعالجة. يجب على الطبيب أن يحدد مدة المعالجة اللازمة.

ملاحظات:

-يجب عدم تناول الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة.

-في حال حدوث إسهال شديد يجب إيقاف المعالجة بحمض اليفياميك فوراً.

-يجب مراقبة الوظيفة الكلوية في حال الإطعام للمرضى لبونستان فورت مع دواء مدر للبول.

-إستعمال بالأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

إن هذا دواء:

-الدواء مسيخر يؤثر على حسيك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بحرصك للخطر.

-إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

-الطبيب والصيدلاني هما الحمران بالدواء وبمعه وحصره.

-لا تقم مع مدة العلاج (معرفة لك من تلقاء نفسك).

-لا تكون صرف الدواء بدون وصفة طبية.

العمر:

عبرة تحتوي على ٢ أو ٤٥ أو ٥٠ أو ٦٠٠ قرص كل شريط ١٠ قرص.

يحفظ في درجة حرارة (١٥ - ٣٠) درجة مئوية.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

صنع فانيز - مصر ش.م.م. - القاهرة - ج.ع.م

ترخيص من فانيز انكوربورييتد - الولايات المتحدة الأمريكية