

دافركس

أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوى على:
ديوسمين ٤٥٠ مجم
هسبردين ٥٠ مجم

نواحي الاستعمال:

- الأعراض المصاحبة لتصور كفاءة الأوعية الدموية و الأوعية الليمفاوية مثل:
الام ثقل الأطراف، الدوالي.
- علاج الاعراض المصاحبة للبواسير الحادة.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- في حالات التصور في كفاءة الاوردة، يعطى قرصين يوميا (قرص مع الغذاء و قرص مع العشاء)
- في حالات البواسير الحادة يعطى ٦ اقراص يوميا لمدة ٤ ايام (٣ اقراص مع الغذاء و ٣ اقراص مع العشاء)
- ثم ٤ اقراص يوميا لمدة ٣ ايام لخرى (قرصين مع الغذاء و قرصين مع العشاء).

الاعراض الجانبية:

الاعراض الجانبية لمستحضر دافركس قليلة و بسيطة و تكون غالبا في الجهاز المعدي - معوي و التي لا تتطلب إيقاف العلاج.
ومن الممكن تقادى اى من الاثار الجانبية على الجهاز المعدي - معوي اذا تم استخدام دافركس خلال تناول الوجبات.

تحذيرات و احتياطات:

- في حالات البواسير الحادة:
استخدام دافركس لا يستبعد اى علاجات اخرى لامراض الشرج، و العلاج بمستحضر دافركس لا بد ان يكون لفترة قصيرة. و اذا لم تتحسن الاعراض بسرعة، فانه لا بد من اجراء اختبارات شرجية اكثر دقة و يراجع اسلوب العلاج.

الحمل و الرضاعة:

- في الحمل، اثبتت التجارب على الحيوانات انه لا يوجد دليل على حدوث تشوهات في الاجنة، ومن ناحية اخرى، لم تثبت التجارب والدراسات حتى الان على الانسان حدوث اى تأثير ضار من استخدام دافركس.
- في الرضاعة، نظرا لعدم توفر معلومات بالنسبة لاقراص مستحضر دافركس في لبن الامهات، فينصح بعدم الارضاع خلال فترة العلاج.

المعدة:

علبة تحتوى على ثلاثة شرائط، كل شريط يحتوى على ٥ اقراص.

يحفظ في درجة حرارة اقل من ٣٠م و يحفظ بعيدا عن الضوء
يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

النتاج ايجيڤفار
مدينة العبور - مصر

EGIPHAR