

ديلاكس

ديسلوراتادين ٥ مجم

نادراً ما يحدث أعراض جانبية عند تناول الديلاكس شراب مثل الحمى، اسهال، زيادة الشهية، عدم الاستقرار الانفعالي، التهاب البلعوم، نعاس، أرق.

ملحوظة: زيادة جرعة الديسلور تادين قد تؤدي لزيادة طفيفة في QT بدون إحداث آثار عكسية سريرية.

مواع الاستعمال:

يتم استخدامه لدى المرضى الذين لديهم حساسية من الديسلور تادين أو أي من مكونات المستحضر أو اللور تادين.

التحذيرات:

لا توجد دراسات محددة عند استخدام الديسلور تادين في حالات الحمل، لذا يجب أن لا يستخدم أثناء الحمل إلا في حالة الضرورة القصوى.
حيث أن الديسلور تادين يمتص في لبن الأم، لذا يجب اتخاذ قرارا ما بإيقاف تناول الدواء أو إيقاف الرضاعة وذلك حسب أهمية المستحضر بالنسبة للأم.
يوصى بتبسيط الجرعة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والكبد.
الاستخدام الآمن للأقراص والشراب لم يتم التحقق منه بالنسبة للأطفال تحت سن ٦ أشهر.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

البالغون والأطفال من عمر ١٢ عاماً أو أكثر:
ديلاكس أقراص: قرص واحد مرة يومياً أو
ديلاكس شراب: ٢ ملعقة صغيرة (٥مجم في ١٠ مللى) مرة واحدة يومياً
الأطفال من ٦ إلى ١١ عام: ملعقة واحدة صغيرة من ديلاكس شراب (٢,٥مجم في ١٠ مللى) مرة واحدة يومياً.

الأطفال من ١٢ شهر إلى ٥ أعوام: نصف ملعقة صغيرة من ديلاكس شراب (٢,٥مجم في ١٠ مللى) مرة واحدة يومياً.
الأطفال من ٦ أشهر إلى ١١ شهر: ٢ مللى (٥مجم) مرة واحدة يومياً بمعيار خاص.
بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي والكبد: يجب أن تعطى جرعة ٥ مجم من الديسلور تادين يوم بعد يوم بصفة يديوية.

العبرة:

ديلاكس أقراص غلة تحتوي على ٢٠ قرص.

ديلاكس شراب عبوة بها ٦٠ مللى شراب.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠م، في مكان جاف.

يحتفظ بعيداً عن متناول الأطفال

بيان التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف من ديلاكس علي: ديسلور تادين ٥ مجم
المواد الغير فعالة:

دايبازيك كالسيوم فوسفات ديهيدرات، نشا ذره ، مايكروكريستالين سيليلوز ، تلك،
يحتوي كل ٥ مليلتر من ديلاكس علي: ديسلور تادين ٢,٥ مجم

المواد الغير فعالة:

بروبيلين جليكول، صوديوم ستيرات لا مائي، حمض مستيريك لا مائي، بسفزوات الصوديوم، ادبيات ثنائي الصوديوم، سكروز، روح الفزولة، روح العوز، محلول سوربيتول ٧٠%.

الحركة الدوائية:

ديلاكس، ديسلور تادين، مضاد ممتد المفعول للهستامين الثلاثي الحلقة وله خاصية انتقائية لمستقبلات H₁. هو ناتج لعملية أيض اللور تادين.

الديسلور تادين لا يتعدى الحاجز بين الدم والدماغ، و هو يبطئ إفراز الهستامين من الخلية البدينة للانسان.

الأثر الدوائي:

يصل متوسط تركيز الديسلور تادين في الدم خلال ٣ ساعات من تناول جرعة ٥ مجم. ليس للطعام أو لعصير الجريب فروت أي تأثير علي الاتاحة الحيوية للديسلور تادين أقراص أو شراب.

يتم ارتباط ديسلور تادين و ٣ هيدروكسي ديسلور تادين بنسبة ٨٥% بروتين الدم. يتم أيض ديسلور تادين إلى مشتق فعال هو ٣-هيدروكسي ديسلور تادين والذي يتم تحويله إلى جلوكوبورينيد.

مدة نصف العمر للديسلور تادين ٢٧ ساعة. يتم إستعادة حوالي ٨٧% من جرعة C14 - ديسلور تادين موزعه بالتساوي في البول والبراز كناتج الأيض.

الإستخدامات:

- يستخدم لعلاج أعراض حساسية الأنف و غير الأنف الموسمية والمستمره للمرضى من عمر ٦ شهور فما فوق.
- علاج أعراض الحكة وتقليل عدد وحجم البثور في المرضى الذين يعانون من حساسية جلدية غير معلومة السبب للمرضى من عمر ٦ شهور فما فوق.
- أعراض التهاب الملتحمة الناتج عن الحساسيه.

الأثار الجانبية:

إلتهاب البلعوم، جفاف الفم، ألم العضلات، إعياء، نعاس، عسر الحيض - حدوث للنعاس وتأثير بسيط مضاد للمسكارين.

الأثار الجانبية الأخرى التي تم رصدها مثل سرعة خفقان القلب، خفقان و نادراً اضطراب ضربات القلب و ردود أفعال فرط حساسية (مثل الطفح، حكة، طفح جلدي، تورم، ضيق تنفس، و فرط الحساسيه)، للتأثير خارج الهرمي ، تغيرات في صورة الدم وارتفاع إنزيمات الكبد بما في ذلك البيلور وبين و نادراً جداً إلتهاب الكبد. درجة تكرار وقيمة المتغيرات في نتائج التحاليل المعملية والمتغيرات في التخطيط الكهربى للقلب، كانت مماثلة عند مرضى تم علاجهم بكل من ديسلور تادين و علاج مموه.

