

رويسان® أقراص

تيزانيدين

- اقرأ جميع هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول هذا المستحضر .
- حافظ على هذه النشرة فقد تحتاج لقرائنها مرة أخرى .
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشر الطبيب، أو الصيدلي .
- هذا الدواء تم وصفه لك فلا تصفه للآخرين، حتى لو أشتكوا من أعراض مشابهة لما لك .
- إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية الخطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي .

- في هذه النشرة :
- 1- ما هو رويسان* وكيف يعمل
- 2- قبل أن تتناول رويسان* أقراص
- 3- كيفية تناول رويسان* أقراص
- 4- الآثار الجانبية المحتملة
- 5- كيفية تخزين رويسان* أقراص
- 6- المزيد من المعلومات
- 1- ما هو رويسان وكيف يعمل

المواد الفعالة، يحتوي كل قرص من رويسان* على 1.06 مجم تيزانيدين هيدروكلوريد مكافئ ل 1 مجم تيزانيدين لتنتمي أقراص رويسان* إلى مجموعة من الأدوية تسمى مرخيات العضلات. ويستخدم هذا الدواء لتخفيف صلابة وتقلصات العضلات الناتجة عن مرض التصلب المتعدد ، إصابات أو مرض في الحبل الشوكي .

المواد الغير فعالة، بوفيدون K 30 ، كروس بوفيدون XL ، لاكتوز ، أميسيل PH 102 ، تلك ، سترات المنسويم ، إيروسيل ، سنتس اصفر .

2- قبل أن تتناول رويسان* أقراص لا تتناول رويسان* أقراص إذا كان لديك أحد هذه الأمراض

- إذا كنت تعاني من حساسية شديدة للأدوية أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء
- إذا كان لديك قصور شديد في الكبد
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى مثل فلوفوكسامين (للاكتئاب) أو سيبروفلوكساسين (وهو من المضادات الحيوية) (انظر تناول أدوية أخرى)

عناية خاصة مع تناول أقراص رويسان* استشر طبيبك إذا كان لديك أي من الحالات التالية

- قصور في الكلى
- قصور في القلب مثل أمراض الشريان التاجي
- قصور في الكبد

تناول أدوية أخرى يجب ألا تؤخذ أقراص رويسان* في نفس الوقت مع فلوفوكسامين (لعلاج الاكتئاب) أو سيبروفلوكساسين (مضاد حيوي) يرجى إخبار طبيبك الخاص أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أي دواء لعلاج اضطراب ضربات القلب ، مثل أمودارون ، أو ميكسليتيرين أو بروبايفنون

- السيميتيدين (لعلاج عسر الهضم وقرح الجهاز الهضمي)
- بعض المضادات الحيوية مثل فلوروكينولون (إينوكساسين ، بيفلوكساسين ، نورفلوكساسين)
- روفيكوكسيب (مسكن)
- حبوب منع الحمل ، قد تستجيب لجرعة أقل من أقراص رويسان* إذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل .
- نيكوتين (لمنع تلطخ الدم)
- أي دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك مدرات البول
- حاصرات بيتا ، مثل أتينولول ، بروبوتينول
- الديهوكسين (الذي يستخدم لعلاج قصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب)
- الستيرويدات (الحبوب الستيرويدية أو أدوية علاج للتهتك)
- أي أدوية أخرى عندما أخذتها مع تيزانيدين ، لاحظت تأثيرها على انتظام ضربات القلب يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي .

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو تناولت في الآونة الأخيرة أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية .

أخذ أقراص رويسان* مع الطعام والشراب

يجب عدم تناول رويسان* أقراص مع وجبات الطعام . تناول المشروبات الكحولية قد تزيد من التأثير الهدئ لرويسان* لذلك فمن المستحسن عدم شرب الكحوليات أثناء العلاج بمستحضر رويسان*

الحمل والرضاعة الطبيعية، لا توصي بتناول أقراص رويسان* خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية .

أخبار طبيبك إذا كنت متحمدين أنك قد تكوني حاملا ، أو طليسي مشورته قبل أخذ أي دواء .

القيادة واستخدام الآلات، قد تسبب أقراص رويسان* التماس أو الدوار في حالة الشعور بالتعب أو بالدوار مع أخذ هذا الدواء . يجب التوقف عن قيادة السيارات أو الآلات

3- كيفية تناول رويسان* أقراص يجب أن يأخذ هذا الدواء بالضبط وفقا لتوجيهات وصف الطبيب.

هذا المستحضر يحتوي على لاكتوز ، إذا كنت تعرف أن لديك عدم تحمل لبعض السكريات رجاء استشارة الطبيب أولا قبل تناول هذا الدواء

الجرعة المعتادة، البالغين،

قد يبدأ الطبيب بإعطاء جرعة 2 ملجم مرة واحدة يوميا، ويمكن زيادة الجرعة تدريجيا ، كل ثلاثة إلى أربعة أيام . مقسمة على 2 - 4 مرات يوميا . الجرعة المعتادة هي 12 - 24 مجم يوميا بعد أفصص 26 مجم يوميا .

كبار السن ، سوف يقرر طبيبك ما إذا كان ينبغي أن يعطى أقراص رويسان* لكبار السن .

الأطفال والمراهقين (تمت 18 سنة) : لا توصي بوصف أقراص رويسان* لاستخدامها مع الأطفال والمراهقين .

المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، يجب أن تبدأ العلاج بجرعة 2 مجم مرة واحدة يوميا ، سوف يخبرك طبيبك بشأن كيفية زيادة الجرعة .

كيف تتناول الاقراص : تؤخذ الأقراص عن طريق الفم ويجب بلعها كاملة مع كوب من الماء .

إذا تجاوزت الجرعة، إذا ابتلعت (أو شخص آخر) الكثير من أقراص رويسان* ، أو إذا ابتلع طفل أي قرص ، فانصل بطبيبك أو اذهب لأقرب مستشفى فوراً .

تناول جرعة زائدة قد يسبب الغثاس - التقيؤ ، وانخفاض ضغط الدم ، انخفاض معدل ضربات القلب، دوخة - ضيق حدة العين - صعوبة في التنفس - غيبوبة - أرق أو ناس .

إذا نسيت أن تأخذ جرعة رويسان* ، إذا كنت قد نسيت أن تأخذ واحدة أو أكثر من أقراص رويسان* فاحرص على أخذ الجرعة التالية في موعدها ولا تأخذ جرعة إضافية لتعويض الجرعة المنسية .

التوقف عن تناول أقراص رويسان* لا توقف العلاج دون مشورة طبيبك، يجب التوقف عن تناول رويسان* تدريجيا، خاصة إذا كنت تأخذ جرعات كبيرة . ما لم يقرر طبيبك خلاف ذلك، وقف العلاج فجأة قد يسبب آثار جانبية مثل زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم .

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة بشأن استخدام هذا المستحضر ، إسأل طبيبك أو الصيدلي .

4- الآثار الجانبية المحتملة مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب تناول رويسان* بعض الآثار الجانبية، على الرغم من عدم حدوثها مع جميع الحالات .

شائع ، يؤثر 10-100 مستخدم في 1000

- حمول ، تعب ، دوخة
- انخفاض ضغط الدم
- ارتفاع ضغط الدم عند وقف العلاج فجأة
- جفاف الفم
- نقصان أو زيادة في معدل ضربات القلب .

نادرة ، يؤثر 1-10 مستخدم في 10000

- هلوسة
- الغثاس ، متعب في المعدة
- ضعف العضلات،

نادرة جدا ، يؤثر على أقل من 1 مستخدم في 10000

التهاب أو فشل الكبد ، مما قد يؤدي إلى إضرار في العينين أو الجلد و / أو إفراز البول الداكن .

استشر طبيبك على الفور إذا حدث هذا .

آثار جانبية أخرى (غير معروف معدل حدوثها) :

- عدم انتظام ضربات القلب
- الصداع ، اختلال حركي
- فقدان الشهية
- القلق ، والارتباك

إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية السابقة خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة ، أخبر طبيبك أو الصيدلي .

5- كيفية تخزين رويسان* أقراص

- يحفظ في مكان آمن بعيداً عن تناول أيدي الأطفال
- لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة
- يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية وفي مكان جاف
- لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية . اطلب من الصيدلي معرفة كيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة . من شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة

6- المزيد من المعلومات

المعوية، طبعة كارتون تحتوي على 30.30 (الوونوم) بي بي سي شفاف) شرابها 10 أقراص ونشرة داخلية.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن تناول الأطفال



V03-28-1-2014

إنتاج شركة أمون للأدوية



مدينة العبور، القاهرة، مصر.