

كيسولات

التركيب:

تحتوي كل كيسولة على 250 ملجم من كلورزوكسازون و 300 ملجم من باراسيتامول.
 السواغات: كبريتات لوريل الصوديوم، ثنائي أكسيد السيليكون الغروي، سترات الماغنسيوم و كروسبوفيدون

الشكل الصيدلاني: كيسولات جيلاتينية صلبة.

المفعول الدوائي:

ريلاكسون™ هو دواء يؤدي إلى إرتخاء العضلات و مسكن.
 كلورزوكسازون هو مستحضر باسطة للعضلات الإرادية يعمل بشكل مركزي حيث يعمل بمنطقة النخاع الشوكي و ما تحت القشرة المخية وذلك بثبط العضلات العصبية بالمسارات الإتعاكسية و الممنولة عن إحداث و إستمرار التقلصات العضلية.
 يتميز الباراسيتامول بتأثيره المسكن و الخافض للحرارة الذي يضافه التأثير المماثل للأسبرين في منع تكون البروستاجلاندين في الجهاز العصبي المركزي مكملاً بذلك التأثير المسكن الناتج بشكل ثانوي لإرتخاء العضلات و الذي يحدثه الكلورزوكسازون.
 إن ريلاكسون™ كيسول يزيل الألم سريعاً و يستعيد القدرة على الحركة حتى في حالات تقلص العضلات الهيكلية الشديد و المولم و لا يحتوي ريلاكسون™ كيسول على أسبرين لذا فهو يستعمل بأمان تام مع المرضى الذين يعانون من حساسية للأسبرين و أيضاً في حالات الهيموفيليا و أمراض الجهاز الهضمي (مثل القرحة و التهاب المعدة).

الحركيات الدوائية:

يمتص كلورزوكسازون سريعاً ويتواجد بالدم خلال نصف ساعة. يصل إلى أعلى معدلاته بالدم من 1 إلى 2 ساعة. يبدأ مفعول العقار خلال ساعة.

تتم عمليات الأيض بالكبد لمدة كلورزوكسازون سريعاً و يفرز مع البول في شكل نواتج إضييه و تصل فترة نصف العمر إلى حوالي ساعة. يمتص الباراسيتامول سريعاً و بشكل كامل من المعدة و يصل إلى أعلى معدلاته بالبلازما في خلال نصف ساعة إلى ساعتين. يتم توزيعه بشكل منتظم إلى جميع سوائل الجسم. تتم عمليات الأيض للباراسيتامول بالكبد و يتم إفرازه بشكل أساسي بالبول في شكل نواتج إضييه و تبلغ فترة نصف العمر حوالي ساعتين.

دواعي الإستعمال:

كيسولات ريلاكسون™ تستخدم لإزالة التقلصات العضلية المصحوبة بالألم شديدة نتيجة أمراض الجهاز العضلي الحركي مثل:

- الأم أسفل الظهر
- حالات تآكل الفقرات العنقية
- إلتواء المفاصل
- الشد العضلي و آلام العضلات
- تعثر اللقعات الرقبية
- الصداع الناتج عن التوتر العضلي
- التقلص الناتج عن إصابة العضلات

الجرعة و التناول:

الجرعة المعتادة للبالغين: كيسولة من ثلاث إلى أربع مرات يومياً أو على حسب إرشاد الطبيب.
 ملاحظه: في حالة حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي يتم تناول المستحضر مع الأكل أو مع كمية مناسبة من الماء

موانع الإستعمال:

فرط الحساسية لأي من المكونات بالمستحضر.
 يجب على مرضى الكبد تجنب إستخدام هذا المستحضر.

الآثار الجانبية:

قد يحدث اضطراب في الجهاز الهضمي بشكل عرضي ، دوار ، غثيان ، قليل من الإحساس بقل الرأس أو الرغبة في النوم. نادراً قد يلاحظ المريض تغير في لون البول بسبب إفراز بعض النواتج الأيضية للكلورزوكسازون.

التفاعلات الدوائية:

الكحول و مثبطات الجهاز العصبي المركزي:
 حيث تؤدي هذه العقود إلى إحساس بالرغبة في النوم و الذي قد يزيد من التأثير المماثل للكلورزوكسازون كما أن هذه العقود تزيد من إحتمال تأثر الكبد بسمية الباراسيتامول.

الحمل و الرضاعة:

لم يستدل بعد على سلامة إستخدام مادة الكلورزوكسازون أثناء الحمل و الرضاعة و يمكن إستخدامه فقط عند الإحتياج الشديد و حسب رؤية الطبيب المعالج.

التحذيرات و الإحتياطات:

تم رصد بعض الحالات النادرة للتسمم الكبدى و التي قد تكون خطيرة في قليل من المرضى المستخدمين لمادة الكلورزوكسازون . ولا يعرف سبب ذلك على وجه النق و لا يمكن توقعه كما لا تعرف العوامل التي تساعد على حدوث هذه الحالة و لذلك فيجب التنبيه على المرضى بالإبلاغ عن المظاهر الميكرة للتسمم الكبدى مثل : إرتفاع درجة الحرارة ، الطفح الجلدى ، فقدان الشهية ، الغثيان ، القي ، التعب ، حدوث ألم بالجانب الأيمن من أعلى البطن ، تحول البول إلى اللون الداكن أو إستقرار بالحدى . في هذه الحالة يجب إيقاف إستخدام مادة الكلورزوكسازون فوراً و إستشارة الطبيب عند حدوث هذه الأعراض . يجب إيقاف إستخدام مادة الكلورزوكسازون عند حدوث إرتفاع في إنزيمات الكبد (ALT ، AST ، الكالين فوسفاتيز أو نسبة الصفراء). قد يكون الإستخدام المتزامن مع الكحوليات أو غيرها من مثبطات الجهاز العصبي المركزي له تأثير إضافي.
 في حالة حدوث أعراض الحساسية مثل الحكة و احمرار الجلد يجب إيقاف إستخدام المستحضر.
 في حالة حدوث أى أعراض تشير إلى تدهور وظائف الكبد يجب إيقاف إستخدام المستحضر. وقد يؤدي إستخدام جرعات أكبر من الجرعات المقرره إلى حدوث ضرر حاد بالكبد . يجب إستخدام الدواء تحت إشراف طبي في حالة وجود أمراض بالكلى.

العبوة و التخزين:

يتوفر ريلاكسون™ كيسولات في شرائط بها 10 كيسولات داخل عبوة بها عدد 3 شرائط.
 يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 م.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فاطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيادلة العرب

General Medicine

ريلاكسون™، مستحضر عالي الجودة من إنتاج

مجموع فارما
 Jamjoom Pharma

ص.ب: 6267 - جدة 21442 - المملكة العربية السعودية

12500843 - Rev. 01S/30-12-12