

سباز موفري

موانع الاستعمال:

- اختلالات البروستاتا التي قد تؤدي لخطر الاحتباس البولي.
- عند وجود خطر حدوث جلوكوما.

تحذيرات:

احتياطات عند الاستخدام:

* أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية:

- لم تظهر الدراسات التي أجريت عن التيمونيوم على الحيوانات أي تشوهات خلقية في الجنين وبالرغم من أن هذه الدراسات لا تحكم على تأثيرات الدواء في الإنسان إلا أنه حتى الآن لم تسجل أي تشوهات خلقية مع الاستخدام العادي.

- نظرًا لعدم وجود بيانات كافية، فإن الاحتياط هو الأساس عند استخدام المرصعات للتيمونيوم بالرغم من أنه لم تسجل أي مشكلات مع الاستخدام العادي.

* للتأثير في القدرة على قيادة السيارات أو تشغيل الماكينات: لا يوجد.

* التفاعلات مع الأدوية والتفاعلات الأخرى: لا يوجد.

* الآثار غير المرغوبة: خطر حدوث انخفاض في ضغط الدم وزيادة في ضربات القلب في حالة الحقن السريع.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

الأقراص:

- للبالغين: الجرعة المعتادة من ٢ إلى ٦ أقراص يوميًا مقسمة على جرعات.

- للبالغين: الجرعة المعتادة:

- ٣ ملعقة كبيرة ثلاث مرات يوميًا.

- للأطفال: ٣ ملاعق صغيرة / ٥ كجم من وزن الجسم في اليوم مقسمة على جرعات.

الأمبولات: أمبولة واحدة بالحقن البطني في الوريد أو العضل، من مرة واحدة إلى ٣ مرات على مدار اليوم.

تجاوز الجرعة:

الأعراض: ظهور الأعراض الأتروبيديه: جفاف الفم - الإمساك - سرعة في ضربات القلب - بالإضافة إلى التوهان في كبار السن.

العلاج:

- علاج الأعراض في وحدة خاصة مزودة بأجهزة لمراقبة القلب والتنفس في حالة الحقن.

- غسل المعدة مع علاج الأعراض في وحدة خاصة مزودة بأجهزة لمراقبة القلب والتنفس في حالة الأقراص والشراب.

العبوة:

- الأقراص: عبوة كرتون تحتوي على ١، ٢، ٣، ٢٥ شرائط ألومنيوم يحتوي كل شريط على ١٠ أقراص + نشرة داخلية.

- الشراب: زجاجة بها ١٢٠ مللي بتركيز ١٠ مجم / ٥ مللي.

- الأمبولات: عبوة كرتون تحتوي على ٣، ١٠٠ أمبولة / ٢ مللي + نشرة داخلية.

إنتاج شركة أنوبيا ش.م.م. العاشر من رمضان
مصر

التركيب:

الأقراص: تيمونيوم ميثيل سلفات

الشراب: تيمونيوم ميثيل سلفات

أمبولات: تيمونيوم ميثيل سلفات

٥٠ مجم
١٠ مجم / ٥ مللي
٥ مجم

طريقة عمل الدواء:

تيمونيوم مضاد للتقلصات له تأثير طرفي مضاد للأستيل كولين (٥٠/١ من مفعول الأتروبين).

حركة الدواء في الجسم:

عن طريق الفم: العمر النصفى للتخلص ٣ ساعات و ٢٤ دقيقة، يصل لأعلى تركيز في البلازما خلال ساعتين ويتم إخراجه كلية خلال ٧٢ ساعة (عن طريق البراز: ٧٠٪ خلال ٧٢ ساعة وعن طريق البول: ٨٪ خلال ٢٤ ساعة وأيضًا يخرج عن طريق الجهاز التنفسي ومن خلال الجلد).

دواعي الإستعمال:

- علاج النقص والعلاج العرضي للألام الناتجة عن الاختلالات الوظيفية في كل من الجهاز الهضمي والقنوات المرارية و المرارة وفي الجهاز البولي وفي أمراض النساء.