



للمهن الطبية فقط

سيناريزين - ٧٥

كبسول

لعلاج اضطرابات الدورة الدموية بالمخ والأطراف

التركيب :

تحتوي كل كبسولة على :

سيناريزين ٧٥ مجم.

الخواص :

- سيناريزين - ٧٥ يزيل سريعاً الأعراض الناجمة عن اضطرابات الدورة الدموية بالمخ والأطراف ويمنع نوبات الصداع الوعائي كالصداع النصفي.

- يعيد الدورة الدموية بالمخ إلى طبيعتها من حيث زمنها ورمسها البياني ويمنع تدفق الدم فيها عند المرضى الذين يعانون من اضطرابها وعند المرضى الذين يعانون من تقلصات الأوعية الدموية (مرض رينولدز) حيث أنه يعيد النبضات الشريانية إلى طبيعتها.

- يزيد هذا الدواء بشكل ملحوظ سرعة اندفاع النبضات الشريانية و تدفق الدم في الأطراف شديدة الإصابة كما يزيد من معانات السير عند المرضى الذين يعانون من التقلصات المتقطعة بالمقنين.

- ميناريزين - ٧٥ يماعد على سرعة التئام قرح المواق كما أنه يقلل أو يزيل أعراض اضطرابات الأذن الداخلية (كالدوار والطنين) وأعراض الجهاز العصبي المتمثل (الغثيان - القيء - الشحوب وبرودة الأطراف) و يمنع أو يقلل حدوثها مستقبلاً.

نواعي الاستعمال:

١- اضطرابات الدورة الدموية بالمخ:

الوقاية والعلاج من أمراض تقلص الأوعية الدموية وتصلب شرايينه كالذخوة والطنين والصداع الوعائي وعدم التكيف الإجتماعي والإثارة والإرهاق واضطرابات نظام النوم وخاصة الاستيقاظ المبكر ومرعة التسميان وعدم القدرة على التركيز والسهل البولي والإكتئاب والاضطرابات الأخرى التي تصاحب المشوخة والصداع النصفي.

٢- اضطرابات الدورة الدموية بالأطراف:

الوقاية والعلاج من أعراض تقلص الأوعية الدموية وتصلب الشرايين (التهاب الشرايين الإمدادي والتهاب الأوعية الدموية التجلطى الإمدادي - مرض رينولدز - مرض السكر - زرقعة الأصابع - لمعة البرد ... الخ) وكذلك التقلصات المتقطعة بالمقنين ، والاضطرابات والقروح الإعتقائية الناجمة عن الدوالي وما قبل الغرغرينا والتنسبل والتقلصات التليافية وبرودة الأطراف.

٣- اضطرابات التوازن :

الوقاية والعلاج من أعراض تصلب شرايين الأذن الداخلية وتهيجها أعراض (مرض منيير) مثل الدوار والذخوة ونوبات الإغماء والطنين وانترزاز العين والغثيان والقيء.

الوقاية من الدوار الحركي.

الأثار الجانبية:

- مثل الملل للنوم واضطرابات الجهاز الهضمي فهي تادرة الحنوث جداً ومزقةً ومريعاً ما يمكن منعها بالوصول

للجرعة المناسبة تدريجياً

- يمكن استعمال العلاجات الأخرى مع سيناريزين إذا لزم الأمر.

نواهي الاستعمال :

- لا يستعمل الدواء في حالات المرضى الذين يعانون من البورفيريا الحادة.

الإحتياطات:

يحظر تعاطي الكحوليات عند المعالجة بهذا الدواء.

الجرعة:

- اضطرابات الدورة الدموية بالمخ : كبسولة واحدة يومياً

- اضطرابات الدورة الدموية بالأطراف: ٢-٣ كبسولة يومياً على جرعات.

- الدوار الحركي : كبسولة واحدة قبل العفر بنصف ساعة وتكرر بعد ١٢ ساعة.

- اضطرابات التوازن : كبسولة واحدة يومياً.

ملحوظة:

يفضل تعاطي ميناريزين - ٧٥ بعد الأكل

العوة:

علية بها ٢٠ كبسولة في شرائط.

الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضه للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي لذى صرفها لك.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر تناول الدواء إلا بتعليمات من الطبيب.

مجنس وزراء لصحة العرب واتحاد لصيادلة العرب

- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

الشركة العربية للأدوية القاهرة ج.م.ع

