150225147015

فـاركـس
أقـراص مغلفة

قم بقراءة هذه النشرة بعناية لانها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك
فاركس أقراص تحتوي على :

المواد الفعالة: ايبوبروفين ٢٠٠ مجم
سودوإيفيدرين هيدروكلوريد ٣٠ مجم

المواد غير الفعالة:
نشا – بوليفينيل بايروليدون – ميكروكريستالين سيليلوز - صوديوم كارميلوس – ستيريل فيوميريت الصوديوم – كوبوليمر حمض ميثاكريليك – تلك – بولي إيثيلين جليكول – ثلاثي سيترات الإيثيل – أكسيد الحديديك أحمر – أكسيد الحديديك أصفر- ثاني أكسيد التيتانيوم- سليكات الماغنيسيوم.
يؤخذ هذا الدواء بدون وصفة طبية لعلاج الحالات البسيطة. ومع ذلك يجب أن تأخذه بحرص للحصول على أفضل النتائج.
• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
• اسأل الصيدلي إذا احتجت لمزيد من المعلومات أو النصيحة.

فيما يُستخدم هذا الدواء؟
يحتوي هذا الدواء على إيبوبروفين وسودوإيفيدرين. يخفف إيبوبروفين الألم ويخفض درجة الحرارة. وسودوإيفيدرين يزيل احتقان الأنف.
يمكن استخدامه لتخفيف أعراض البرد والأنفلونزا بما فيها الاحتقان، والأوجاع والآلام والصداع الحمى والتهاب الحلق وانسداد الأنف والجيوب الأنفية.

قبل أن تتناول هذا الدواء
يمكن أن يتناول هذا الدواء البالغين والأطفال أكبر من ١٢ سنة. ومع هذا، بعض الناس يجب ألا يتناولوا هذا الدواء أو يجب ان يطلبوا نصيحة الطبيب أو الصيدلي أولا.

لا تتناول هذا الدواء:
• إذا كنت تعاني من قرحة في المعدة أو ثقب أو نزيف أو عانيت من أي منها مسبقا.
• إذا عانيت من وجود ثقوب بجدار المعدة أو نزيف في المعدة بعد أخذ الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (قد تكون أصبت بالقيء واحتوي على دم أو جزيئات داكنة مثل حبيبات البن، وجود دم في البراز أو براز أسود قطراني).
• إذا كنت مصابا بحساسية لإيبوبروفين أو أي من مكونات المستحضر، أو أسبيرين أو أي من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى (أصبت بربو، أو رشح الأنف أو حكة في الجلد أو تورم في الوجه أو الشفاه أو الحلق بعد أخذ هذه الأدوية)
• إذا كنت تتناول أسبيرين بجرعة يومية أكثر من ٧٥ مجم، أو أي مضادات للالتهاب غير الستيرويدية الأخرى.
• إذا كنت مصاب بقصور حاد في الكبد أو الكلى.
• إذا كنت مصابا بمرض شديد في القلب أو الأوعية الدموية، بما فيها سرعة ضربات القلب والذبحة الصدرية
• إذا كنت مصابا بضغط الدم المرتفع
• إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، أو كنت مصابا بداء السكر أو تعاني من ورم بجوار الكلية.
• إذا كنت مصاب بالمياه الزرقاء على العين (جلوكوما)
• إذا كنت تتناول مثبطات مونوأمين أوكسيديز (لعلاج الاكتئاب) أو كنت قد تناولتها خلال آخر ١٤ يوم.
• إذا كنت رجلا تعاني من مشاكل في البروستاتا
• إذا كنت حاملا

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي:
• إذا كنت مصابا بالربو، أو سبق لك الاصابة بالربو أو أمراض حساسية، أو مشاكل في الأمعاء
أو مرض كرون.
• إذا كان لديك مشاكل أخرى في الكلى أو القلب أو الكبد (انظر في الأعلى)
• إذا كان لديك مشاكل بالنسيج الضام مثل مرض الذئبة الحمراء.
• إذا كنت كبير في السن – قد تصاب بآثار جانبية أكثر
• إذا كنت تتناول مسكنات أخرى أو تتناول علاج منتظم بوصفة من طبيبك
• إذا أصبت بسكتة دماغية أو لديك مشاكل في القلب أو مصاب بمرض السكر أو كوليسترول مرتفع أو كنت مدخنا - انظر "مخاطر الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية" بالأسفل

معلومات هامة أخرى
مخاطر الأزمة القلبية أو السكتة: قد يُزيد ايبوبروفين من المخاطر إذا أخذت كمية كبيرة لفترة طويلة. خذ أقل كمية لأقصر وقت ممكن للتقليل من المخاطر.
الرضاعة الطبيعية: يمكنك استخدام هذا الدواء.
النساء في سن الحمل: إذا تناولت هذا الدواء فقد تقلل من قدرتك على الحمل. هذا التأثير سيُعكس عندتوقفك عن اخذ الدواء.

تحـذيـر
المخاطر على القلب والأوعية الدموية
الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية قد تسبب زيادة إحتمالات حدوث الجلطات القلبية الوعائية، إحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تكون قاتلة. وهذه المخاطر قد تزيد مع طول فترة الإستخدام. إن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم احتمالية عالية للاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يكونون في خطر أكبر. لا تستخدم مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية كمسكنات للألم قبل عمليات تحويل مسار الشريان التاجي.
المخاطر على الجهاز الهضمي
مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية تسبب زيادة إحتمالات اثار جانبية خطيرة على المعدة والأمعاء بما في ذلك الالتهاب والنزيف والتقرح، وثقب المعدة والأمعاء، والتي يمكن أن تكون قاتلة. ويمكن لهذه الاثار أن تحدث في أي وقت خلال الإستخدام ودون أعراض منذرة. المرضى كبار السن هم أكثر عرضة للاثار المعدية المعوية الخطيرة.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى
قبل أن تتناول هذه الأقراص، تأكد من ابلاغك الصيدلي بأي أدوية أخرى تتناولها في نفس الوقت، وبخاصة الأدوية التالية:

• مسكنات أخرى
• أسبيرين ٧٥ مجم (يستخدم لمنع الأزمات القلبية والجلطات) فقد يضعف تأثير الأسبرين مع تناولك لإيبوبروفين.
• أقراص لمنع تجلط الدم (مثل وارفارين).
• ميفربستون (للإجهاض أو التخلص من الحمل) فيجب عدم تناول إيبوبروفين مع ميفربستون في اخر ١٢ يوم.
• أقراص الماء (مدرات البول)، أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع وأدوية علاج مشاكل القلب.
• كورتيكوستيروید (والتي تستخدم في علاج كثير من المشاكل مثل: ألم، تورم، حساسية، أزمة حساسية الصدر، روماتيزم، ومشاكل الجلد.
• ليثيوم (لعلاج الأمراض النفسية التي تتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج).
• ميثوتريكسات (لعلاج السرطان، الصدفية، أو الروماتيزم).
• زيدوفودين (لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية ايدز).
• كينولون (مضادات حيوية يستخدم لعلاج العدوى).
• مضادات الإكتئاب.
• سيكلوسبورين أو تاكروليموس (تستخدم هذه الأدوية بعد زراعة الأعضاء، أولعلاج الصدفية أو الروماتيزم).
• مضادات الاحتقان الأخرى أو الأدوية التي تستخدم لتقليل الشهية.
• قلويات الارجوت لعلاج الصداع النصفي.
إذا لم تكن متأكد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى، تحدث مع الصيدلي. وتشمل هذه على أدوية وصفها لك الطبيب أو أدوية اشتريتها بنفسك، بما في ذلك الأدوية العشبية.

كيف تتناول هذا الدواء
البالغين والأطفال (من سن ١٢ سنة وأكبر):
تناول قرصين من فاركس كبداية. ثم قرص أو قرصين كل ٤ ساعات إذا كان هناك حاجة. لا تتناول أكثر من ٦ أقراص خلال اليوم (٢٤ ساعة).
تناول أقل كمية من فاركس لأقصر فترة وذلك لعلاج الأعراض.
تناول كل قرص مع الماء.

حذار استخدام فاركس للأطفال أقل من ١٢ سنة.
لا تتناول فاركس بجرعات أكبر من الموصى بها أعلى.
إذا ساءت الأعراض في أي وقت من تناولك لفاركس، فابلغ طبيبك.
إذا لم تتحسن الأعراض التي تعاني منها خلال ٧ أيام، فتحدث إلى طبيبك.
إذا تناولت أقراص كثيرة جدا
تحدث مع طبيبك فورا. خذ معك الدواء وهذه النشرة.

الآثار الجانبية المحتملة
معظم الناس لن يصابوا بمشاكل، ولكن بعضهم قد يعانون من بعض الآثار الجانبية.
إذا كنت كبير السن فقد تكون أكثر عرضة لبعض هذه الآثار الجانبية.
إذا أصبت بأي من هذه الآثار الجانبية الخطيرة، توقف عن تناول الأقراص. وتوجه للطبيب على الفور:
• إذا أصبت بقيء ويحتوي على دم أو جزيئات داكنة تبدو مثل حبيبات البن.
• يوجد دم في البراز أو براز أسود قطراني.
• مشاكل في المعدة وتشمل الألم، سوء الهضم أو حرقة في المعدة.
• تفاعلات حساسية مثل الطفح الجلدي (والتي قد تكون أحيانًا شديدة وتشمل تقشر وظهور تقرحات في الجلد)، أو تورم في الوجه أوالحلق أوالحلق، أو تفاقم الربو، أو صعوبة في التنفس.
• الالتهاب السحائي (مثل تيبس الرقبة، حمى، تو هان وعدم توازن).
• مشاكل بالكلى والتي قد تؤدي إلى فشل كلوي (وهنا قد تشعر بتعب شديد أو ضعف عام وعدم القدرة على التنفس مع فقدان للشهية أو تورم للكاحلين).
يمكن أن يؤدي تناول هذا الدواء نادراً جداً إلى ما يعرف بمتلازمة ستيفن-جونسون وهو أحد أشكال التهابات الجلد الشديدة (نظراً لوجود إيبوبروفين).
هناك بعض الأعراض الجانبية الأخرى أقل خطورة. إذا ضايقتك تحدث مع الصيدلي
• الشعور بالغثيان أو التقيء.
• الدوخة، الصداع، مشاكل في السمع.
• جفاف الفم، العطش، التعرق، فقدان الشهية.
• ألم في الصدر، سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، ضغط دم مرتفع، نوبة قلبية (قد تكون متعب وتعاني من مشاكل في التنفس أو تورم في الأرجل).
• احتباس السوائل، والتي قد تؤدي إلى تورم الأطراف.
• عدم الإرتياح وصعوبة النوم.
• نادراً جداً، إرهاق أو إجهاد شديد، تغير في الدم مما قد يؤدي إلى سهولة وكثرة الإصابة بالعدوى (مثل إحتقان الحلق، قرح بالفم، أعراض تشبه أعراض البرد).
• زيادة طفيفة في إمكانية الإصابة بأزمة قلبية أوسكتة دماغية إذا تناولت فاركس بكميات كبيرة لفترة طويلة.
إذا أصبحت أي من هذه الآثار الجانبية شديدة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية لم تذكر هنا، فضلا أخبر طبيبك أو الصيدلي.

كيف تحفظ هذا الدواء
يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠م°.
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

العبوة
علبة كرتون تحتوي على شريطين (ألومنيوم / بي في سي) يحتوي كل شريط على ١٠ أقراص + النشرة الداخلية

الناشر: شركة المهن الطبية للأدوية
أبو سلطان – إسماعيلية – مصر
تاريخ الإصدار: ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠، (إعادة المراجعة: ٣ / ٣ / ٢٠١٤

MUP