

فاركوسولفين

شراب

كبسولات جيلاتينية رخوة

مذيب وطارد للبلغم
وموسع للشعب الهوائية

التركيب:

تحتوى كل تركيبة على:	٥ مليلتر شراب	كبسولة
هيدروكلوريد أمبروكسول	١٥ مجم	٣٠ مجم
جوايفينيسين	٣٠ مجم	١٠٠ مجم
ثيوفيللين لا مائي	٥٠ مجم	٦٠ مجم

الأثر الطبي:

يحتوى **فاركوسولفين** (شراب وكبسولات) على أمبروكسول وجوايفينيسين وثيوفيللين لا مائي - وهذه المواد الثلاثة تعمل معاً لإذابة وطررد البلغم وتوسع الشعب الهوائية - فمادة أمبروكسول تذيب البلغم وتقلل لزوجة الإفرازات المخاطية مما يسهل خروجها من الممرات التنفسية - أما جوايفينيسين فيزيد من سيولة الإفرازات المخاطية ويقلل من تورمها السطحي مما يساعد على طرد البلغم وإضفاء تأثير ملطف على سطح الطبقة المبطنة للقصبة الهوائية والشعب الهوائية . ويعمل ثيوفيللين اللا مائي كموسع للشعب الهوائية من خلال ارتخاء العضلات اللاإرادية بحداد الممرات التنفسية وتثبيط مركز التنفس بالمخ وزيادة قوة انقباض عضلة الحجاب الحاجز وتسهيل خروج الإفرازات من الشعب الهوائية - ونتيجة لهذه التأثيرات العديدة لمكونات **فاركوسولفين** ينهل طرد الإفرازات المخاطية مما يمنع تراكمها بالقصبة والشعب الهوائية - ومن الناحية الإكلينيكية فإن **فاركوسولفين** يعالج السعال المصحوب بافرازات لزجة كما يقلل حدة نوبات السعال الجاف المهيح للشعب الهوائية ومايصاحب ذلك من ضيق في الممرات التنفسية - وهذه الخواص مجتمعة تؤكد الفعالية العالية لمستحضر **فاركوسولفين** في علاج مختلف أنواع السعال المصاحب للعديد من أمراض الجهاز التنفسي في الأطفال والبالغين.

دواعي الاستعمال:

يستعمل **فاركوسولفين** (شراب أو كبسولات) في العديد من أمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة لعلاج السعال المصحوب ببلغم وكذلك السعال الجاف كما في حالات:

- التهابات الشعب الرئوي.
- التهابات الشعب الرئوي.
- حالات الربو المصحوبة بالتهاب شعبي.
- تمدد وانتفاخ الرئة.
- إنكماش الرئة.

موانع الاستعمال:

الحساسية المفرطة لمكونات **فاركوسولفين**.

الاحتياطات:

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى التي تحتوى على ثيوفيللين يستخدم **فاركوسولفين** بحذر في حالات فرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد والكلى.

الأعراض الجانبية:

فاركوسولفين مأمون الاستعمال ونادرأما يحدث شعور مؤقت بالغثبان أو القس.

الحمل والرضاعة:

يستخدم **فاركوسولفين** أثناء الحمل والرضاعة تحت إشراف الطبيب إذا استدعت الحالة.

التحذيرات:

لا يستخدم الدواء للأطفال أقل من عامين بشكل تام ويجب استخدامه للأطفال أقل من ٦ سنوات تحت إشراف طبي فقط.

الجرعة:

الأطفال من ٢ - ٦ سنوات ، ١/٢ - ١ ملعقة صغيرة من ٣ - ٤ مرات يومياً تحت إشراف الطبيب

الأطفال من سن ٦ - ١٢ سنة : ١ - ٢ ملعقة صغيرة ٣ - ٤ مرات يومياً .

البالغون والأطفال فوق ١٢ سنة : ١ - ٣ ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً أو ١ - ٢ كبسولة ٣ مرات يومياً .

العبوة:

زجاجسة تحتوى على ٦٠ مليلتر أو ١٢٠ مليلتر من الشراب

علبة تحتوى على ١٢ كبسولة أو ٢٤ كبسولة جيلاتينية رخوة

الحفظ:

الشراب: يحفظ في درجة حرارة (١٥ - ٣٠ °) .

الكبسولات: تحفظ في درجة حرارة (١٥ - ٣٠ °) في مكان جاف .

إن هذا الدواء

مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- اتبع وصفة الصيدلي هما الخبيران بالدواء وينقعه وشرهه

- لا تقطع مسددة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

صنع في مصر

PHARCO
PHARMACEUTICALS

الإسكندرية

