

- أقرص مغلفة تده الشرة بعناية قبل بدء تعاطي خالتواء.
- احتفظ بهذه الشرة فقد تحتاج قرأتها مرة أخرى.
- لمزيد من الاستفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء موصوف لك فقط ولا تعطيه للآخرين فقد ينسجم حتى ولا تشابهت أعراض المرض.
- إذا تعافت أي من الأثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية أخرى يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي.
- لا تكرر استعمال هذا الدواء بدون استشارة الطبيب.

**تعطى هذه الشرة على:**

- ما هو فيسيرالجين ٥٠ مجم أقرص مغلفة وما هي دواعي استعماله.
- قبل التلام باستعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة.
- طريقة استعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة.
- الأثار الجانبية المحتملة لتعويض الجين ٥٠مجم أقرص مغلفة.
- طريقة حفظ فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة.
- معلومات أخرى.

**ما هو فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة وما هي دواعي استعماله:**

- المجموعة الدوائية للعلاجية:
- مضاد للتشنجات و مضاد لتكوين.
- دواعي الاستعمال:
- فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة هو دواء مضاد للتشنجات ويوصى باستعماله في حالات الآم الجهاز الهضمي والمرارة والجهاز البولي والتناسلي.

**قبل القيام باستعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:**

- إذا كان لديك قد الحركه بذلك لا تستطيع أن تتحمل بعض أنواع من السكريات، استشر طبيبك قبل استعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة.
- لا تستخدم فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة في الحالات الآتية:
- أجوديوكوم (أو حد أي دواء مع مثالي في الروية).
- عدم تحمل (أي حساسية) لمنتجات الروستا و البروستا و المشعة (بولية).
- إذا كان لديك حساسية تجاه المادة الفعالة (تيمونوم ميثيل سلفات) أو تجاه أي من مكونات الدواء الأخرى.
- إذا كنت غير متأكد فأنظر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.
- توخ الحذر عند استعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة وأهم الطبيب في الحالات الآتية:

- إضطراب فيات في الروستا.
- إضطراب فيات حادة في الكلى أو الكبد.
- إضطراب فيات في القلب.
- الإتهاب الرئوي المزمن.
- إضطراب فيات الجهاز الهضمي.

**في حالة المرضي السابقين قرأتهم أو قبلي التمشط البطني:**

- إذا كان لديك قد الحركه بذلك لا تتحمل بعض أنواع من السكريات، يجب استشارة الطبيب لأن هذا الدواء يحتوي على نوعين من السكريات (اللاكتوز و السكرول).
- تعطى فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة مع الأدوية الأخرى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخرا أية أدوية أخرى بما في ذلك تلك التي حصلت عليها من وصفة طبية.
- تعطى فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة مع الطعام أو الشراب.
- لا يوجد تداخلات.
- تعطى فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة مع الأدوية العشبية.

**لا يوجد تداخلات:**

- تعطى فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية:
- تجنبي تعاطي فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية مع استشارة الطبيب.
- استشرى الطبيب قبل تناول أية أدوية أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
- تعطى فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة أثناء القيادة واستخدام الآلات:
- استعمل حذرت استنزافات في الروية تعمل من الخطر تعاطي فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

**طريقة استعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:**

- الجرعة العادية من قرصين إلى ٦ قرص يوميا.
- التزم بتعاطي الدواء طبقا للجرعة التي يصفها لك الطبيب.
- ماقا لو تعاطيت كمية من فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة أكثر مما يجب:
- أبلغ الطبيب المعالج فوراً.
- ماقا لو تعاطيت المتاح جرعة معينة من فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:
- تعاطي الجرعة التي لمستها بمجرد أن تتذكرها أو إذا كان موعد الجرعة التالية قد حان فلا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها، إما تعاطي الجرعة العادية فقط و اكمل النمام المعالج كما وصف لك الطبيب.
- ماقا لو توقفت عن استخدام فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:
- لا تتوقف عن استخدام فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة بشكل مفاجئ.
- لمزيد من المعلومات أو أية استفسارات أخرى حول استخدام فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

**الأثار الجانبية المحتملة لتعويض الجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:**

- قد يسبب استعمال فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة في ظهور بعض الأعراض الدوائية لدى بعض الأفراد لكنها لا تحدث للجميع الأقرص.
- استشر الطبيب أو لاحظت ظهور الأعراض التالية:
- جفاف بالفم.
- الإفرار الزائد للزوجة للشحلم.
- جفاف إفراز العين و إضطراب الروية.
- إضطراب فيات في القلب.
- الإسهال.
- إضطرابات التبول.
- إضطراب فيات الأضداد.
- إضطراب فيات خطيرة وخاصة عند المسنين.
- إذا لاحظت أي أعراض جانبية أخرى غير تلك المذكورة في الشرة، يرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي لإسداء النصح.

**طريقة حفظ فيسيرالجين ٥٠مجم أقرص مغلفة:**

- يحفظ المستحضر بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- لا تتعاطي المستحضر بعد انتهاء فترة الصلاحية المدونة على العبوة.
- احتفظ على الدواء، استشر الصيدلي في التخلص من الأدوية غير المرغوب في استعمالها أو متيابة الصلاحية ولا تتخلص منها عن طريق إلقائها في مياه الصرف الصحي أو في المسكبات.

**معلومات أخرى:**

- بيان التركيب:
- يحتوي كل قرص مغلف من أقرص فيسيرالجين ٥٠مجم على:
- المادة الفعالة:
- تيمونوم ميثيل سلفات ..... ٥٠مجم
- المواد غير الفعالة:
- نشاء لكتازو، سكرزو، ستيرات الماغسيوم، ثلي أكسيد السيليكون الغروي.
- طبقة التمسوة الخارجية:
- ميثيل هيدروكسي برويل، سيليولوز، بولي إيثيلين جليكول ٦٠٠٠، ثلي أكسيد التيتانيوم.
- العبوة:
- طبقة كروتون تحتوي على ٢٠ قرص مغلف في شريطين (الومبوليم في سي) كل شريط به ١٠ أقرص مغلفة مع الشرة الداخلية.

إنتاج  
شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية  
**سيديكو**  
مدينة ٦ أكتوبر - مصر  
تليفون ١١١-٢١٢-٨٧٧/٢١٢-٥٧١/٢١٢-٥٧٨/٢١٢-٥٧٥  
فاكس: ٢١٢-٧١٢

**إلى هذا الدواء**

دواء مضاد للتشنجات و مضاد لتكوين  
يحتوي على مادة الفعالة (تيمونوم ميثيل سلفات) و مواد مساعدة  
تحتفظ على الدواء بعيدا عن متناول أيدي الأطفال  
لا تتعاطي الدواء بعد انتهاء فترة الصلاحية المدونة على العبوة  
احتفظ على الدواء، استشر الصيدلي في التخلص من الأدوية غير المرغوب في استعمالها أو متيابة الصلاحية ولا تتخلص منها عن طريق إلقائها في مياه الصرف الصحي أو في المسكبات