كلاريتين أقراص ١٠ مجم

لوراتادين

إقرأ محتويات هذه النشرة بعناية قبل بدء تعاطى هذا الدواء.

إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

لمزيد من الإستفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء موصوف لك فقط فلا تشارك تعاطيه مع الآخرين فقد يضرهم حتى لو تشابهت أعراض المرض.

يجب عليك التحدث إلى طبيبك إذا كنت لا تشعر بتحسن أو تفاقمت حالتك بعد ١٤ يوم من التعاطى.

تحتوى هذه النشرة على :

ما هو كلاريتين وما هى دواعي استعماله.

قبل القيام باستعمال كلاريتين.

طريقة استعمال كلاريتين.

الأثار الجانبية المحتملة لكلاريتين.

طريقة تخزين كلاريتين.

محتويات العبوة و معلومات أخرى.

ما هو كلاريتين وما هى دواعي استعماله:

يحتوي كلاريتين أقراص على مادة فعّالة تُسمى لوراتادين والتي تنتمي إلى فئة من الأدوية تُسمى "مضادات الهيستامين".

يُساعد كلاريتين على تقليل أعراض الحساسية عن طريق إيقاف آثار مادة "الهيستامين" التي يتم إنتاجها في الجسم عندما تُعاني من حساسية تجاه شيء ما.

دواعى استعمال كلاريتين أقراص :

يخفف كلاريتين من الأعراض المصاحبة لالتهاب الأنف التحسسي (مثل: العطس، أو حدوث سيلان، أو حكة بالأنف، وحُرقة أو حكة بالعين في البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين، وتزيد أوزانهم عن ٣٠ كجم).

يُمكن استخدام كلاريتين أيضًا للمساعدة على تخفيف أعراض الأرتكاريا (حكة واحمرار وعدد وحجم مواضع الإصابة بالشري).

يستمر تأثير كلاريتين لمدة يوم كامل و يساعدك على مواصلة نشاطاتك اليومية المُعتادة، كما يساعد على النوم.

قم باستشارة الطبيب إذا استخدمت كلاريتين لمدة ١٤ يوم و لم تشعر بتحسن أو تطورت الأعراض بشكل أسوأ

قبل القيام باستعمال كلاريتين

لا تستعمل كلاريتين إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المادة الفعالة (لوراتادين) أو أيٌ من مكونات الدواء الأخرى

تحذيرات و احتياطات:

إستشر الطبيب أو الصيدلى قبل تناول كلاريتين فى الحالات الاتية:

إذا كنت تُعاني من أمراض بالكبد.

إذا كان من المُقرر أن تخضع لأي اختبارات جلدية للكشف عن أمراض الحساسية فلا تتناول كلاريتين لمدة يومين قبل الخضوع لهذه الإختبارات لأن ذلك قد يُؤثر على نتائج الاختبار.

إذا انطبق عليك أى مما سبق (أو لم تكن متأكداً ما إذا كان ينطبق عليك أم لا)، إستشر الطبيب أو الصيدلى قبل تناول كلاريتين.

الأطفال :

لا تستعمل كلاريتين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ إلى ١٢ سنة وتقل أوزانهم عن ٣٠ كجم (بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ إلى ١٢ سنة و تقل أوزانهم عن ٣٠ كجم هناك تركيبات أخرى أكثر ملاءمة لهؤلاء الأشخاص من مستحضر كلاريتين).

استعمال كلاريتين مع أدوية أخرى:

إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخرًا أيّة أدوية أخرى بما في ذلك تلك التي حصلت عليها دون وصفة طبية.

إستعمال كلاريتين أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية:

لا تتناولي كلاريتين اثناء الحمل و كذلك أثناء الرضاعة الطبيعية و ذلك لأن المادة الفعالة (لوراتيدين) تنتقل من خلال لبن الأم الى الرضيع.

إستعمال كلاريتين أثناء القيادة واستخدام الآلات:

إذا تم تناول كلاريتين بالجرعات الموصى بها فانه من غير المتوقع أن يسبب النعاس أو قلة الإنتباه لذلك من النادر أن يؤثر استعمال كلاريتين على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

يحتوي كلاريتين على لاكتوز:

يحتوي كلاريتين على سكر اللاكتوز؛ لذلك استشر الطبيب قبل تناول كلاريتين إذا كان الطبيب قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع من السكريات

طريقة استعمال كلاريتين أقراص:

قم باستعمال كلاريتين بالطريقة الموصوفة فى النشرة أو كما أخبرك الطبيب أو الصيدلى، قم بمراجعة الطبيب أو الصيدلى فى حالة عدم تأكدك من طريقة الاستعمال.

ملحوظة: خط التقسيم الموجود بالقرص الهدف منه فقط هو مساعدتك على كسر القرص إذا واجهتك صعوبة في ابتلاعه كاملا.

الجرعة :

بالنسبة للبالغين او الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ عاما:

قرص واحد يومياً مع كوب من الماء سواء مع الطعام أو بدونه.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ إلى ١٢ عام:

إذا كان وزن الجسم أكبر من ٣٠ كجم:

قرص واحد يوميا مع كوب من الماء سواء مع الطعام أو بدونه.

إذا كان وزن الجسم ٣٠ كجم أو أقل:

لا تستخدم كلاريتين، هناك مستحضرات أخرى أكثر ملائمة لهؤلاء الأطفال.

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين :

لا يوصى باستعمال كلاريتين مع هؤلاء الأطفال.

البالغون و الأطفال (الذين تزيد أوزانهم عن ٣٠ كجم) الذين يعانون من مشاكل بالكبد:

قرص واحد مرة واحدة كل يومين مع كوب من الماء، و مع ذلك تحدث الى طبيبك أو الى الصيدلي قبل تناول كلاريتين.

ماذا لو تعاطيت جرعة أكبر من كلاريتين :

لا يتوقع حدوث مشاكل خطيرة فى حالة تناول جرعة أكبر من الجرعة المقررة من كلاريتين، و مع ذلك فقد تصاب بصداع، أو سرعة ضربات القلب، أو شعور بالنعاس. اتصل بالطبيب أو الصيدلى على الفور فى حالة حدوث ذلك.

ماذا لو نسيت تعاطى جرعة من كلاريتين :

إذا نسيت أن تتناول الجرعة فى موعدها فتناولها بمجرد أن تذكرك لها، ثم استمر في تناول المستحضر كالمعتاد.

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التى أغفلتها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية المحتملة لمستحضر كلاريتين.

قد يتسبب استعمال كلاريتين فى ظهور بعض الأعراض الجانبية لبعض و ليس كل المرضي و ذلك مثله مثل باقى الأدوية.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها:

في البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ١٢عامًا هي:

- نعاس.
- صداع.
- زيادة الشهية.
- صعوبة النوم.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ إلى ١٢ عامًا هي:

- صداع.
- عصبية.
- تعب.

هناك بعض الآثار الجانبية النادرة جداً (قد تؤثر على شخص واحد من كل ١٠٠٠٠ شخص) و التى تم الابلاغ عنها أثناء تسويق مستحضر كلاريتين و تشمل:

تفاعلات حساسية شديدة.

- دوخة.
- سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب.
- غثيان.
- جفاف الفم.
- تهيُج المعدة.
- مشاكل بالكبد.
- تساقط الشعر.
- طفح جلدي.
- تعب.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا أصبت بأية آثار جانبية أبلغ الطبيب أو الصيدلي ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة.

طريقة تخزين كلاريتين:

- يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين ٢ إلى ٣٠°م.
- يحفظ بعيداً عن الرطوبة.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الشريط يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت وجود أي تغيُر في شكل الأقراص.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية. إستشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستُساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

محتويات العبوة و معلومات أخرى .

محتويات كلاريتين :

المادة الفعالة: لوراتادين.

يحتوي كل قرص على لوراتادين ١٠ مجم.

المواد غير الفعالة:

لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا الذرة، ستيرات الماغنسيوم.

الشكل الصيدلى لمستحضر كلاريتين أقرص:

قرص بيضاوي الشكل ذو لون أبيض يميل إلى الاصفرار مع علامة زجاجة و وعاء، وخط تقسيم ورقم "١٠" على أحد الجانبين.

العبوة:

علبة كرتون بحجم ٢٠ قرص مع النشرة الداخلية.

مالك حق التسويق:

ميرك شارب آند دوم ، شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، ٥ كلوس دو لينكس، ١٢٠٠ بروكسل، بلجيكا.

آخر تاريخ اعتماد لهذه النشرة كان في {٢٠١٣/١٢}.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلى هما الخبيران بالدواء و نفعه و ضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

مجلس وزراء الصحة العرب و إتحاد الصيادلة العرب

SEDICO
سيديكو

إنتاج
شركة الوجه القبلى للصناعات الدوائية
سيديكو
مدينة ٦ أكتوبر - مصر
تليفون ، ٣٨٣٣١٥٩٠/٩١/٩٢/٩٤ـ فاكس، ٣٨٣٣١٥٩٢

MA0010000006000 08/14