

# كونكور® ٥ / كونكور® ١٠

## المادة الفعالة: بيسوبرولول

### بيان التركيب

**كونكور® ٥**: كل قرص مغطى يحتوي على ٥ مجم بيسوبرولول فيوماريت (١:٢)  
**كونكور® ١٠**: كل قرص مغطى يحتوي على ١٠ مجم بيسوبرولول فيوماريت (١:٢)

### دواعى الإستعمال

- \* ارتفاع ضغط الدم
- \* قصور الشريان التاجى والذبحة الصدرية
- \* قصور القلب المزمن المستقر

### دواعى عدم الإستعمال

- يجب عدم إستعمال **كونكور®** فى حالات:
- \* قصور عضلة القلب الغير معالج.
- \* إحتشاء عضلة القلب الحديث.
- \* الصدمة القلبية.
- \* حصار القلب من الدرجة الثانية والثالثة.
- \* النبض البطئ ( إذا قل عن ٥٠ نبضة فى الدقيقة).

### ملحوظة:

أثبتت التجارب عدم تأثير الدواء على القدرة الجنسية والإخصاب.

### الأثار الجانبية

خاصة فى بداية العلاج قد يحدث شعور بالإجهاد، الصداع الخفيف، الأرق، وجميع هذه الأعراض بسيطة وتزول خلال ١-٢ أسبوع من بداية العلاج. وفى بعض الحالات يؤدى العلاج إلى برودة الأطراف والشعور بتعب فى العضلات وقلة الدموع (لمراعاة ذلك بالنسبة لمن يستخدم عدسات لاصقة).

### تحذير

يجب وقف الدواء تدريجياً قبل الوضع بمدة ٧٢ ساعة بعد إستشارة الطبيب المعالج لإحتمال تأثيره على ضغط دم الجنين. وإذا لم تتمكن الحامل من هذا، يجب ملاحظة الجنين لمدة ٤٨-٧٢ ساعة بعد الولادة.

### التداخلات الدوائية

- \* يزيد تأثير **كونكور®** على ضغط الدم إذا تم تناوله مع أدوية الضغط الأخرى.
- \* يجب إخطار أخصائى التخدير أن المريض يستعمل **كونكور®** قبل إجراء العمليات الجراحية.

### الجرعات

يبدأ العلاج بجرعات منخفضة من المستحضر ثم تزداد تدريجياً. وفى جميع الحالات يجب أن يكون ضبط الجرعات مناسباً لكل حالة على حدة ويؤخذ فى الإعتبار سرعة النبض ونجاح العلاج.

الجرعة فى حالات ضغط الدم المرتفع أو حالات قصور الشريان التاجى أو الذبحة الصدرية: قرص واحد من **كونكور® ٥** مجم يومياً. إذا كانت هذه الجرعة غير كافية تزداد إلى قرص واحد من **كونكور® ١٠** مجم (أو ٢ قرص من كونور ٥ مجم) مرة واحدة يومياً. ويمكن زيادة الجرعة فى الحالات الإستثنائية فقط.

الجرعة فى حالات قصور القلب المزمن المستقر:

يبدأ العلاج بجرعة ١,٢٥ مجم بيسوبرولول يومياً لمدة أسبوع على أن تزداد إلى ٢,٥ مجم يومياً لمدة أسبوع ثم ٣,٧٥ مجم يومياً لمدة أسبوع ثم إلى ٥ مجم يومياً لمدة ٤ أسابيع ثم ٧,٥ مجم يومياً لمدة ٤ أسابيع ثم إلى ١٠ مجم يومياً جرعة دائمة.

وعند كل زيادة للجرعة يجب ملاحظة التحمل الجيد للجرعة السابقة أولاً.

يتم بلع القرص مع بعض السوائل ويستحسن فى الصباح إما على معدة خاوية أو مع الفطور.

وعموماً يجب تحديد الجرعة دائماً حسب الحالة ويؤخذ فى الإعتبار سرعة النبض ونجاح العلاج.

### مدة العلاج

عموماً العلاج بال**كونكور®** طويل الأمد، ويجب عدم تقليل الجرعة أو وقف العلاج إلا حسب توجيهات الطبيب.

يجب عدم وقف العلاج فجأة ولكن بالتدرج وخاصة لمرضى الشرايين التاجية.

يجب عدم إستعمال الدواء عند إنتهاء تاريخ الصلاحية

### العبوة

**كونكور® ٥**: عبوة ٢٠ و ٣٠ قرص مغطى

**كونكور® ١٠**: عبوة ٢٠ و ٣٠ قرص مغطى

### إن هذا الدواء

- \* الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
  - \* إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال وتعليمات الصيدلانى الذى صرفها لك.
  - \* فالطبيب والصيدلانى هما الخبيران بالدواء وينفضه وضرره.
  - \* لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
  - \* لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال



V07-3/4/2014

شركة ميرك، دارمشتات، ألمانيا.

إنتاج  
**شركة أمون للأدوية**  
 مدينة العبور، القاهرة، مصر.  
 بتصريح من:

