

كونكور كور ٢,٥ ملليجرام

المادة الفعالة: بيسوبرولول فيوماريت (١:٢)

التركيب

كل قرص مغلف يحتوي على ٢,٥ ملليجرام بيسوبرولول فيوماريت (١:٢) مواصفات القرص، قرص مغلف أبيض اللون تقريبا على شكل قلب به حز في الوسط لإمكانية تقسيمه.

الخاصية الدوائية

إن هذا المقار عبارة عن مثبط البيتا الخاص بالقلب.

دواعي الإستعمال

لمعالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة المستقرة (قصور عضلات القلب) سواء المتوسطة أو الشديدة في حالات محدودة عمل إنقباض البطيني (القذف الجزئي $\geq 25\%$ ، محدد بواسطة تخطيط صدى القلب). بالإضافة إلى مدرات البول ومثبطات انجيوتنسين الانزيمية المحولة، و إذا تطلب الأمر جلوكوسيدات القلب.

موانع الإستعمال

متى يمنع إستعمال كونكور كور ٢,٥ ملليجرام؟

يمنع إستعمال كونكور كور ٢,٥ ملليجرام في الحالات التالية:

- في حالة قصور عضلات القلب الحاد (قصور القلب) أو أثناء سوء حال قصور القلب.
- في حالة الصدمة (الصدمة القلبية) الناتجة عن خلل وظيفي في القلب.
- في حالة وجود خلل حاد في التوصيل الأذيني البطيني في القلب (من الدرجة الثانية والثالثة) بدون متظم ضربات القلب
- في حالة نبض القلب البطيء جدا (أقل من ٥٠ نبضة في الدقيقة) قبل البدء في العلاج.
- في حالة الإنخفاض الشديد في ضغط الدم (ضغط إنقباضي أقل من ١٠٠ ملليمتر زئبق)
- في حالة وجود مرض الربو الشعبي الحاد أو داء الرئة الانسدادي المزمن الشديد.
- في المراحل المتأخرة من أمراض الانسداد الطرفي الشرياني أو التشنجات الشريانية
- في حالة الحساسية تجاه مادة بيسوبرولول.

متى يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال كونكور كور ٢,٥ ملليجرام؟ يسمح في الحالات التالية بتناول كونكور كور ٢,٥ ملليجرام تحت شروط محددة وبحذر شديد. يرجى إستشارة الطبيب في هذا الخصوص:

- التشنح الشعبي • المعالجة بواسطة إستنشاق مواد مخدرة أثناء العمليات الجراحية.
- مرض السكر إذا كان مصحوبا بتقلبات كبيرة في نسبة جلوكوز الدم. • الصوم الصائم.
- الاضطرابات البسيطة في التوصيل الأذيني البطيني (من الدرجة الأولى).
- اضطرابات في تدفق الدم من وإلى عضلات القلب نتيجة إنقباض في الأوعية الدموية الناتجة. • مرض الانسداد الشرياني الطرفي (احتمال لزيادة الألم خاصة عند بداية العلاج). ينبغي على المرضى الذين لهم علاقة مباشرة أو متوارثة ببدء الصدفية تناول مثبطات البيتا (مثل كونكور كور ٢,٥ ملليجرام) فقط بعد تدقيق تام بمدى النفع والضرر المترتبان عليه.

ما الذي يجب مراعاته من قبل السيدات الحوامل والأمهات الحاضنات؟

ينبغي عدم إستعمال كونكور كور ٢,٥ ملليجرام أثناء فترة الحمل إلا بعد تدقيق تام بمدى النفع والضرر المترتبان عليه وذلك من قبل الطبيب المعالج. لم يعرف حتى الآن إن كانت مادة البيسوبرولول تنتقل مع لبن الأم أم لا. لذا ينصح بعدم الرضاعة خلال فترة تناول كونكور كور ٢,٥ ملليجرام.

ما الذي يجب مراعاته لدى الأطفال وكبار السن من المرضى؟

ينبغي عدم إستعمال كونكور كور ٢,٥ ملليجرام لعلاج الأطفال لعدم توافر الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال. أما عن المرضى كبار السن فليس من الضروري تعديل الجرعة. وفيما يتعلق بالمرضى الذين يعانون من قصور قلبي وتزيد أعمارهم عن ٨٠ عاما فلم تتوفر بعد الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال.

تنبيهات وتحذيرات الإستعمال:

ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها؟

تتطلب معالجة قصور عضلات القلب بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام المراقبة الطبية المنظمة خاصة مع بداية العلاج. في حالات الربو الشعبي التي قد تصاحب مرضى القلب ينبغي تناول علاج لتوسيع الشعب الهوائية إلى جانب كونكور كور ٢,٥ ملليجرام. أما في الحالات التي قد تظهر بها زيادة في مقاومة القنوات التنفسية لدى مرضى الربو الشعبي فيجب زيادة الجرعة الموصى لتسبب الهوائية

تحديد الجرعة ومدة الإستعمال

تتبع تعليمات الجرعة لمستحضر كونكور كور ٢,٥ ملليجرام بعناية ما لم يصف الطبيب غير ذلك - وإلا فإن يؤدي المفعول المناسب ما هي الكمية التي ينبغي تناولها من كونكور كور ٢,٥ ملليجرام وما هو عدد مرات تناول؟ ينبغي أن يكون الشخص الذي سوف يعالج بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام والذي يعاني من قصور مزمن لعضلات القلب لم يحدث له أي تدهور حاد خلال الأسابيع الستة الأخيرة. ينبغي أن يكون المريض قد حصل مقدما على علاج بواسطة مدرات البول ومثبطات انجيوتنسين الانزيمية المحولة بجرعة مناسبة (أو بواسطة علاج لتوسيع الأوعية الدموية في حالة عدم القدرة على تحمل مثبطات انجيوتنسين الانزيمية المحولة). وإذا تطلب الأمر العلاج بجلوكوسيدات القلب.

ويجب أن تكون المعالجة الاساسية بهذه الأدوية ثابتة إلى أبعد حد ممكن في الأسبوعين الأخيرين وذلك قبل البدء في العلاج بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام. يبدأ العلاج بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام بجرعة صغيرة يتم رفعها تدريجيا. قد يكون كونكور كور ٢,٥ ملليجرام كاف للمرحلة الأولى من العلاج وإضا لمعالجة المعالجة الدوائية لدى مجموعة من المرضى. ينصح بتناول الجرعات وزيادتها على الشكل التالي:

١,٢٥ ملليجرام بيسوبرولول (أي ما يعادل نصف قرص كونكور كور ٢,٥ ملليجرام) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع. إذا كانت هذه الجرعة جيدة التحمل تزداد الجرعة إلى ٢,٥ ملليجرام بيسوبرولول (أي ما يعادل قرص واحد كونكور كور ٢,٥ ملليجرام) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع. إذا كانت هذه الجرعة جيدة التحمل تزداد الجرعة إلى ٣,٧٥ ملليجرام بيسوبرولول (أي ما يعادل واحد ونصف قرص كونكور كور ٢,٥ ملليجرام) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع.

إذا كانت هذه الجرعة جيدة التحمل تزداد الجرعة إلى ٥ ملليجرام بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة ٤ أسابيع.

إذا كانت هذه الجرعة جيدة التحمل تزداد الجرعة إلى ٧,٥ ملليجرام بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة ٤ أسابيع.

إذا كانت هذه الجرعة جيدة التحمل تزداد الجرعة إلى ١٠ ملليجرام بيسوبرولول مرة واحدة يوميا بجرعة دائمة.

أما في حالة عدم تحمل أي من الجرعات السابقة ينبغي العودة إلى الجرعة الأقل بجرعة دائمة بواسطة الطبيب المعالج.

كيف ومتى ينبغي تناول كونكور كور ٢,٥ ملليجرام؟

يتم تناول أقراص كونكور كور ٢,٥ ملليجرام في الصباح قبل أو أثناء أو بعد تناول الإفطار دون مضغها مع قليل من السوائل.

ما هو طول المدة الزمنية التي ينبغي فيها تناول كونكور كور ٢,٥ ملليجرام؟

تعتبر معالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة المستقرة بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام بشكل عام معالجة طويلة الأمد. يمنع منعا باتا تغيير مقدار الجرعة دون توجيه مسبق من قبل الطبيب المعالج. كما يجب عند إنهاء العلاج بواسطة كونكور كور ٢,٥ ملليجرام أن يتم خفض الجرعة تدريجيا على طريق إنهاؤها (على سبيل المثال تناول نصف الجرعة أسبوعيا). يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور بصورة فجائية لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تزداد لتقصير القلب الإحتقاني.

ملاحظات ومعلومات تتعلق بصلاحية الدواء: تاريخ إنتهاء صلاحية هذا الدواء مطبوع على العبوة الخارجية وعلى حافة كل شريط من أشرطة الاقراص. يمنع استخدام هذه العبوة بمجرد إنتهاء صلاحيتها.

كيفية تخزين كونكور كور ٢,٥ ملليجرام؟ يحفظ في مكان درجة حرارته أقل من ٢٥ درجة مئوية.

العبوة:

كونكور كور ٢,٥ ملليجرام : عبوة بها ٣٠,٢٠ قرص مغلف.

تنبيهات خاصة:

(إن هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون مراجعة الطبيب.
- مجلس وزراء الصحة العرب.
- إتجاد الصيدالة العرب.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

إنتاج

شركة أمون للأدوية

مدينة العبور، القاهرة، مصر.

بتصريح من:

شركة ميرك، دارمشتات، ألمانيا.



V06-19/3/2014

