

## موفيجيت

إيتوبرايد هيدروكلوريد

شركة المهن الطبية للأدوية

موفيجيت ٥٠ مجم أقراص مغلفة

إيتوبرايد هيدروكلوريد

التركيب:

المواد الفعالة:

يحتوى كل قرص مغلف على إيتوبرايد هيدروكلوريد ٥٠ مجم.

المواد الغير فعالة:

قلب القرص: لانتوز، ميكروكريستالين سيلولوز، بوفيدون، كروسكارميلوز صوديوم، ثنائي أكسيد السيليكون الغروي، ستيرات الماغنيسيوم.

غطاء القرص: هيبرميلوز، بولى إيثيلين جليكول، بودرة تلك، ثنائي أكسيد التيتانيوم ومضاد للرغوة.

الشكل الصيدلي: أقراص مغلفة.

التأثير الفارماكولوجي:

يعمل مستحضر موفيجيت على تنشيط وتنظيم حركية القناة الهضمية والأمعاء عن طريق تأثير مزدوج يجمع بين زيادة إفراز مادة أسيتيل كولين في القناة الهضمية من خلال تثبيط مستقبلات دوامين (٢د) بالإضافة إلى زيادة فاعلية الأسيتيل كولين بواسطة تثبيط إنزيم أسيتيل كولين إستيريز.

الحركية الدوائية:

يتم امتصاص إيتوبرايد سريعا وبدرجة كاملة تقريبا من لقناة الهضمية. الإتاحة الحيوية المقارنة تم حسابها أنها تمثل ٦٠% وذلك لتأثير أيضا الكبد الأول ولا تتأثر الإتاحة الحيوية للقرص بالأكل. يرتبط إيتوبرايد ببروتينات الدم بنسبة ٩٦% ويتم الأيض في الكبد بدرجة كبيرة، وتبلغ فترة العمر النصفى حوالى ٦ ساعات. إن ناتج الأيض الأساسى في الإنسان هو (إن-أوكسيد) ولقد وجد الأوكسيد في الإخراج البولى بنسبة ٧٥,٤% مقارنة بـ ٣,٧% لمادة الإيتوبرايد.

دواعى الاستخدام:

- خلل فى الوظائف الحركية والذى ينتج عنه نقص فى الحركة الدودية والدفاعة والركود فى محتويات المعدة والأمعاء.
- الإحساس بالامتلاء الذى يتميز بالشبع المبكر - عدم القدرة على تناول الطعام بصورة طبيعية مع الانتفاخ والتجشؤ، كذلك فقدان الشهية.
- للطعام مع الغثيان والقيء.
- عسر الهضم الغير مصحوب بقرحة المعدة والمصاحب لألم فى فم المعدة.

- ضعف حركة المعدة بسبب علة ذاتية أو المصاحبة للاعتلال العصبى فى مرضى السكر.

- الارتجاع فى المرضى والأعراض المصاحبة له من التهاب فى المريء - والتجشؤ المستمر أو القيء.

- القولون العصبى والمصحوب بتأخر عملية التفريغ المعوى والإمساك المزمن.

الجرعة والاستعمال:

قرص (٥٠ مجم) قبل الأكل ٣ مرات يوميا. ويمكن تقليل الجرعة عند الحاجة طبقا لسن المريض والأعراض المرضية.

موانع الاستعمال:

- فرط الحساسية لمادة إيتوبرايد أو أى مكون من مكونات الدواء.
- حالات النزيف المعوى أو انتسداد القناة الهضمية أو ثقب جدار الأمعاء.

## الأعراض الجانبية:

الأعراض الجانبية الآتية محتملة الحدوث فى المرضى عند تناولهم لقرص إيتوبرايد هيدروكلوريد:

- أعراض خاصة بالدم والنظام الليمفاوى: نقص الكرات البيضاء والصقائح الدموية.

- أعراض خاصة بنظام المناعة فى الجسم: تفاعل تأقى (تفاعل حساسية شديدة).

- أعراض خاصة بالعدد: زيادة فى كمية البرولاكتين وزيادة حجم الثدي.

- أعراض خاصة بالجهاز العصبى: الدوخة والصداع والرعشة.

- أعراض خاصة بالجهاز الهضمى: إسهال أو إمساك، غصص، زيادة فى إفراز اللعاب، وشعور بالرغبة فى القيء.

- أعراض خاصة بالكبد والمرارة: الصفراء.

- أعراض خاصة بالجلد: طفح جلدى واحمرار ورغبة فى الهرش.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

- قد تقلل المستحضرات المضادة للأسيتيل كولين من فاعلية مستحضر موفيجيت.

- لا يوجد تفاعلات مع ارفارين - دايازيبام - ديكوفيناك - نيفيديبين - نيكاربيدين.

ولأن الإيتوبرايد له تأثير حركى على الجهاز الهضمى فبالتالى يمكن أن يؤثر على امتصاص الأدوية التى يتم تعاطيها مترامنة مع الإيتوبرايد عن طريق الفم.

ويجب الاحتياط الخاص عند تعاطى الإيتوبرايد مع الأدوية ذات النطاق العلاجى الضيق والأدوية طويلة المفعول والمكسوة بكسوة معوية.

إن الأدوية المضادة للتقرحات لا تؤثر على مفعول الإيتوبرايد مثل سيميتيدين، الرانيتيدين، النيترونون والسيتراكست.

الاستعمال فى الحمل والرضاعة:

- لم يتم التأكد من سلامة استخدام إيتوبرايد هيدروكلوريد فى الحمل والرضاعة.

الاحتياطات والتحذيرات:

- لم يتم التأكد من سلامة استخدام إيتوبرايد هيدروكلوريد فى الأطفال أقل من ١٦ سنة.

- فى حالة المرضى كبار السن: يتم ملاحظة حالتهم الصحية أثناء اعطاء إيتوبرايد هيدروكلوريد.

- إن مادة الإيتوبرايد تزيد من فاعلية الأسيتيل كولين ولذلك يمكن أن يحدث تأثيرات كولينيبرجية.

العوة والتخزين:

- عبوة كرتون بها ٣ شرائط الومنيوم يحتوى كل شريط على ١٠ أقراص مغلفة + نشرة داخلية.

التخزين:

- تحفظ الأقراص عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م فى مكان جاف.

تعليمات خاصة بالمريض:

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

- يجب تناول هذا الدواء قبل الوجبات.

- تناول الدواء مع كمية كافية من الماء.

إنتاج:

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر

تاريخ الإصدار: ٢٠١٣/٤/٢٠، تاريخ المراجعة: ٢٠١٣/٩/١٦