



# ينيدياب كارلواربا

مستحضر جديد لعلاج حالات السكر عن طريق الفم يتميز بخاصية جيدة لتخفيض نسبة السكر مع سمية قليلة جدا . و المادة الفعالة : الجلبيبيزيد نتاج أبحاث عديدة أجريت في معهد أبحاث كارلواربا وتعتبر تقدما مفيدا لعلاج مرضى السكر .

فارماكو لوجية الحيوانية:

تحت الأبحاث الفارماكولوجية العديدة أن جلبيبيزيد يقلل نسبة السكر في الدم عند الحيوانات التي بها نسبة السكر طبيعية بينما تزداد في السكر المحذرة تجريبيا في الحيوانات . وضع من التجارب العملية أن الدواء يؤثر أساسا عن طريق تثبيط إنزيم البنكرياس (الببتا) لإفراز الأنسولين .

تت الفحوص العملية التي أجريت على أنواع مختلفة من الحيوانات ولمدة طويلة أن المينيدياب ليس له سمية تذكر .  
فارماكو لوجية الإكلينيكية:

نص المينيدياب كلية وبسرعة من الأمعاء مؤكدا مفعولا سريعا وثابتا للدواء . تنخفض نسبة السكر في الدم بعد نصف ساعة من أول المينيدياب قبل الأكل وتضبط زيادة السكر دون حدوث خطورة نقص السكر نتيجة تراكم الدواء .

استخدام الإكلينيكي:

تت التجارب الإكلينيكية التي أجريت على نطاق واسع في دول عديدة أمان وفعالية المينيدياب في علاج مرضى السكر عند البالغين احتفاظ المينيدياب بنفس درجة تأثيره وفعالته وقوة تحملته حتى بعد سنوات عديدة من استخدامه .

اعى الاستعمال:

رث السكر عند البالغين ، الذي لا يتأثر بربيم الأكل وحده .

اهى الاستعمال:

ستخدم المينيدياب مثله كباقي مركبات السلفنيل يوريا في الحالات الآتية:

الات السكر المصحوبة بوجود مواد حمضية وكتونية والتي تحتاج علاج الأنسولين .  
غيبوبة السكر ، الحمل ، في حالات نقص وظائف الكلى والكبد ، نقص إفراز الغدة فوق الكلوية ، الأشخاص ذو الحساسية للدواء .  
جدى استعمال السلفنيل يوريا في حالات السكر الكامنة أو مقدمة الإصابة بالمرض .

جرعة وطريقة الاستعمال:

دد الجرعة لكل مريض حسب الاختبارات الدورية لنسبة السكر في الدم والبول . تنخفض نسبة السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي تعطى المينيدياب بجرعة تتراوح بين ٢,٥ إلى ٢٠ ملليجرام (من ٠,٥ إلى ٤ أقراص يوميا) .

ضى يعالجون بالمينيدياب لأول مرة ، يبدأ الدواء بجرعة تتراوح بين ١,٠ - ٠,٥ قرص يوميا . وبعد ذلك تزداد الجرعة إذا احتاج الأمر إلى يرجع المريض لحالته الطبيعية .

ضى يعالجون عن طريق الفم بمحضات السكر في الدم : تحدد الجرعة تبعاً لحالة الأيض عند كل مريض ، ونوع العلاج الذي استعمل قبل - عادة يفضل بدء العلاج بجرعة صغيرة ثم تزداد تدريجياً حتى تصل إلى توازن مقبول . هؤلاء المرضى يحتاجون إلى عناية خاصة وأحياناً يفضل أن تترك فترة ما بين العلاج السابق وبداية العلاج بالمينيدياب .

ضى يعالجون بالأنسولين : يوقف الاستخدام اليومي للأنسولين في بعض الحالات وذلك عندما يضاف المينيدياب في نظام العلاج ، أنه يجب فحص نسبة السكر في الدم باستمرار وذلك خلال الفترة الأولى من العلاج .

ب تقسيم الجرعة اليومية للمينيدياب على مرتين أو أكثر وتعطى مباشرة قبل الوجبات الأساسية .

مذنبات:

فى استعمال الأدوية التي تنتمي إلى مجموعة السلفنيل يوريا فقط في حالات السكر عند البالغين والمصابين بأعراض المرض غير مصحوبة بوجود المواد الحمضية الكيتونية والتي لا تحتاج العلاج بالأنسولين .

انخفاض نسبة السكر في الدم عن معدلها الطبيعي (انظر الأعراض الجانبية) تستخدم الكربوهيدرات (مثل السكر) ونادراً في بعض حالات الخطيرة التي تؤدي إلى الغيبوبة يعقن مطول الجلوكوز بنطء في الوريد أما في حالات الإصابة بالأمراض المعدية أو الحصى العمليات الجراحية فسوف يحتاج استخدام الأنسولين وقتاً للاحتفاظ بالأبيض طبيعي .

الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث ما يشبه تفاعلات الاتايبيوز في المرضى الذين يتعاطون الكحول ويعالجون بالسلفنيل يوريا .

تأثير السلفنيل يوريا المخفض لسكر الدم بواسطة ديكومارون ومشتقاته . مثبطات للثومونين أو كسديز سلفوناميد . فينيل تازون ومشتقاته ، كلورامينيكول ، سيكوفوسفيد ، بروبانسيد ، فينيراميدول والسالييلات .

مل أن يقل تأثير المينيدياب المخفض للسكر عند استعماله في نفس الوقت مع الأدرينالين ، الكورتيكوستيرويدات ، أقراص منع حمل ، السيازيد المدر للبول ، كما يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند استعماله مع البتابلوكيزر .

ظ بعيداً عن تناول الأطفال .

حقياطات :

على المرضى إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة بالنسبة لتقليم الطعام والجرعة والعلاج ويجب إخطار الطبيب فوراً في حالة ر الأعراض الأولية لهبوط السكر في الدم مثل الصداع ، الرعشات... إلخ .

مرض الجانبية:

رأ ما تحدث أعراض إنقاص السكر في الدم وخاصة عند الضعفاء والمرضى المسنين بعد بذل مجهود غير عادي أو عدم تنظيم في تناول المشروبات الروحية وفي حالة نقص وظائف الكلى والكبد (انظر التحذيرات) ونادراً ما يحدث اضطرابات معدية أو صداع غالباً مرتبطة بالجرعة وتختفي طبيعياً بتقليلها إلى الحد الذي يؤدي إلى احتفاظ بأبيض متوازن كما نادراً ما يحدث أعراض حساسية الجلد تزول باستمرار العلاج .

ب -

٣٠ قرصاً بكل قرص ٥ مجم جلبيبيزيد .

إنتاج : شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)

الجيزة ج ٥م - س٥ ١٩٧١٧

بتمس بح من : فإ، مبتالبا كا، لها، با ابطالبا