

ميوكو[®]

ممتد المفعول

(حبيبات أمبروكسول هيدروكلوريد)
كبسولات

الأعراض الجانبية:

في بعض الحالات النادرة قد يحدث ألم في المعدة وإسهال وطفح جلدي.

الجرعة والتعاطى:

للكبار كبسولة واحدة يومياً بعد الأكل إما في الصباح أو بعد الظهر مع كمية كافية من الماء. على أن يستمر العلاج إلى أن يتم الشفاء وإذا استمر العلاج أكثر من ٢ - ٣ أسابيع فيؤخذ رأي الطبيب.

حركية الدواء:

- تصل نصف حياة أمبروكسول بالبلازما في المتوسط إلى ٨ ساعات.
- تصل قمة تركيزه بالبلازما بعد ٤ ساعات من التعاطى ويقل هذا التركيز تدريجياً في البلازما مستغرقاً مدة أطول.
- ويطرح كلية عن طريق الكلية.

طريقة التخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م، في مكان جاف.

المبوة:

علبة بها ٢٠ كبسولة.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

ميوكو[®]

ممتد المفعول

(حبيبات أمبروكسول هيدروكلوريد)
كبسولات

التركيب:

تحتوى كل كبسولة على :
أمبروكسول هيدروكلوريد

٧٥ مجم

الخواص:

تتميز كبسولات ميوكو ممتد المفعول بفعاليتها السريعة في تهدئة الإضطرابات الشعبية حيث تذيب المخاط فتقلل من لزوجه وتساعد على طرده مما يحسن من حالة التنفس ويعيده إلى الحالة الطبيعية. كذلك تساعد كبسولات ميوكو ممتد المفعول على حماية الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي.

ومن المؤكد أن كبسولات ميوكو ممتد المفعول يتحملها المريض بطريقة ممتازة.

دواعى الإستعمال:

- الحالات الحادة والمزمنة لأمراض الجهاز التنفسي التي تكون مصحوبة بوجود مخاط لزج مثل:
التهاب الشعبى المزمن، الإلتهابات الشعبية مثل الربوية، الربو الشعبى، وتوسع الشعب المرضى.
- كذلك ثبت أن كبسولات ميوكو ممتد المفعول تذيب وتطرد المخاط عند حدوث الإلتهاب البلعومى الأنفى.

موانع الإستعمال:

- فى المرضى ذوى الحساسية لمادة أمبروكسول.
- مع أن الدراسات التى أجريت على حيوانات المعامل أثبتت عدم إلحاق أى ضرر بالأجنة حتى مع جرعات كبيرة إلا أننا ننصح بعدم إعطاء الدواء فى فترة الثلاث أسابيع الأولى للحمل إلا بناء على أوامر الطبيب.