

# نوقا - سسى - إن أقراص

( باراسيتامول ، كلورفينيرامين مالثات ، سودوفينيرين هيدروكلوريد ، كلفين )



التركيب :  
يحتوي كل قرص على:  
المواد الفعالة:  
باراسيتامول ٤٥٠ مجم  
كلورفينيرامين مالثات ٤٠ مجم  
سودوفينيرين هيدروكلوريد ٦٠ مجم  
كلفين ٤٠ مجم  
مشتقات السيلينيوم - ٤٠٠ ، بوس فينيل بيروليدين ٤٠٠ ، كحول إيثيلي .  
الشكل الصيدلي : أقراص .  
التأثير الدوائى :

- نوقا-سى-إن محضر بحيث يعطى مفعولاً ممتازاً على مدى ١٢-٨ ساعة للقرص الواحد .  
نوقا-سى-إن عبارة عن تركيبة متوازنة من مواد تعمل على خفض الحرارة وتساكن الآلام ومضاد للهيستامين وتخفيف احتقان الأغشية المخاطية .  
الكلورفينيرامين مالثات : عبارة عن مضاد قوى للهيستامين فعلى ومحتمل ويقلل احتقان الجهاز التنفسي والرشح ويقلل إفرازات العين والحكة الالتهابية واحتقان الأغشية المخاطية .  
الباراسيتامول : له مفعول مخفض للحرارة وتساكن الآلام .  
سودوفينيرين هيدروكلوريد : يعمل على القضاء الأوعية الدموية فيقلل من تورم الأغشية المخاطية المبهللة للأنف ، ويساعد الكلورفينيرامين على تلبية هذا المفعول وذلك بتقليل نفاذية الأغشية المخاطية .  
إضافة مادة الكلفين يعادل التأثير المهدئ لمضاد الهيستامين .  
نوقا-سى-إن مغلف لإحتكان ويعمل على الجهاز التنفسي العلوى ولا يسبب إتهاب موهضى كما أنه يزيد تخضع الأغشية المخاطية ويوقف الإفرازات الكثيرة لذلك فهو يقلل احتمال إتهاب الجيوب الأنفية .

الحركة الدوائية:  
- يمتص الكلورفينيرامين مالثات ببطء من الجهاز الهضمي و يرتبط 7٧ ٪ منه ببروتين البلازما كما أنه واسع الانتشار داخل الجسم ويصل المخ .  
- الباراسيتامول يمتص سريعاً من الجهاز الهضمي ويتم توزيعه في معظم الأنسجة .  
- يمتص السودوفينيرين سريعاً من الجهاز الهضمي ويتم إخراجها ، بدون تغيير ، في البول .

دواعى الإستعمال:  
- نزلات البرد والإنفلونزا .  
- خفض للحرارة في حالات الحميات .  
- مسكن لآلام إتهاب العضلات .  
- الصداع وإحتقان الجيوب الأنفية وحساسيتها .  
الجرعة وطريقة الإستعمال:  
أقرص كل ١٢ ساعة .  
لا تتعدى الجرعة قرصين يومياً .

موانع الإستعمال:  
- أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم .  
- إضطرابات الكلى والصماء . زيادة إفراز الكلى الدرقية ، مرض السكر .  
- تضخم البروستاتا .  
- الفرجة المعدية - الجلوكونا .  
- اضطرابات وظائف الكلى .  
- إضطرابات وظائف الكبد .

الأثار الجانبية:  
إضطرابات الغثاء الهضمية ، غثيان ، قى ، عدم ارتياح ، دوخة .

التفاعلات الدوائية :  
- مضادات الإكتئاب ( مداومة إستعمالها قد يحدث زيادة في تأثير الكلورفينيرامين مالثات )  
- أدوية التخدير ( إستعمالها مع نوقا-سى-إن قد يحدث زيادة ضريات القلب )  
- جوانثينيد ( إستعمالها مع نوقا-سى-إن قد يحدث نقص في تأثير الجوانثينيد المنخفض لضغط الدم )  
- مضادات الكولين ( إستعمالها مع نوقا-سى-إن قد يحدث تضيق في إمتصاص الباراسيتامول )

الحمل والرضاعة :  
لا يستخدم أثناء الحمل والرضاعة .

إحتياطات والتحذيرات:  
لا تتعدى الجرعة المقررة .  
لا يتعدى إستعماله كمخفض للحرارة أكثر من ثلاثة أيام ولا يتعدى إستعماله كمسكن للآلام أكثر من ٧ أيام ما لم يصف الطبيب غير ذلك .  
لا يستخدم للأطفال .

العبوة وشروط الحفظ :  
- عبوة كرتون تحتوي على شريط PVC/AL به ١٠ أقراص+ نشرة داخلية .  
- يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ ٪ .

تعليمات للمرضى:  
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .  
- اتبع جميع تعليمات الطبيب .  
- لا تكرر العلاج من تلقاء نفسك .

## ( إن هذا الدواء )

- قرص مستطير على وزن ٤٠٠مجم وسهله  
- هناك تعليمات برصحة الحفظ .  
- طعم مذاق الفواكه وطريقة التناول  
- الموضوع عليها ٤ تعليمات الفوائد للمرضى  
- تعليمات و التعليمات عند الإفرازات  
- ١٠٠٠ و ١٠٠٠٠  
- لا تطعمه علاج المصنوع من الماء الساخن  
- ١٠٠٠٠ قرص علاج الدواء لا يطعمه من الطبيب

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

٢/١  
٢٠١١/٦  
رقم الكود :  
٠٢٠١٨٨